FARRINGTON Ernest A., Materia Médica clínica

REINO ANIMAL
Lachesis_m
Tarentula_h
Tarentula_c
Theridion_c
Cantharis_v
Apis_m
Moschus
Sepia_off
Psorinum
Ambra_g
Secale_c

REINO VEGETAL

Abies_n
Aconitum
Aethusa
Anacardium_o
Apocynum_c
Arnica
Artemisa
Arum_t
Baptisia
Belladona
Berberis_v
Bryonia_a
C0locynthis_c
Capsicum
Chamomilla
Chellidonium_m
China
Cicuta_v
Cina
Cocculus_i
Cofea_c
Colchicum
Conium
Digitalis_p
Dulcamara
Euparorium
Euphrasia
Gelsemium_s
Glonoinum
Helleborus_niger
Staphysagria
Hyoscyamus_nig
er
Ignatia
Ipeca
Lyc
Nux_v
Oleander
Opium
Petroselinum
Podophylum_p
Pulsatilla
Ranuculus_b
Rhus_t
Sabadilla
Sabina
Sanguinaria_c
Spigelia_a
Stramonium
Thuja
Veratrum_album
Veratrum_v
Vinca_m

Introducción

Prologo

De los estudios serios de Hahnemann a nuestros días; en infinidad de ocasiones parece que la brújula de la SIMILITUD se ha perdido en numerosos escritos, folletos y hasta en libros cuyos autores, probablemente extraviados, han creído o pretendido hacer creer que la Doctrina Homeopática es un nudo gordiano muy difícil de desatar; pero porá fortuna no es así, supuesto que la experimentación de la Matéria Medica Pura, abunda en claridad, tanto en observación toxicológica, como funcional y patológica, fácilmente demostrable en cualquier momento, lugar o circunstancia de la vida, en que se desarrollen los experimentos.

Cuando leemos obras como las de Hahnemann, Jousset, Hughes, Sieffert, Allen, Hartmann, Dewey, Farrington y otros, es cuando palpamos la utilidad que reporta el autor que no impone como artículo de fe sus ideas, sino que, adjustándose al rigorismo científico de la época, busca prosélitos dentro del convencimiento.

Desde estudiante, he creído que Farrington ha sido a la Materia Médica Homeopática, lo que Jaccoud para la Fisiopatología; describe en tal forma sus cuadros, que sin dejar todo elaborado, seria e inteligentemente, inicia dentro de la fisiopatología, el análisis de la acción de los medicamentos que expone en su obra.

La Materia Médica Clínica de Farrington, es un libro que todo médico homeópata debe tener a la mano para ilustrarse con sus indicaciones, pues, aunque teraupetista, gusta de las ciencias médicas accesorias, viéndosele frecuentemente invadir el terreno intrincado de la Fisiopatología, Biología, Botánica, Mineralogía, Química, etc., para fundamentar la base de sus observaciones terapéuticas. En mi

humilde opinión, fué un clínico experto, un terapeuta hábil, un artista sagaz, que nos hace agradables las diarias faenas médicas.

EI concepto que me he formado de la Materia Médica Clinica de Farrington, encierra implícitamente mi admiración por el autor; pero creo que debe ser comentada por los médicos homeópatas contemporáneos, para fundar científicamente muchos de sus conceptos y adaptar sus exposiciones a la terminología médica actual, puesto que se trata de una obra para estudiantes y médicos.

Por las enseñanzas que en esta obra he adquirido, no he tenido inconveniente en recomendarla desde hace algunos años a mis alumnos del curso de Clínica Médica, de la Escuela Libre de Homeopatía de México.

Los médicos que leamos esta traducción elaborada por los señores, Dr. Eulalio Darío Flores y. J. Jesús Guadarrama, quedaremos satisfechos, puesto que en una obra como la presente, se impone la familiaridad castellana en todos los médicos de hable española.

Tacubaya, D.F. , junio de 1933

Dr. J. ALFREDO ZENDEJAS.

Conferencia primera

Vamos a iniciar nuestro estudio de Materia Médica, y es necesario hacer antes un juicio crítico sobre el asunto. Al comenzar a estudiar los pormenores de una ciencia o arte, debe comprenderse, ante todo, la interpretación de los mismos.

Si la Materia Médica no encerrara leyes fundamentales, sería inútil hacer una explicación sobre el tema. Los diez volúmenes de la Enciclopedia de Materia Médica editados por el Dr. Allen de New York, contienen más de nueve mil páginas, excluyendo los síntomas clínicos que harían otros varios volúmenes. Además, todo médico va descubriendo algo nuevo cada año y de este modo se va áeumulando un gran número de conocimientos a manera de multiplicaciones; por consiguiente, ya se entiende por qué el estudiante puede sorprenderse ante la idea de aventurarse a dominar con maestría, tan complicado estudio. No lo lograría a pesar de que intentara retener en la memoria todas esas páginas.

Las facultades mentales del hombre no están compuestas exclusivamente de la memoria; ésta es la facultad intelectual capaz de retener un suceso; la recordación es otra facultad de la mente, que facilita la exposición de los acontecimientos que la memoria retuvo; queda entendido que no todo lo que nos impresiona se borra, algo queda para siempre, y esto, como si permaneciera cubierto por una tela sutil, no nos vuelve a impresionar, a menos que a la mente se le ordene, obligándola a que se adapte al recuerdo cuando la ocasión lo requiera.

La mente debe ser educada en sus distintas facultades para que cuando ocurra un suceso en el medio exterior semejante al ya grabado en la memoria, la presencia del primero despierte la

recordación del hecho o hechos que están en relación con él. Esto naturalmente es más propio para nuestra parte emotiva que para nuestra inteligencia, ye que ésta última requiere más cultivo. Muchos de nosotros habremos sido tan propensos a la emoción, que sin esfuerzo de la voluntad o trabajo del entendimiento, podremos recordar una impresión. Permítaseme citar un ejemplo: en cierta ocasión un individuo, manejando un coche en una carretera, atropelló un perro, al cual destrozó horriblemente; esto lo preocupó mucho; el suceso, aparentemente, se había olvidado; varios años más tarde, y pasando otra vez por la misma carretera, sin pensar siquiera en lo que había ocurrido, al llegar al mismo sitio, experimentó la misma sensación. En esta vez, la impresión que había hecho en su mente, fué recordada y al instante despertó la emoción. De este modo, es como debiera el ingenio intelecutal del hombre, aprender la ciencia de la medicina. Debe observar a su paciente y esta observación despertará en su mente la imagen del medicamento adecuado. Esto ha sido considerado como un instinto del tecnicismo, pero no lo es del todo, puesto que para llegar a ello, es preciso estudiar tenazmente. Cuando vemos que un médico de experiencia entra a la pieza de su enfermo y al momento dice: "este paciente necesita Sulphur", ¿ cómo lo supo? Durante treinta o cuarenta años ha estado estudiando Sulphur; ha estado formando en su mente imágenes de Sulphur, que ve reproducirse en su enfermo al examinarlo. Por ahora suplico no poner a prueba esto antes de los años que deban pasar entre el comienzo y el fin de la carrera médica, porque no es posible hacerse profeta antes de tiempo.

Con el fin de hacer luz en este caos de la Materia Médica, será necesario adoptar algún sistema, algún plan de estudio; ¿ que plan debe ser ese? se pregunta cada estudiante; un profesor contesta de una manera, el otro contesta de otra. EI método, puede no ser correcto y sin embargo, los resultados pueden ser buenos. Será el armazón que sirva para construir el edificio, después de lo cual permanece el edificio a pesar de quitar dicho armazón. Será necesario adoptar un método y seguir con el hasta él fin. Al trazar el método que hemos escogido, procuraremos que reúna buenas condiciones para inciar al principiante y sostenerla hasta llegar al fin que me propongo. Este puede no ser muy claro, pues la mente no podrá, desde luego, apoderarse de una idea abstracta, pero en el transcurso del tiempo, lo que parece difícil al principio, será franco y sencillo al final.

Empezaremos por hacer un análisis de las substancias.

Supongamos que Ud. está fuerte en el conocimiento de una substancia que ha sido un medicamento popular por muchos años en alguna parte de su país y que cree que puede ser comprobado. Procede desde luego a obtener el material necesario; prepara su tintura y en seguida sus diluciones. Ahora bien, es un principio de Homeopatía para el cual no hay objeción, que debe conocerse la

acción que ejerce toda substancia en el organismo sano, antes de emplearla en la práctica; esta es una regla que no se debe omitir, pues de lo contrario caerá Ud. mismo en un error, duda y charlatanería, contribuyendo a llenar la Materia Médica de confusiones, demasiadas ya.

Es necesario saber lo que produce esta substancia. ¿ Qué se pensaría de un maquinista que hubiera tomado a su cargo la construcción de una máquina, cuando ignora cómo deben quedar ajustadas las piezas? ¿Qué se pensaría de un médico que no conoce el uso de las substancias que va a emplear? Después de esto, procura ensayar los efectos que esta substancia produce en una o varias personas sanas. Producirá alteraciones en la nutrición y en las funciones de los órganos. Si así sucede, los resultados serán uno o varios síntomas y estos síntomas serán manifestaciones de la alteración de la nutrición o de las funciones de uno a varios órganos del cuerpo. Yo he sido censurado por descender de las alturas de la Homeopatía Pura y expresarme en una forma fisiológica. La razón que en mi contra se aduce, es que no podemos conocer los cambios que se han verificado sino por medio de los síntomas, salvo excepciones, y que por lo tanto, hablar acerca de alteraciones funcionales es mancillar la Homeopatía. Esto es positivo, pero también es falso; es positivo si solamente se consideran las alteraciones funcionales, pero es falso si se considera que esta alteración es manifestación de los cambios sufridos en la fuerza vital. Yo no puedo concebir un síntoma, que no sea, en resumen, el resultado de una alteranción funcional. Yo no quiero decir con esto, que se debe dar Acónitum porque produce sequedad en la piel, acaloramiento, ardor, etc.; ni que se dé Belladonna porque produce hiperhemia cerebral y dilatación pupilar; sino que sostengo que esas substancias, producen esos efectos y si esos efectos no son alteraciones funcionales ¿qué son? Los cambios en la fuerza vital, solamente pueden ser conocidos por los resultados y estos resultados son los síntomas.

Ahora bien, ya se ha logrado el experimento; se ve que esos síntomas pueden ser comprendidos en dos importantes clases: subjetivos y objectivos; los subjetivos son aquéllos que siente solamente el experimentador y que manifiesta valiéndose de cierto lenguaje; los objetivos son aquéllos que se aprecian directamente por nuestros sentidos, tales como los que se pueden ver, oir, saborear, oler, etc.

Por ejemplo, si Ud. aplica el medicamento de que hablamos y la persona que lo toma dice que siente un dolor sobre el ojo derecho, será este un síntoma subjetivo no perceptible por nuestros sentidos, ¿sabe Ud. qué dolor es el que experimentó o lo puede apreciar con sus propios sentidos? Pero si es un divieso o forúnculo el que produce dicha substancia, si hay un sedimento obscuro en la orina o si hay estertores ásperos o mucosos en los pulmones, si el corazón está

alterado en sus movimientos, si hay una verruga o papiloma en la piel o si una exudación produce eczema, se trata de un síntoma objetivo.

Ahora bien, ¿cuáles serán las alteraciones que nos manifiestan esos síntomas subjectivos objectivos? Pueden ser debidas a defecto de las funciones, a un aumento de las mismas o a una perversión; si esta substancia produce fotofobia, habrá un aumento funcional; si por otra parte causa ceguera, de tal manera que el paciente puede contemplar el sol, habrá un defecto funcional; si por el contrario produce obscuridad o visiones luminosas, habrá una perversión funcional. EI experimentador puede presentar aumento o disminución en la orina, sedimentos como de polvo de ladrillo en la misma, esto será una alteración funcional. Por consiguiente, cuando vayamos a hablar de una substancia y tengamos que decir cuáles son los efectos que produce en el organismo, tendremos tres categorías diferentes: aumento, disminución y perversión. De esta manera se pueden ir coleccionando los síntomas, tanto subjetivos como objetivos. Si se está experto en los análisis de las "escretas" del cuerpo, deberá hacerse uso de esos conocimientos, para determinar la eliminación de los uratos, fosfatos, etc., pues estos datos son valiosos en el lugar que les corresponde, y fuera de el, carecen de valor y aun son perjudiciales. Un aumento en la eliminación de la urea, carecería de importancia, cuando no se atiende al estado mental; Todos los síntomas de la Materia Médica, no tienen el mismo valor, sino que éste es relativo e intrínseco.

Hemos recogido todos los síntomas observados; ¿qué es lo que tenemos ahora? un conjunto de ellos que parecen no tener relación entre sí. Proceden de un organismo que es todo orden y perfección y cuyas partes trabajan en perfecta armonía. Cuando una de esas partes está desordenada, debe haber algo que reúna esos efectos entre sí y que reproduzca la forma de una enfermedad y cuando se tenga esta forma ¿qué se habrá conseguido? un estado patológico. Espero que ninguno de ustedes obtendrá el título, si no ha estudiado patología. Cuando se tengan todos los cambios completos que esta substancia ha producido en el organismo, se tendrá entonces la patología del caso. Se tiene ya la totalidad de los efectos que en el organismo ha producido esta substancia, deben retenerse en la mente, caracterizando las particularidades de la droga. A esto, puede llamársele como se quiera, algunos le llaman "genio del medicamento", otros la consideran como la acción general del mismo. Debe tenerse siempre presente esto, o de otro modo las particularidades carecen de valor y se actuará como sintomista simplemente. Debe saber lo que en totalidad produce la substancia, o de lo contrario estara inhabilitado para apreciar cada una de sus partes. Pueden encontrarse veinte medicamentos que tengan iguales

síntomas, cómo elegir de entre ellos el adecuado?, aparentemente todos son idénticos, pero difieren en su acción general.¿

Cómo se encuentra esta acción general? por el estudio completo del medicamento, pero aquí es precisamente el punto, donde el médico puede precipitadamente ir a parar a la patologia, conjeturando que supuesto que la Belladonna reproduce la imagen de la escarlatina y el Arsenicum la del cólera asiático, hasta en el aspecto de las materias fecales, por esta razón estas substancias deben ser las medicinas para sus respectivas enfermedades. Baptisia reproduce exactamente la imagen de la tifoidea, y por lo tanto, puede también conjeturarse que Baptisia sea el remedio de esta enfermedad.

Atendiendose a todo lo que he expresado, al examinar a nuestro paciente, procederemos en la misma forma que lo hemos hecho en el caso del experimento. Anotaremos los cambios y observaremos las sensaciones que el enfermo acuse; veremos su lengua, examinaremos su orína y reuniendo todo esto, formaremos la imagen patológica del individuo. Supongamos que Ud. llega a la conclusión de que se trata de un caso de tifoidea. Esto carecerá de valor si no se establecen comparaciones que distingan el presente caso, de la enfermedad en general. Si el medicamento se acomoda a la acción general de Baptisia, y Ud. da ésta, el paciente recobrará la salud, aunque la enfermedad se llame tifoidea, paperas o parotiditis. Si la acción general de Baptisia no se acomoda al caso presente, no será curado el caso por el medicamento, aún cuando el paciente tenga el síntoma de Baptisia "piensa que es doble y que está dividido en pedazos".

Permítaseme recordar una observación que se atribuye a Caroll Dunham. En cierta consulta se había escogido para el paciente un medicamento, el cual parecía tener muchos de sus síntomas, pero cuando el Dr. Dunham fué interrogado contestó :"Ignatia no corresponde con el carácter general del paciente; más bien corresponde a Baryta, en el que Ud. encontrara sus más prominentes síntomas". Un médico se había decidido por un medicamento, el otro, por otro diferente. Cada uno prescribió por el estudio de su medicamento; el uno se fijó en algunos efectos de Ignatia, el otro, en la totalidad.

Es mi deber enseñar a ustedes la acción general de los medicamentos y las relaciones que guardan entre sí. No pretendo poderles explicar todo lo que es caracerístico de cada medicamento, pero creo poder dar una idea de su acción general y ustedes más tarde llenarán los vacíos. Debo recordar que la Materia Médica es la más importante de todas las ramas de la medicina, y que no se puede comprender si no se tiene pleno conocimiento de las otras ramas. Deben aprenderse los síntomas y no presentar cualquiera idea

para ser discutida hasta que no conozca su significado y si no se pueden interpretar estos síntomas, nunca se podrá aprender la acción general del medicamento.

Sangre, venas y arterias.
Linfa y sus vasos.
Nervios, cerebro, médula y simpático.
Músculos, tendones y ligamentos.
ANALISIS DE UN Tejido conjuntivo.
MEDICAMENTO Huesos.
Cartílagos y articulaciones.
Membranas serosas y sinoviales.
Membranas mucosas.
Piel.
Organos.

Ahora sabemos ya cómo analizar un medicamento de acuerdo con el esquema que insertamos. Debemos observar qué efecto produce en la sangre y en los vasos sanguíneos; en la linfa y en los vasos linfáticos; en el sistema nervioso, incluyendo naturalmente el cerebro, la médula y el sistema simpático. Las primeras de estas divisiones nos hablarán acerca de la nutrición del organismo y de la asimilación; los músculos y articulaciones nos hablarán de la función motora y así sucesivamente observaremos nuestro esquema íntegro.

Se anotarán las variaciones fuera de lo normal en cada uno de estos capitulos; en lo que se refiere a la sangre, se anotará el aumento como en la plétora o hiperhemia; la reducción como en la anemia o isquemia y la perversión, como en la clorosis y la piohemia; lo mismo exactamente se investigará en lo que se refiere a la linfa y en todas las divisiones del esquema.

Cuando se estudia un medicamento analizándolo de este modo, inmediatamente se logra una idea completa del mismo; es decir, se conoce la acción general del medicamento, sin que por esto terminen las dificultades. Se debe estudiar la relación que guarda un medicamennto con el otro.
Si Ud. se encuentra en un campo y ve un rebaño de doscientas o trescientas ovejas, todas le parecerán iguales y sin embargo, el hombre encargado de ellas, las conoce una a una. ¿Cómo lo ha podido lograr? las conoce por ciertos detalles que ha podido observar al familiarizarse con ellas. De este modo podrá Ud. conocer un medicamento en relación con otro, por el estudio de sus diferentes rasgos característicos, agrupándolos por sus semejanzas y separándolos por sus diferencias. De este modo, tendremos otra forma de estudio: la comparación de los medicamentos, que es precisamente tan necesaria para el exito en la práctica, como el

análisis del medicamento mismo.

Por otra parte hay medicamentos que se antidotizan entre sí, pudiendo conducir a un error. EI paciente puede ser demasiado sensible a la acción del medicamento y en este caso, es necesario modificar sus efectos. Hace poco prescribí Nux vóm., para un catarro, que el paciente vio curado desde luego, pero casi le enloquecía un intenso dolor de cabeza. Esto fué producido por un exceso de Nux vóm; le prescribí Coffea y en diez minutos había desaparecido el dolor. Esto lo hice simplemente para modificar los efectos de Nux vóm y no para suprimir el síntoma.

Por otra parte, hay algunos medicamentos que aún guardando una marcada semejanza entre sí, y pudiendo por esto considerarse como concordantes, son sin embargo antagónicos.
Por esto hay que estudiar la Materia Médica analizando un medicamento después de otro, hasta que se tengan todos analizados. Después deben ser coordinados en la mente de acuerdo con algún sistema, para estar en aptitud de recordar cuando sea necesario. Si se estudia un medicamento solamente, cada caso parecerá acomodarse a él; si es Acónitum, en todos los casos veremos su imagen. Por lo tanto hay que retener en la mente el estudio de Acónitum y de sus análogos, antes de hacer uso de él con éxito, a la cabecera del enfermo, lo que se consigue solamente sistematizando el estudio.

Ahora se verá que los medicamentos tienen ciertas relaciones entre sí y que éstas pueden reducirse a cinco. La primera, la he llamado relación de familia, proviniendo de la semejanza de su origen. Cuando los medicamentos proceden de una misma familia, deben tener una acción similar; por ejemplo, los metaloides Cloro, Bromo, Yodo y Fluoro, tienen mucha semejanza entre sí, por pertenecer a una misma familia. Lo mismo sucede con los medicamentos procedentes del reino vegetal; tenemos por ejemplo, la familia a que pertenece Arum tryphillum, en la cual encontramos medicamentos que se asemejan entre sí por la razón de su origen familiar. por ejemplo los Ofidios y nos encontraremos perplejos para encontrar las diferencias entre Lachesis, Elaps y Crótalus. Esta semejanza es, a veces tanta, que no pueden indicarse unos después de otros. Tomemos por ejemplo Ignatia y Nux vóm; ambos proceden del mismo orden de plantas, no podrán sucederse ni antidotizarse. También tenemos medicamentos que presentan marcadas semejanzas en su acción, a pesar de que en su origen difieren éstos son los llamados medicamentos concordantes, los cuales pueden ser administrados unos después de los otros.

Hay otra relación, la de complemento, que consiste en que una substancia termina la curación que otra empezó y es incapaz de

terminer. Por ejemplo, la relación que existe entre Belladonna y Calcárea.
Después tenemos la relación de antidotismo, de la que ya me he ocupado.
Por último, tenemos la relación de antagonismo, que no podré explicar. Esta es una realidad en ciertos medicamentos, que aunque se semejan el uno al otro, no pueden administrarse simultáneamente con éxito. Tales medicamentos son: China y Psorinum; Apis y Rhus; Phosphorus y Cáusticum y Silicea y Mercurio.

Con estas distintas ideas que ya hemos expuesto, debemos estudiar la Materia Médica como una ciencia natural, y tal debe ser intrínsecamente, a pesar de que nuestros rudimentarios conocimientos presentes, no hayan alcanzando un desarrollo que la hagan digna de tal nombre.
Las leyes de la naturaleza de ninguna manera se oponen a la conocida acción y relación de los medicamentos, sino más bien armonizan con ellos.
Ahora estamos en condiciones de iniciar el estudio de los diferentes medicamentos de que se compone la Materia Médica Homeopática.

Con este objeto, los agruparemos en tres grandes divisiones de acuerdo con los reinos de la naturaleza:

1o medicamentos derivados del reino animal. –
2o del vegetal y
3o. del mineral.

Hay también una cuarta clase de medicamentos, constituídos por los productos de las enfermedades, los Nosodes.
En nuestra siguiente lección, daremos principio al estudio de nuestros medicamentos del reino animal.

Conferencia segunda

Reino animal

Vamos a comenzar ahora nuestro estudio acerca de los medicamentos obtenidos del reino animal.
Deseo iniciar mi discurso acerca de esos medicamentos, con algunas observaciones relativas a sus propiedades en general. Muchos de estos venenos animales se **distinguen por la violencia e intensidad de su acción y por las marcadas alteraciones que producen a la vez en los tejidos y en las funciones.**

La sangre es frecuentemente modificada en su composición y en su calidad. EI sistema nervioso sufre y se afecta hasta en sus menos

importantes tejidos. La tendencia franca de estos medicamentos, es producir enfermedades que nunca revisten un carácter esténico y siempre se caracterizan por su forma destructiva, tendiendo a producir la muerte local o general del cuerpo. Así pues, consideraremos estas drogas como medicamentos adecuados en las enfermedades profundamente situadas, tales como aquéllas en las que la sangre está alterada en su composición y también en las que el sistema nervioso está profundamente afectado; en consecuencia estan indicadas en las fiebres tifodicas, en las inflamaciones erisipelatosas y en las tuberculosis de los distintos órganos y tejidos del cuerpo, al igual que en muchas de las discrasias que determinan las enfermedades agudas.

Si se dedica más tiempo del que ahora disponemos, al estudio de la Materia Médica, se encontrará que estas substancias son frecuentemente necesarias para despertar la vitalidad y encausar las fuerzas vitales de la menera más coveniente.
Encontraremos también que esos venenos animales son capaces de afectar la mente y especialmente la parte emotiva. Excitan los vicios más bajos en la naturaleza humana, hasta producir un estado verdaderamente repugnante. Algunos de ellos despiertan la más sucia lascivia, la ira más desenfrenada y otras pasiones de naturaleza semejante.

Por lo tanto podemos encontrar muchas de estas substancias, útiles para personas afectadas de enajenación mental, ya sea por alteraciones orgánicas o funcionales del cerebro, o como reflejo de irregularidades orgánicas funcionales.
Como se verá en el cuadro sinóptico a continuación insertado, podemos obtener un buen número de medicamentos derivados del reino animal.

Moschus, Castoreum, Mephitis, Oleum animale, Hippomanes, Castor equi, Lac vaccinum Lac
Mamíferos defloratum, Lac caninum, Koumyss, Fel tauri, Fel vulpis, Pulmo Vulpis.
Vertebrados { Lachesis, Crótalus, Bothrops,
Ofidios Agkistrodon, Elaps, Naja, Vipera.
Peces { Oleum Jecoris asselli.
Batracios { Bufo rana.
Moluscos Sepiæ succus, Murex
Radiados Corallium rubrum, Spongia, Medusa, Badiaga.
Hemípteros { Coccus cacti, Cimex.
Himenópteros { Apis mellifica, Vespa, Formica.
Articulados Coleópteros { Cantharis, Doryphora.
Ortópteros { Blatta.
Arácnidos { Tarentula, Mygale, Theri-dion, Aranea.

Para comodidad del estudio, he dividido estas substancias animales, teniendo en cuenta sus relaciones naturales. Tenemos en primer término los Vertebrados; dentro de esta gran división del reino animal, anotamos la primera clase, los Mamíferos, después, los Ofidios con una gran variedad de serpientes; a continuación los Peces y finalmente los Batracios.

En el primer orden de los Mamíferos, tenemos una gran lista de medicamentos, constituyendo estos sin embargo, solamente una pequeña porción. Hay muchas drogas animales de las que sólo conocemos sus nombres; han sido empleades por algunas personas y sin la experimentación correcta. Es un campo de acción en el cual no se ha conocido lo bastante y en el que las investigaciones han encontrado gran oposición; especialmente Cimex lactularius, la chinche común, que ha sido condenada, extendiendose esta oposición, desgra-ciadamente, a toda esta clase de remedios. Los prejuicios influyen mucho, yo no quiero dar a esas substancias más interés del que realmente tienen; nuestros conocimientos y nuestras pasiones nos afectan.

Revisando los Mamíferos, encontramos desde luego Moschus y también otra substancia animal semejante, Castoreum. Hablo de ambos, para que se recuerde que estas dos substancias actuan de manera semejante sobre el sistema nervioso. El origen de Moschus es de todos conocido; Castoreum es un producto similar obtenido del castor y es un medicamento útil a los pacientes (especialmente a las señoras nerviosas) que no reaccionan después de la fiebre tifoidea. Si después de la fiebre, el enfermo se siente agotado de fuerzas, y por tanto débil, irascible y con sudores debilitantes, Castoreum responderá al instante.

Después tenemos el producto que todos conocemos con el nombre de Mephitis putroium (Mephitis, zorrillo). Este también actua poderosamente sobre el sistema nervioso. Tomado éste en bajas potencias cuando se está debilitado, vigoriza el sistema nervioso y repara el agotamiento.
El principal y más importante uso de Mephitis, sin embargo, es en la tosferina. Produce una tos dura, con bien marcadas señales de espasmo, laringeo y un grito particular. He encontrado en el uso de esta medicina, que aparentemente empeora al paciente, cuando verdaderamente su tendencia es acortar el curso de la enfermedad. Cuando los síntomas catarrales son ligeros y el espasmo inspiratorio marcado, Mephitis será el remedio elegido. La tos se recrudece por la noche y después de acostarse. Hay una sensación de sofocación, el niño no puede respirar; las convulciones sobrevienen a veces. Vomita el alimento horas después de la comida. Los liquidos penetran en la laringe. En la tosferina, debe compararse Mephitis con Corallium rubrum, el cual tiene sin embargo, sofocación antes de la tos y gran

agotamiento después; la dificultad para respirar aumenta en inspiraciones crecientes, produciendo un ruido semejante al canto de un gallo, hasta que al niño se le pone la cara negra.

Debe pensarse también en Drosera. Este medicamento produce tos que semeja al ladrido de un perro y los accesos vienen tan frecuentemente, que no dan al paciente la oportunidad de recobrar el aliento, empeorando después de la media noche.
EI niño se sostiene los hipocondrios durante la tos y si no logra expectorar, sobreviene el arqueo y el vómito. El paciente puede tener diarrea conteniendo en sus evacuaciones flemas sanguinolentas. Mephitis ha sido también recomendado para el asma de los bebedores y puede también aplicarse en el asma de los tísicos, cuando Drosera ha fallado.

En este último caso, puede también recurrirse a Rumex-y a Sticta; el primero de éstos, estará indicado , cuando la agravación tiene lugar a las dos de la mañana y el último, ha sido recomendado por el Dóctor E.T. Blake, cuando al mismo tiempo hay cefalalgia, con sensación de como si se abriese la cabeza. Mephitis parece permitir al paciente soportar un frío intenso. No le molesta el tiempo frío y experimenta agradable medicamento los siguientes síntomas notables: dolores erráticos, con necesidad urgente de orinar; finas vibraciones nerviosas que alcanzan hasta los huesos y causan ansiedad; despierta en la noche con una sensación de congestión en las piernas, como si las tuviera dormidas, (véase Aurum) incapacitándole para el trabajo mental vivas imaginaciones. Se pone locuaz como si estuviera intoxicado; violento dolor de cabeza con sensación de plenitud, como si la masa encefálica fuera empujada hacia arriba; siente la cabeza grande, torpe e inerte, acompañada de una sensación de pesantez y presión en la parte posterior del craneo, como si con un dedo se estuviese empujando; la conjuntiva se pone roja y se inflama; la vista se debilita; las letras se borran y se confunden al leer.

En seguida tenemos el Oleum animal. Este es semejante en su origen a Castoreum y Moschus, es la secreción de la yegua, con la que tiende a excitar las pasiones del sexo opuesto. Después tenemos el Castor equi, que es la substancia roja que se desarrolla en el interior de las piernas del caballo; el principal empleo que se ha hecho de este medicamento, ha sido para las grietas de los pechos, cuando éstos están partidos y casi destrozados.

Hemos llegado a las preparaciones de la leche; no voy a defenderlas, ustedes serán los propios jueces; ningún autor o maestro, por brillantes que sean sus estudios, decidirá a ustedes; yo he hecho experimentos con estas substancias y creo que, por lo menos algunas de ellas; pueden ser oportunos remedios. Deben ustedes ensayarlas

para conocerlas por su propia experiencia.
La primera es Lac vaccinum o leche de vaca; la siguiente, Lac defloratum, o leche descremada; esta última ha ganado tanto terreno, que ya cuenta con más aprobación que las demás. Ha sido usada ampliamente en el tratamiento de los diabéticos, a los que se ha indicado tomar una poca en la mañana, otra al medio día y otra en la noche, prohibiéndoles todo alimento que tenga almidón o azúcar. La cantidad de leche indicada, debe aumentarse gradualmente, hasta que el paciente pueda tomar cuatro o cinco litros cada día. Se han hecho experimentos con Lac defloratum; éste ha curado intensos dolores de cabeza, localizados principalmente en la región frontal. Los dolores son de carácter vibratorio y punzante, acompañados de náuseas y vomitos gran frialdad y estreñimiento peritínaz. Es útil sobre todo en las mujeres anémicas. Deben recordarse los siguientes síntomas: mujeres enémicas, cefalalgia frontal con latidos, náuseas, vómitos y estreñimiento pertinaz.

Después de esto, tenemos la leche de perra, Lac caninum, de la que nada tengo que decir, más que ha sido usada por un doctor de N.Y. , para curar la difteria.
Koumyss, otra preparación de leche, no carece del todo de valor; es la leche fermentada de la burra y se usa ampliamente en los llanos de Asia; se dice que es un excelente alimento para las personas débiles y anémicas, y especialmente para los tísicos, por ser tolerable y rápidamente digerida por los estómagos delicados.
Tenemos después dos substancias : Fel tauri y Fel vulpis, las que han sido empleadas en el estreñimiento y en la acumulación de gases en el intestino.
Pulmo valpis, fué introducida por Grawolg; quien actuando de acuerdo con la ley de "Signatura rerum". recomendó Pulmo vulpis en los casos de asma, porque las zorras tienen una amplia respiración; menciono esto, sin sancionarlo, ni garantizarlo.
Hemos llegado a los Ofidios; aquí tenemos la gran clase de las serpientes, de las que no trataremos por ahora, con objeto de dedicar a su estudio, la siguiente conferencia.
Entre los peces, mencionaré solamente el Aceite de hígado de bacalao, Oleum jecoris aselli, este es conocido como un gran remedio en la escrófula, tuberculosis y debilidad; se usa como es sabido, por los médicos de las dos escuelas. Muchos médicos sostienen que éste actua fisiológicamente, lo que es un error, pues es solamente un medicamento, éste no actúa por el aceite que contiene, como lo sostiene el Doctor Hughes; si así actuara, cómo es que los otros aceites no producen los mismos efectos? Este es un medicamento complejo, que contiene, yodo, fósforo y otras substancias. El Dr. Neidhard de esta ciudad, ha hecho experimentos con este medicamento, dándolo en bajas potencias a los pacientes, hasta que obtuvo una lista de síntomas que encontró característicos, de los cuales haré aquí un esboso: puede ser empleada cuando hay

sensación de escalofrío en la espalda, ronquera y dolor en el pecho. Cuantas veces se veran estos síntomas como principio de la tuberculosis! Puede haber dolores agudos en diferentes partes del pecho, el enfermo se queja de dolores quemantes en distintas partes del mismo. La calentura es particularmente notable por las tardes, acompañada de sensación de ardor en las palmas de las manos; la tos es seca, con esputo viscoso, como se observa en los periodos iniciales de la tuberculosis. Estos síntomas han sido anotados por un concienzudo observador, el Dr. Neigdhard; son síntomas que cuando han sido notados en el enfermo, han sido curados por el medicamento. Por tanto, cuando estos se encuentren, puede darse Oleum jecoris aselli ya dinamizado o en estado natural, con fundamento científico.

En seguida tenemos a Rana bufo, una variedad de sapos indígenas de América del Sur. La superficie del cuerpo de estos animales, produce una substancia aceitosa, que es reputada como veneno. Las mujeres nativas, cuando están cansadas de las importunidades de sus esposos, mezclan esta substancia a las bebidas y se la dan, con el fin de producirles impotencia. En los experimentos que se han hecho con Rana bufo, se ha encontrado que produce síntomas repugnantes en extremo. Causa una especie de imbecilidad en la cual el sujeto pierde toda desencia. Llega a ser un consumado masturbador y busca la soledad para satisfacer su vicioso hábito. La mastubación y hasta la cópula sexual, parecen causar convulsiones, que se semejan a las de la epilépsia. El aura que anuncia el paroxismo epileptico, parte de los órganos genitales y es posible que el enfermo, presente violentas convulsiones durante el coito. La forma de epilepsia para la cual Bufo parece más apropiada, es la que se presenta con motivo de excitaciones sexuales o que parece partir del plexo solar. Estos síntomas son precedidos por una singular irritabilidad de la mente, durante la cual el paciente habla con incohererencia y se enfada porque su monserga no es entendida. Las convulsiones casi siempre son seguidas de profundo sueño. Hace algunos años, el dr. William Payne, curó un caso de peritonitis con este medicamento en el cual había repetidas convulsiones, seguidas al fin, por atontamiento y falta de percepción, extremidades frías, sudor copioso, etc. Recientemente, he tratado a una mujer con esta droga, con éxito, que presentaba convulsiones y ampollas supuradas sobre la piel, la garganta y la vagina.

El abdomen estaba sumamente delicado, experimentando toda suerte de dolores en los intestinos. Bufo también cura ampollas en la piel, las cuales al romperse dejan una superficie inflamada y un líquido icoroso.

Aquí podemos establecer comparaciones entre Bufo y sus concordantes : Indigo, está indicado en los espasmos epilépticos, que parecen ser reflejos de una exitación verminosa. Es frecuentemente útil en los niños, cuando despiertan por la noche con horrible picazón

y comezón en el ano. Pero este medicamento no dará resultados, a menos que el paciente esté abatido, triste o tímido. Si es vehemente y excitable, el recurso debe ser un medicamento intensivo, como Nux vómica o Bufo.
Artemisa vulgaris es un excelente medicamento para la epilepsia especialmente causada por un susto o una emoción mental muy fuerte. Los ataques son repetidos y van seguidos de profundo sueño.

De los moluscos, obtenemos dos medicamentos : Sepiæ succus y Murex Los haremos momentáneamente a un lado, para tratar de ellos mas tarde.

De los Radiados, obtenemos cuatro medicamentos; el primero que hay que mencionar, es el Corallium rubrum o coral rojo; tiene muchas indicaciones, pero solamente mencionaré dos. Corallium rubrum es útil en la combinación de sífilis y psora. Hay manchas lisas en la superficie del cuerpo, principalmente en las palmas de las manos. Al principio son de un tinte rojo coral, pero más tarde llegan a ser obscuras y toman un bien marcado color de cobre, característico de la sífilis. Corallium es también útil para los chancros, cuando estos tienen un tinte rojo coral.
La tosferina de Corallium rubrum, ha sido llamade la "tos de minuto por minuto", porque los paroxismos vienen muy seguidos, como ya lo he indicado. Durante el día la tos es breve, rápida y de un carácter resonate; cuando IIega la noche los paroxismos son más marcados, empeorando hacia la mañana. Estos parecen acabar completemente con la respiración del niño, de tal manera, que cuando la tos cesa, el paciente queda extenuado enteramente; esta tosferina es semejante a la de Mephitis, la cual ya he descrito.

Spongia : Hablaremos de este medicamento, al tratar de los metaloides Bromo, Yodo, etc.
Medusa o pez-jalea, tiene efectos que son casi idénticos a los de Urtica urens; produce urticaria y también tiene una acción ligera sobre los riñones.
Badiaga, esponja de agua dulce de Rusia, tiene dos principales puntos de acción; el primero es sobre las glándulas linfáticas causando infartos con endurecimiento. Se le ha empleado con éxito en los bubones indurados, especialmente cuando su tratamiento no ha sido correcto. Aquí el remedio es semejante a Carbo animals. También tiene acción sobre el corazón. Este de un servicio útil en las palpitaciones del mismo órgano, causadas por alguna desagradable impresión, paréciendose en esto a Coffea y a Phosphorus. No puede ser indicado para las lesiones orgánicas del corazón.

El Nitrito de Amylo, está también indicado en las afecciones funcionales cardíacas. Paraliza los nervios vaso-motores y por eso es útil en congestiones de diversas partes del cuerpo, especialmente de

la cabeza o del pecho; la cara se pone congestionada y hasta abultada y roja. La respiración es muy difícil. El corazón late más frecuentemente, pero con menos fuerza. Se experimenta una sensación de opresión alrededor del corazón. El paciente se ve obligado a incorporarse. La orina contiene ordinariamente una pequeña cantidad de albúmina. Es tan susceptible el paciente, que el hecho de abrir una puerta, le causa bochorno. Nitrito de Amylo está indicado, en los bochornos que se presentan en la menopausia.

Después de esto hemos llegado a los Articulados, cuyo cuerpo es segmentado, abejas, avispas, etc. Tenemos en este grupo, un gran número de medicamentos, algunos de los cuales están colocados en la lista. A los Hamípteros pertenecen Coccus cacti y Cimex.

Coccus cacti es un insecto que infecta los cactus de la América del Sur. Ei principal uso de este medicamento esta en la tosferina con agravaciones por la mañana. El niño despierta e inmediatamente es sorprendido por un paroxismo de tos, que termina con vómito de una mucosidad clara y viscosa, que pende de la boca en largos filamentos.

Este es un síntoma que todos deben recordar. Puedo asegurar que cuando este estado existe, es positivo que Coccus cacti; administrado al principio, puede cortar toda la enfermedad.

Además Coccus cacti afecta al pecho; los pulmones están lastimados y el paciente expulsa al toser, una mucosidad viscosa.

Kali bich. y Senega, son medicamentos concordantes con Coccus cacti; en esta condiciones.

Kali bich. tiene una tos seca, (de grito), empeora en la mañana. El esputo es filamentoso, pero es amarillo, no claro, como bajo la acción de Cocus cacti.

Senega es útil en los niños gordiflones, tiene una expectoración viscosa y clara, como la clara de huevo, pero la tos se empeora al anochecer. Si el niño puede explicarse se quejará de una sensación de peso que le tritura el pecho.

Cimex es un medicamento que jamás he empleado. He sido recomendado en la fiebre intermitente.

De los Himenopteros, obtenemos muy importantes medicamentos, tales como Apis mellifica, Vespa y Formica; este orden debemos dejarlo por el momento.

En el orden de los Coleópteros, encontramos Cantharis, que será tratado en una de nuestras próximas conferencias. Encontramos también la Doryphora decem-lineata. Este es altamente venenoso y ha sido usado con éxito, en las inflamaciones de bajo grado; pongamos por caso en la inflamación gonorreica, cuando las partes están moradas o de un color rojo obscuro.

Bajo el orden de los Ortópteros, hemos mencionado un medicamento, Blatta o cucaracha. Las revistas han relatado muchos

casos de hidropesía curados por ésta. En fin, tenemos los arácnidos, de los cuales hablaremos en una de nuestras futuras conferencias.

Tercera conferencia

Ofidios

Al estudiar los medicamentos del reino animal, primeramente hablaré con detalle de la gran familia de los Ofidios, vulgo serpientes. Entre los usados en medicina, tenemos desde luego Lachesis trigonocephalus. Este medicamento fué experimentado por el Dr. Hering hance sesenta años. En seguida tenemos Crótalus hórridus y también Crótalus cascavella, especie propia de la América del Sur, experimentada por el Dr. Muir. Esta tiene algunos síntomas que no ceden con la administración de otras especies. También tenemos la Naja tripudians, variedad de cobra, y Elaps corallinus, así llamada porque las escamas que tiene sobre el lomo, tienen apariencia de coral. Y por último Bothrops lanceolatus, medicamento que por más de un año, he tratado inútilmente de ensayar. Este causa síntomas semejantes a un estado particular conocido con el nombre de afasia. De estos venenos, los cuatro primeros son los más comunmente usados en medicina.

El veneno de las serpientes está generalmente contenido en una bolsa que se encuentra por detrás de los colmillos. Por debajo de ellos hay una canaladura que se continúa con un conducto, que da salida al veneo de la glándula. Cuando el animal está en calma, estas glándulas quedan replegadas en el paladar. Si el animal está excitado, éste abre la boca, los colmillos son proyectados hacia adelante y al mismo tiempo, por efecto de una acción muscular, el veneno baja por el canal a la picadura. ¿Después de esto qué sucede? Esto depende de varias circunstancias. El veneno es más activo en unas veces que en otras. Cuando más enojado está el animal, es más activa su ponzoña. Si al picar, los colmillos atraviesan las ropas, algo del veneno puede ser absorbido por ellas. Además, de la resistencia del individuo, depende el efecto.

Los efectos del veneno de las serpientes, pueden ser considerados de tres modos: el primero, puede ser comparado a la acción de un rayo o al efecto de una dósis de ácido prúsico. Inmediatamente después de la mordida, el paciente se leventa precipitadamente, revela en su mirada profunda angustia a cae muerto. Estos efectos nos demuestran la plena e inmodificable rapidez del veneno. En el segundo modo, comunmente la parte mordida se hincha y se cubre de un rojo no encendido, que rápidamente cambia a obscuro purpurino; la sangre se fluidifica y el paciente presenta síntomas característicos de septicemia. Los latidos del corazó aumentan en frecuencia pero disminuyen en su tono. El paciente se debilita y se cubre de un sudor pegajoso y frío. Aparecen manchas oscuras en el cuerpo por efecto de la extravesación sanguínea. El paciente está

deprimido por la debilidad de su sistema nervioso, cae en estado tífico y muere. o bien presenta fenómenos nerviosos : vértigos, manchas obscuras delante de los ojos, ceguera, un peculiar estremecimiento en todo el cuerpo, el rostro pierde su expresión, hay dispnea y hasta estertor. A veces el proceso puede revestir una forma lenta; después del vértigo o el temblor, el paciente se debilita y la herida se pone negra o gangrenosa. Todas las secreciones: sudor, orinas y heces fecales, son fétidas. Los síntomas diarréicos, revisten un carácter tifódico. El paciente va decayendo y finalmente muere. Tales son todas las fases de la acción de estos poderosos venenos en la sangre y nervios.

El grupo de los Ifidios se caracteriza por su acción paralizante sobre los nervios. Debilitan directamente el cerebro y el corazón. Después sigue la descomposición de la sangre, cambios en los tejidos y la muerte local o gangrena. Al principio hay un estado de ansiedad y excitabilidad mental, hiperestesia en todo el cuerpo y un temor perturbador. Después se presenta la depresión nerviosa, variando en su forma; otras, una confusión mental propia de la senectud, atontamiento, profundo delirio y parálisis completa.

Una pequeña dosis de Lachesis, puede hacer que el experimentador se sienta como que puede trabajar sin fatiga; se vuelve locuaz, habla sobre muchos temas; esta es una excitación nerviosa. Cualquiera historia, por ejemplo, le excita de una manera singular; las anécdotas le mueven al llanto; rápidamente aparece el estado opuesto y viene la depresión. Se han señalado también contracciones en la laringe y esfínteres en general. Hemorragias, generalmente de sangre obscura y descompuesta, por los orificios naturales del cuerpo y manchas equimóticas. Estos síntomas son más marcadas en Lachesis y Crotalus, Menos en Elaps y mucho menos todavía en Naja.

Inquietud, cara pálida, hinchada, rojo-obscura y a veces azulosa. Hay alteraciones bien marcadas en los sentidos; visiones obscuras, excitabilidad del cerebro y médula espinal, causando un desasosiego mental y la hiperestesia del cuerpo. Predominan los dolores con entorpecimiento y adormecimiento, hormigueo y las contracciones nerviosas.

Ya se ve pues, para qué clase de enfermedades son apropiados estos remedios curativos : en los tipos inferiores de inflamación, de carácter destructivo, tales como gangrena, pústula maligna, difteria, piohemia, carbunco, estados adinámicos, flebre tifoidea, etc.

Los nervios especialmente afectados por los venenos de las serpientes, parecen ser el neumogástrico y el accesorio del espinal, por consiguiente debe esperarse encontrar como eminentemente característico, síntomas de la laringe, de la respiración y del corazón. Todos los ofidios causan una sensación de constrcción y estrangulamiento, que proviene de la irritación del neumogástrico; todos producen dispnea y síntomas cardiacos.

Además producen una coloración amarilla de la piel; esto no es

ictericia y no debe confundiree con tal afección; esto proviene de la sangre y es debido a la descompoisción de este líquido, como justamente sucede en la fiebre amarilla, tifo, piohemia, por lo que no debe sostenerse la opinión de que es causada por la bilis. Esto es más marcada en Crótalus. Por otra parte, puede encontrarse que la piel es seca y áspera, como si su vitalidad estuviera comprometida; puede estar fría y pegajosa, lo que es más característico en Lachesis. Las evacuaciones son fétidas, y aún los escrementos formados, son horriblemente fétidos en Lachesis. Como el corazón está afectado, nos encontramos como características en todos estos casos, corazón débil, pies fríos, un temblor que no es nervioso propiamente, sino causado por el envenenamiento de la sangre. Los pies fríos no indican un estado congestivo, como en Belladonna, sino que son consecuencia de un debilitamiento cardíaco.

Los síntomas de Naja, en lo que se refiere al corazón, se asemejan grandemente a los de Lachesis, nada más que corresponden claramente a los efectos lejanos de lesiones valvulares cardíacas; en cambio Lachesis, corresponde a las enfermedades del corazón, que se inician en el curso de un reumatismo. En Naja, con los síntomas cardíacos hay dolor de cabeza bien marcado, en las regiones frontal y parietal; el corazón late tumultuosamente. El paciente despierta respirando con dificultad. Naja, provoca Más fenómenos nerviosos, que cualquiera de los venenos de las serpientes.

Bajo la acción de Belladonna, la cabeza está caliente y los pies fríos, porque la sangre se acumula a la cabeza. Bajo la acción del veneno de las serpientes, los pies estás demasiado débil, para hacer llegar la sangre a la periferia.

Todos los venenos de las serpientes causan inflamación del tejido celular. Por consiguiente los encontramos indicados cuando se presenta la celulitis, en el curso de una fiebre tifoidea, difteria, etc. El color de la parte afectada es rojo-obscuro, morado o negro, como en la gangrena. En la difteria, Crótalus ha dado buenos resultados clínicos, en la persistencia de las epistaxis; Elaps reclama atencion en casos de hemoptisis, cuando la sangre descargada es obscura en su color, especialmente cuando el pulmón derecho es el afectado.

Los antídotos para estos venenos, son numerosos. No hay duda de que el alcohol es un poderoso antídoto contra los venenos de las serpientes. Es notable, siempre que el alcohol pueda ser ingerido por las personas mordidas por las serpientes, sin que este cause los efectos fisiológicos naturales. El Dr. Hering recomienda el calor radiante como antídoto. La parte mordida debe ser mantenida cerca del fuego. El amoníaco y el permanganato de potasa, han sido recomendados como antídotos y cuentan con éxitos en su activo.

Materia medica

Lachesis mutus

Vamos ahora a estudiar Lachesis. Deseo desde luego referirme a sus síntomas generales, para que pueda ser comprendido lo expuesto. Observamos que Lachesis está especialmente indicado, para las personas que tienen una peculiar sensibilidad en la superficie del cuerpo; más aún, cuando el enfermo yace en estado de estupor y al tomarle el pulso se muestra molesto por el solo hecho de ser tocado. En cambio una fuerte presión es posible que no le cause molestias. El Dr. Hering, quien por primera vez experimentó Lachesis, no podía tolerar la ropa ajustada al derredor de su cuello; siempre usó cuellos flojos. Notaba que durante el experimento, este síntoma lo incomodaba más que de costumbre; anoto fielmente este hecho, pero sin darle mucho valor. Desde entonces el síntoma ha sido confirmado muchas veces en la práctica y ha sido comprobado, no solamente como un síntoma local de cuello, sino como un síntoma general en todo el cuerpo.

La explicación parece ser que hay una irritación de los nervios periféricos y por esto, el paciente no puede tolerar el tacto o la más ligera presión, no habiendo en apariencia inflamación, y por lo tanto no se confundirá con la hiperestesia inflamatoria de Aconitum, Arnica y Bell.

Esta sensibilibad difiere también de la de Apis, la cual tiene una sensación parecida a un magullado, más agudo que el de Arnica. Ella también difiere de la de Nux vom. y de la de Lycopod., que la tienen en derredor de la cintura y solamente después de algún alimento.

En seguida nos encontramos con que la droga tiene predilección por afectar el lado izquierdo del cuerpo.

Los homeópatas han sido criticados por atribuir a los medicamentos el poder de obrar sobre un lado del cuerpo de preferencia al otro. El simple hecho de que las enfermedades escojan lados, debe ser lo suficiente para inclinarnos a creer que los medicamentos pueden hacer lo mismo.

El lado izquierdo del cuerpo es el más propenso a ser afectado por los medicamentos que tienen una acción deprimente, porque este lado resulta el mas débil.

Otra peculiaridad de Lachesis, que es efecto probablemente, de su acción sobre los neumogástricos, es su influencia sobre el sueño. Es un síntoma común el que el paciente empeore por dormir. El sueño produce agravación; este síntoma es mas marcado que el precedente. Si es verdad que Lachesis tiene influencia sobre los centros de la respiración y que esta influencia es deprimente, podemos comprender por qué el sueño agrava los síntomas. Durante el tiempo que permanecemos despiertos, podemos tener algún control sobre nuestra respiración; durante el sueño ese control

voluntario se pierde y es entonces cuando predomina el efecto debilitante de Lachesis.

Lachesis resulta un valioso medicamento en la menopausia, especialmente cuando la mujer está agotada por frecuentes embarazos y arduos trabajos. En esta condición maltrecha, ocurre una repentia cesación de los menstruos. La suspención de estas descargas, empeora siempre a la paciente de Lachesis. Puede suceder que antes de la menopausia, se sentía peor antes de la menstruación que durante la misma. El pulso es débil y trémulo; hay un peculiar dolor de cabeza y síntomas mentales molestos, además de los trastornos nerviosos característicos del medicamento. Ahora vamos a considerar algunos de los síntomas de Lachesis en detalle; en mente primer lugar, los síntomas mentales : El paciente esta nervioso, inquieto, locuaz, juzga sin reflexionar todos los asuntos y algunas veces rehusa las medicinas que se le ofrecen, temeroso de ser envenenado. Las historias interesantes le excitan inmoderadamente y hacen más molestos los síntomas somáticos. A veces la ansiedad, asume un carácter especial, se imagina que está muerto y que se están haciendo los preparativos de sus funerales. La locuacidad puede ir acompañada de sueño e imposibilidad para dormir. Las ideas cambian con tal rapidez, que su mente no puede grabarlas. Se desvela en las noches, debido a que su actividad mental está aumentada de un modo inusitado. Pero este estado de excitación va seguido de otro que prontamente lo reemplaza. La mente se debilita. El paciente solamente puede pensar con dificultad. Necesita detenerse para pensar como se deletrean las palabras, como en Sulphur, Lycopod y Medorrinum. Hay vertigo que empeora al cerrar los ojos, al sentarse o al acostarse. Vértigo con palidez de muerte; para este vértigo, desfallecimiento, etc., puede comparase con Theridion, el cual también tiene desvanecimiento que empeora por cerrar los ojos, pero con un distintivo característico, se encontrará que bajo este último medicamento, el vértigo, dolor y la náusea, son agravados intensamente por los ruidos. Ambos medicamentos son utiles en la insolación. Para el vértigo y la lipotimia producidos por debilidad cardíaca, deben comparás; Arsenicum, Hidros, ac., Digitales, Verat, alb. y Camphora.

Laurocerasus e Hodrocianic. ac., pueden estar indicados en los desvanecimientos de larga duración; parece estar abolido el poder de reacción; la cara es pálida o azul, la superficie fría.

Si los líquidos son obligados a atravesar la garganta, éstos producen un ruido perceptible hasta llegar al estómago. Si el síncope es la consecuencia de la pululación de alguna toxima en la economía, por ejemplo en un caso de escarlatina, los síntomas son semejantes, la erupción tiene un color lívido acardenalado y cuando se oprime, recobra su color muy despacio. (Ailantus).

Digitalis también rivaliza con los Ofidios en el síncope, habiendo el antecedente de vista nublada, pulso generalmente muy lento y cuando el paciente se queja de náusea y debilidad mortal en el

epigastrio.
Camphora y Verat. alb., tienen frialdad y piel sudorosa y fría; en Verat. alb., éstos síntomas son más notables en la frente. Tratándose de Verat. alb., la cara puede ser roja mientras el enfermo está acostado, pero si se levanta, ésta se pone palida y el enfemo se desmaya.
Camphora tiene la superficie helada, hay repentino abatimiento como en Laurocerasus y no obstante sentirse tan frío, desecha la ropa tan pronto como se siente capaz de moverse, aún cuando este todavía inconciente.
Pesantez de la cabeza al despertar, acompañada de náusea y vahído, como en la insolación. Para los malos efectos del calor del sol, compárese con Glonoin, Belladona, Natrum carb y Theridion.
Los dos primeros con cara roja e hinchada y debilidad paralítica (Glonoin) inconsciencia, etc., se parecen a Lachesis; pero el último produce los efectos del calor sobre un sujeto ya agotado.
Todos los Ofidios producen intolerancia a la temperatura cálida y por eso encontramos que muchas enfermedades vuelven en primavera y verano. En Lachesis el paciente puede estar en estado de embriaguez o postrado por la fatiga mental. El calor del sol lo vuelve lánguido, propenso a los vértigos, pusilánime o si sobrevienen congestiones, la cara se pone rojo-obscura y se le ve al mismo tiempo deprimido y cadavérico; las extremidades están frías. En este caso, Camphora puede ser de utilidad si la vitalidad están disminuyendo, si el decaimiento progresa empeorando y el cuerpo está helado y bañado en sudor frío. Ambos, Lachesis y Natrum carb., cuando la temperatura cálida produce fatiga, en cuyo caso deben ser comparados también con Selenium y Natrum mur.
Volviendo después de esta disgresion a los síntomas mentales de Lachesis, encontramos que el delirio es musitante y de caracter depresivo; otras veces parece que el paciente llega a un extremado estado de estupor, con frialdad en las extremidades y temblor en las manos y cuerpo. Cuando se le ordena que saque la lengua, ésta sale temblando y queda detenida entre las arcadas dentarias; está regularmente cubierta de una capa café obscuro y a veces con pequeñas ampollas en la punta. Los labios agrietados manando sangre obscura. La locuacidad es comunmente seguida de un estado de depresión y debilidad, llegando hasta un estado tifódico y entonces sobreviene el delirio, que no es del tipo violento del de Belladonna. Estos síntomas demuestran que Lachesis es un inestimable medicamento en la fiebre tifoidea y de seguro en todas las enfermedades que revistan el carácter tifódico. La locuacidad justamente indicada, es particularmente característica. Otro estado mental que los pacientes tifódicos pueden tener, es el error de sentirse bajo el influjo de una fuerza sobrehumana.
Hay comunmente diarrea y las evacuaciones son, en forma terrible, desagradables. Esta es una singular característica de Lachesis, que puede señalar su indicación en la difteria, escarlatina, y otras

enfermedades de este tipo; aún cuando los excrementos estén formados y tengan un aspecto natural, ofrecen una terrible corrupción.

Lachesis puede estar también indicado como último recurso en la fiebre tifoidea, cuando el paciente yace en estado de estupor, con caída de la mandíbula inferior y otros síntomas indicativos de una parálisis cerebral que amenaza.

Permítaseme hablar ahora de algunos medicamentos concordantes de Lachesis, en estas condiciones : En la locuacidad justamente mencionada, Lachesis debe ser comparado con Stramonium, Agáricus, Mephitis, Actea racemosa y Paris cuadrifolia.

Stramonium será distinguido de Lachesis, por la cara roja y por otras manifestaciones de gran exitación sensorial.

Agáricus, presenta gran locuacidad asociada de movimientos convulsivos de los músculos faciales y cervicales, alegría y conversación incoherente.

En Mephitis, hay locuacidad como si estuviera ebrio.

Bajo la acción de Actea rac, la locuacidad esta generalmente asociada a la supresión menstrual, con manía puerperal o delirio formidable, lo que también se encuentra en Lachesis. Actea cura persistentes imaginaciones de ratas, insomnio tenaz y extraño delirio conmovedor, incesante platica con continuos cambios de tema; el paciente necesita cambiar de sitio. Lachesis tiene más marcado temblor en las manos, diarrea y profundo agotamiento, con locuacidad y alucinaciones.

Paris cuadrifolia, tiene una locuacidad que más bien se parece a la que produce el té, con detalles de vivacidad y delirio de parálisis.

En los tipos tifódicos con fiebre, Lachesis debe ser comparado con Opium Hyosciamus, Arnica mont., Lycopod., Apis, Muriat. ac., Baptisia y Rhus tox.

Opium está indicado en la fiebre tifoidea, cuando amenaza la parálisis del cerebro, pero sus síntomas se refieren a un estado distinto de Lachesis. Los síntomas que indican Opium además de la caída de la mandíbula inferior, son : inconsciencia, respiración estertorosa, un tinte obscuro de la cara, que tira al rojo-moreno; mientras más obscuro es el rojo de la cara, mas indicado está Opium. En Lachesis, el estado cerebral es debido al efecto de la intoxicacion tifodica, en Opium es un efecto secundario de la intensa congestión de este órgano.

Hyosciamus es quizá más parecido a Lachesis que Opium; en él encontramos caída la mandíbula inferior más marcada; el paciente está más débil y tembloroso y hay contracciones nerviosas en los músculos; este último, es un síntoma necesario en Hyosciamus; aquí también hay respiración estertorosa como en Opium, con evacuaciones involuntaria y gran postración.

Arnica está también indicada cuando hay notable congestión del cerebro, el paciente yace en estado de estupor, con la mandíbula inferior relajada y los ojos fijos y a pesar del estado de estupor, le

parece la cama demasiado caliente y dura; la cara es de un color rojo-obscuro y las materias fecales y la orina, escapan involuntariamente. Juntamente con estos síntomas, encontramos bajo la acción de Arnica, uno, que especialmente difiere de los medicamentos ya mencionados: manchas obscuras en todas partes del cuerpo, de contorno irregular y de color negro azuloso, a las que se ha dado el nombre de equimosis.

Lycopodium, es el complemento de Lachesis y por tanto, puedo estar indicado después de éste, de preferencia a todos los ya mencionados. Los síntomas que indican a Lycopodium, son los siguientes: el paciente yace en estupor con la mandíbula inferior caída y la respiración estertorosa; hay un ruido especial producido por las flemas en la garganta, durante la expiración y la inspiración; los ojos están fijos, obstinados y llenos de mucosidades. Lycopodium es el medicamento más importante con que contamos para impedir la parálisis del cerebro, por eso insisto en que es el más frecuentemente indicado.

Apis no tiene tan marcada la caída de la mandíbula inferior, pero se semeja a Lachesis en el delirio musitante, temblor de la lengua, etc. El veneno de la abeja, aunque causa una excitación nerviosa con insomnio e imposibilidad para dormir, más tarde delirio mudo, extraña expresión, abdomen abultado y extremadamente sensible, manos y antebrazos fríos, evacuaciones involuntarias, esta sensibilidad va acompañada de una sensación de magulladura, diferenciándose es esto de la hiperestesia de Lachesis.

Muriáticum acidum, presenta cara hundida, de color café, contraída y el paciente se desliza en la cama por la debilidad muscular.

Baptisia, tiene la cara idiotizada; hay somnolencia y estupor; se duerme el paciente al contestar las preguntas; hay evacuaciones intestinales obscuras, fluídas y de olor repugnante.

Rhus tox., puede semejarse a Lachesis en una fase de su acción, generalmente cuando aparece el estupor y hay delirio musitante; la lengua está sarrosa y hay evacuaciones involuntarias. Rhus tiene un insomnio bien marcado, con deseos de cambiar constantemente de posición; la locuacidad no es prominente; la lengua tiene un triangulo rojo y las evacuaciones nunca son tan repulsivas como las de Lachesis.

Dejando a un lado los síntomas mentales de Lachesis y las indicaciones de este y sus análogos en la fiebre tifoidea, vamos ahora a considerar sus principales síntomas cefálicos. Encontramos desde luego que produce un dolor de cabeza de pulsación, especialmente a nivel de la sien izquierda y al derredor de los ojos, acompañado de confusión mental y desarrollo de coriza y que cesa tan pronto como éste aparece; este es un síntoma caracteristico general; tan pronto como la descarga aparece, el enfermo se siente mejor. Yo he aliviado con Lachesis algunas dismenorreas precedidas del caracteristico dolor de cabeza, el cual desaparecía tan pronto como se establecía el flujo.

En los dolores de cabeza, catarrales y reumáticos, puede ser

comparado Lachesis con Mercurius, China, Pulsatilla, Bryonia y Gelsemium.

Mercurius cura el dolor de cabeza cuando éste es pulsativo y con sensación de presión hacia la nariz; el dolor empeora por el calor de la cama y por la humedad.

China, alivia los dolores que resultan de la supresión de un coriza y cuando éstos se agravan por la más ligera corriente de aire.

Bryonia y Pulsatilla se acompañan, cuando la secreción catarral es disminuída, espesa y amarilla o verde respectivamente.

Gelsemium, cuando se encuentra disminuída la modatilidad y el paciente está soñoliento, con dolores neurálgicos, que ven del occipital a la frente y cara.

El dolor de cabeza puede también proceder de desarreglos gástricos o intestinales e ir acompañado de fiebre y de trastornos de origen zimótico. El paciente es propenso a sufrir aflujos de sangre a la cabeza, con pulsaciones, color rojo-obscuro de la cara, ésta está hinchada, hay confusión mental, que presenta todos los grados, desde la simple confusión, hasta el completo estado de estupor; a menudo acompañado también de ceguera parcial, palpitaciones de corazón y desmayo.

En resumen los dolores de cabeza son del siguiente carácter: Agudos pinchazos, los cuales parecen concentrarse en la raíz de la nariz; otras veces los dolores van del zigoma al oído; esta dirección de los dolores es característica; como un paralelo de estos dolores del zigoma al oído, tenemos los dolores de cabeza que atravienzan el interior de los ojos. Estos son todos los dolores característicos de Lachesis. Hay un adicional que mencionaré ahora, el cual es probablemente de origen reumático: un dolor de cabeza que baja al hombro y al cuello del lado afectado y que es a menudo acompañado de rigidez de la nuca, ya sea de origen catarral o reumático.

Puede estar indicado Lachesis en las formas graves de afecciones cefálicas, ponemos por caso, en las inflamaciones de las membranas del cerebro. Agudos dolores de cabeza hacen gritar al paciente; la lengua presenta las papilas abultadas, lengua de color de fresa; el paciente vuelve la cabeza de un lado a otro y la hunde en la almohada. Particularmente es útil Lachesis, cuando una erupción, como escarlatina y erisipela, no se han desarrollado o ha sido entorpecida su evolución.

El enfermo está al principio muy amodorrado, adormecido, siendo incapaz de dormir; hay temblor y palpitación del corazón. Pronto sobreviene el estupor y llega a ser pesado y soñoliento, pudiendo despertarlo solamente con dificultad.

En dolores intensos de cabeza como los de la meningitis, debe recordarse la relación que hay entre Belladonna y Lachesis; la diferencia que hay entre estos dos medicamentos es más bien de grado. Las dos convienen para las meningitis que provienen de la erisipla, escarlatina, apoplegía, etc., pero el primero (Bell) representa el estado inicial de esta enfermedad, o mejor, cuando el paciente se

haya aún en estado de estupor; se encuentran signos evidentes de irritación y no de completa depresión. Así bajo la acción de Belladonna, el paciente se pone en movimiento durante su sueño pesado; grita, rechina los dientes, despierta asustado, etc. Su pulso es generalmente fuerte y las superficies congestionadas son de color rojo encendido, o cuando son más acentuadas, de un color lívido obscuro. Si hay una erupción como en escarlatina, ésta es roja, y aun cuando sea ligera y la vitalidad no esté comprometida, las extremidades están frías, hay ronchas azulosas, el tejido celular está infiltrado y amenaza presentarse una supuración de mal carácter, como sucede en los venenos de las serpientes. Frecuentemente sin embargo, después del uso de Belladonna, se encuentra evidentemente la depresión cerebral, un envenenamiento de la sangre o amenaza una parálisis, en cuyo caso Lachesis estaría indicado. El paciente grita durante el sueño y despierta espantado; la lengua muestra las papilas levantadas; la cabeza está caliente y la cara roja, pero el pulso es más acelerado y más débil, los pies están fríos; el calor de la superficie del cuerpo irregularmente distribuído, la mente está confusa, hay somnolencia; la parte inflamada, la pseudo-membrana o la erupción, según el caso, se pone más purpúrea, lo que indica el cambio mencionado.

Considerando la acción de Lachesis sobre los sentidos en particular, encontramos que esta substancia afecta los ojos; produce obscurecimiento de la vista que empeora al despertar; manchas obscuras aparecen delante de los ojos; la vista repentinamente parece nublarse, sintiendo desfallecimiento, palpitaciomes de corazón y temblores nerviosos.

Lachesis es uno de los principales medicamentos para la vista débil y confusa, cuando evidentemente hay una afección cardiaca acompañada de vértigo. También lo podemos usar con buen éxito, para los casos llamados de apoplegía retiniana; en este caso actúa muy bien provocando una reabsorción de la sangre.

Los medicamentos más parecidos a Lachesis para estas afeccioness, son: Crótalus, Phosphorus, Arnica, Belladonna y Hamamelis.

En la oftalmia escrofulosa está indicado Lachesis, cuando los síntomas empeoran francamente después del sueño. Hay gran fotofobia y dolores de carácter punzante y quemante, propagándose a las sienes, a la coronilla y al occipucio. Hay también comezón y escozor en los ojos y párpados, que empeora con el roce. La visión es nebulosa, obscura, con destellos luminosos delante de los ojos.

Crótalus puede también ser consultado en la queratitis, cuando hay dolores incisivos al derredor de los ojos, los parpados están turgentes por la mañana; hay neuralgía ciliar con dolores también incisivos, que empeoran durante la menstruación.

En las enfermedades del oído, Lachesis puede ser un medicamento indicado para los zumbidos rugientes del mismo y para diferentes clases de tinitus aurium, los cuales se alivian por introducir un dedo en el oído y moverlo, demostrando esto que los zumbidos no son de

origen congestivo sino de catarral y por oclusión de la trompa de Eustaquio. La cerilla es alterada en su calidad llegando a ser pastosa y de olor desagradable. Hay dolores vibratorios obstinados, entre el oído y la apófisis mastoides, acompañados de rigidez. Para esto se puede comparar con Nitric. ac. Capsicum, Aurum, Hepar y Silicea.

Elaps y Crótalus también tienen acción sobre los oidos. Elaps, como Lachesis, produce catarro con serúmen negro zumbidos de oídos y otorrea. En Elaps, el escurrimiento es amarillo verdoso, líquido y sanguinolento. Sólo Lachesis parece obtener mejoría en la obstruccion de la trompa de Eustaquio por la introducción del dedo en el conducto auditivo externo. Crótalus produce una sensación de obstrucción en los oídos, principalmente del lado derecho, asociado a una percepción, de como si el serúmen caliente escurriera.

En Lachesis, el aspecto del enfermo, varía naturalmente, según el estado en que se encuentre el organismo. En muchas de las enfermedades en las que este medicamento está indicado, la cara tiene una palidez terrosa. En los casos de fiebres eruptivas, puede estar hinchada y abotagada, rojo-azulosa; si hay erupción, ésta es escasa, a grandes trechos, y de un color obscuro.

La expresión facial es ansiosa, hay dolor con estupor; la cara está desencajada, como después de una orgía; hay círculos azulosos al rededor de los ojos. En los trastornos abdominales, así como en el paludismo, la cara tiene un calor terroso.

Lachesis tiene también contracciones convulsivas de los músculos faciales; trismus; gesticulaciones; estiramiento del cuerpo hacia atrás; hay en seguida gritos estridentes; frió y comezón en los pies.

En lo que se refiere a cara abotagada, puede compararse Lachesis, con Apis, Belladonna, Arsenicum, Lycopodium, Hyosciamus, Rhus tox., Pulsatilla, Stramonium, Kali carb. y Phosphorus. Para el aspecto enfermiso, piel pálida y terrosa, con Arsenicum, Bufo, Lycopodium, Carb. veg., Rhus tox., China, Phosphorus y Phosphoric acid. Para los círculos azulados alrededor de los ojos, con Arsenicum, Cuprum, Phosphorus, Secale cornutum y Veratrum album. Para el aspecto de la cara semejante a la de un beodo, con Baptisia, Hyosciamusm, Carb. veg., Nux vóm., Sulphur, Opium y Nux moschata.

En las convulsiones faciales compárese con : Nux vóm., Hyosciamus, Belladonna, Hydroscian. acid., Lycopod, Cicuta, Camphora, Phytolacca y Arsenicum.

Apis, Arsénicum y Kali carbonicum, están indicados en el abotagamiento de la cara, aún cuando no haya enrojecimiento. En Apis, hay también escozor en los párpados y una sensación de tirantez. En Arsenicum, la hinchazón se nota en el contorno de los ojos y en la frente. (También Natrum ars.) Kali carb. tienen las bien conocidas bolsas en los párpados superiores e hinchazón súbita de las mejillas.

La expresión, aspecto, etc., de Arsenicum es muy semejante a lo que producen los venenos de las serpientes. La ansiedad y el dolor son muy marcados por la inquietud e irritabilidad, temor a la muerte,

etc., y la facies es completamente hipocrática, con surcos señalados, ojos sumidos y sudor frío, ya sea amarillento o terroso; siempre revela un estado caquectico. Si se presentan síntomas de trismus, el paciente se encontrará tendido, pálido y como si estuviera muerto, aun cuando esté caliente. Repentinamente se sacude e inmediatamente es conmovido por violentas convulsiones, que cesan para volverlo a dejar en un estado de rigidez cataleptica.

Los ojos están en parte abiertos, con mucosidades en la conjunctiva (Hepar).

Lycopodium tiene la cara amarilla o pálida, sumamente arrugada apareciendo como alargada. Los movimientos convulsivos son únicos en su género. En todos los experimentadores de este medicamento se encontrará contracción y relajación alternativa; la lengua se vera que entra y sale alternativamente de la cavidad bucal, todo esto acompañado de temblor espasmodico de los músculos faciales; las comisuras de la boca se contraen y relajan también alternativamente, al igual que las alas de la nariz. Los ojos pueden estar entreabiertos y cubiertos de mucosidades, lo que indica un mal síntoma, pues generalmente revela un estado de agotamiento del cerebro.

Phosphorus, tiene cara pálida pero se distingue por su aspecto ceniciento y anémico. Este medicamento debe también ser recordado, puesto que como los Ofidios, tiene cara hinchada, surcos profundos, círculos azulosos alrededor de los ojos y labios también azules.

Hyosciamus es muy parecido a Lachesis en su expresión facial y en sus fenómenos convulsivos; tiene un aspecto marcadamente estúpido, semblante de borracho, las facciones descompuestas y la cara de color azul, hinchada, tirando a azul-moreno; estremecimiento y contracciones de grupos musculares aislads. Antes de los ataques hay una sensación de hambre. (Apis).

Stramonium se distingue desde luego, por la cara tumefacta y crecida, terror al despertar, reaparición de los espasmos o calambres por la luz; así como por el aspecto melancólico y un gesto con arrugas en la frente.

Hydroscianicum acidum, presenta marcada concordancia con los síntomas convulsivos y el color de la cara. Como en Elaps, los líquidos producen un ruido peculiar en el estómago, que puede ser percibido; pero en el último, hay algo así como una contracción espasmodica de los esfínteres, seguida de repentino relajamiento. En las convulsiones producidas por el Acido Hydroscianico, la superficie del cuerpo es azul-pálida y los musculos de la cara, mandíbulas y dorso, están afectados. Repentinamente presenta una postración nerviosa, la cual pasa como rayo de la cabeza a los pies, presentándose entonces el espasmo. En esto, esta substancia se parece notablemente a Cicuta y a Helleborus y no a Lachesis; pero Cicuta tiene, como en el veneno de las serpientes, gran dificultad a la respiración debido al espasmo y mas que ningún otro medicamento, produce fijeza de la mirada; el espasmo es seguido de un estado de debilidad de intensidad despropprcionada.

Camphora se distingue de Lachesis, por la frialdad y por la separación de los labios, mostrando los dientes.

Lachesis está indicado en las erisipelas de la cara. Como un característico, esta enfermedad será más notable en el lado izquierdo. La cara al principio, puede ser de color rojo encendido, pero pronto toma un tinte azulino-obscuro. Hay una infiltración considerable del tejido celular, por lo que es muy marcada la hinchazón del ojo del lado afectado. El color azuloso característico de la cara, se presenta acompañado de debilidad. Aun en el comienzo, cuando la piel todavía está roja, el pulso a pesar de estar acelerado, es débil, los pies propensos a enfriarse y la cabeza se encuentra afectada por simpatía, de tal manera que el paciente entra en un estado de somnolencia, con delirio murmurador o inversamente, se presenta una pseudo-excitación con locuacidad, como la que ya se ha mencionado.

Es necesario ahora distinguir las erisipelas de Lachesis de las de los otros remedios que le son análogos; entre ellos está Belladonna, que en sus primeros síntomas puede parecerse a Lachesis; pero en el curso de la enfermedad, cuando la inflamación es tan intensa, que la cara se vuelve abotagada y de un color rojo-azuloso, con amenaza de gangrena, o cuando el cerebro es afectado, su diferenciación es necesaria. Aquí ambos medicamentos tienen la cabeza caliente y los pies fríos, delirio, lengua seca. Pero Lachesis se acomoda más cuando los síntomas cerebrales no han querido ceder a la acción de Belladonna y la excitación cede su sitio al estupor musitante; el pulso es débil y rápido y la frialdad de la superficie de los miembros, es francamente debida a la disminución de la vitalidad, más bien que a la tendencia de la sangre a subir a la cabeza. Crotalus, tiene las mismas relaciones con Belladonna. Apis mell., está indicada en la erisipela, cuando las partes afectadas, tienen una tendencia a volverse edematosas. Si la cara está comprometida, los párpados sobresalen como bolsas de agua. La cara tiene comúnmente un tinte rosado pudiendo ser purpurino obscuro, pero nunca tiene el profundo tinte negro-azuloso de Lachesis.

Aunque puede tener una tendencia destructiva semejante, la condición de irritación nerviosa producida por el veneno de la abeja, es muy diferente de la de cualquiera de sus congéneres. Es un estado de excitación nerviosa, un estado de inquietud, que impide al paciente dormir, aun cuando tenga sueño.

Rhus tox., conviene en la forma vesiculosa de erisipela; el paciente está adormecido como bajo la acción de Lachesis; pequeñas vesículas se forman aquí y allá sobre la superficie, y la cara está de un color rojo- obscuro, mas no del color azulino de Lachesis, ni del purpurino intenso como en los casos graves de Apis.

Si se forman vejiguillas en el caso de Lachesis, rápidamente se llenan de pus. Hablando en forma relativa, Rhus produce más vesiculación y ardor, picazón y hormigueo, dolencia en los miembros, especialmente en los inferiores y más desasosiego; Lachesis produce

más inflamación rojo-azulosa con tendencia a la gangrena.

Euphorbium debe también tomarse en cuenta, porque produce erisipela con gangrena, ansiedad, como la producida por un envenenamiento, aprehensión y obscuridad de la vista. La mejilla derecha tiene un color livido o rojo amoratado; las vesículas se forman tan grandes como chícharos y se llenan de un líquido de color amarillento. Los dolores son terebrantes, roedores y se extienden de la encía al oído, presentándose el prurito y escozor como anuncio de una mejoría.

Lachesis puede estar indicado en la prosopalgia, cuando el dolor es más intenso del lado izquierdo y cuando hay dolores desgarrantes alreadedor de la órbita y dolores terebrates al nivel del hueso malar. El delirio aparece tan pronto como los ojos se cierran; los dientes se carian y se caen a pedazos. Las encías están crecidas y azulosas y hay dolores vibratorios. Lachesis puede usarse con éxito en la periodontitis y en los abcesos de la raíz dentaria. (Compárece con Mercurius, Hepar y Silicea. Fluoric acid. y Petroleum).

De los remedios análogos en la odontalgía, ninguno le es tan semejante como Mercurius, el que, al igual que Lachesis, alivia cuando la encía está inflamada, los dientes cariados y hay abceso en la raíz. Se dice que tiene una acción directa sobre la dentina. Los dolores son desgarrantes y pulsativos y atraviesan del interior de la cara a los oidos. En Lachesis la encía está abultada y al mismo tiempo rojo-obscura y lívida, o se ve tensa y caliente y como sí fuera a reventar. Mercurius, empeora notablemente con el moderado calor de la cama. Lachesis puede seguirle a menudo y se hace necesario, cuando el paciente ha tenido con anterioridad cierta salivación; nada más que Mercurius tiene las encías sucias, con sus bordes blancos.

En los padecimientos de la boca, en las aftas, Lachesis debe ser comparado con Baptisa, Nitric acid, Muriátic acid., Arsencium y Apis, mientras que Mercurius tiene más semejanza con Carb. veg., Staphisagria, Kali cloric., Jodium, Sulphuric. acid. y Nitric, acid.

Baptisia produce escurrímiento de sangre en las encías, las que se ven rojo-obscuras o moradas; salivación, evacuaciones fétidas, siendo este último síntoma, justamente como en Lachesis. Ambos medicamentos pueden estar indicados en la estomigo, en los últimos períodos de la tisis. Se decidirá entonces por sus síntomas generales y además por el aspecto de la lengua que en Baptisia es amarilla o café en el centro, con sus bordes rojo brillantes, mientras que en Lachesis es roja, seca, reluciente, especialmente en la punta, teniendo sus bordes y la misma punta, cubierta de vesículas.

Nitricum acidum, produce una salivación acre; los dolores de la boca son de carácter punzante, como causados por una astilla; las aftas y las encías, son comúnmente blanquecinas, hay desolladuras y punzadas dolorosas.

Muriaticum acidum, ocasiona úlceras profundas de color azuloso intenso, con encías obscuras; la mucosa está despojada de su epitelio en algunos lugares, encontrándose a veces cubierta de aftas.

Arsenicum, tiene mucho parecido a Lachesis : encías lívidas que sangran, bordes de la lengua avejigados o diarrea ulcerante. El ardor es más intenso y va asociado de inquietud, obligando al paciente a cambiar de posición constantemente a pesar de su extrema debilidad. En la gangrena de la boca, ocasiona un dolor agudo y sensación de calor; ambos tienen úlceras gangrenosas de color azuloso; Arsenicum, tiene más irritabilidad mental.

Apis tiene vesículas en el borde de la lengua o dispuestas en racimo. La boca está comunmente rosada, hinchada y hay marcados dolores punzantes; el margen del la lengua se siente escaldado, así como el resto de la boca.

Carbo vegetabilis, Staphysagria y Sulphuricum acidum, concuerdan mas con Mercurius; las encías están blancas, esponjadas y ulceradas, más bien que lívidas. Staphysagria puede producir úlceras de aspecto rojo-azuloso o amarillo; es frecuentemente de mucha utilidad después del abuso del Mercurio o en casos de sífilis, cuando la debilidad general es muy notable; la cara está demacrada y hay un color azuloso alrededor de los ojos. Sulphuricum acidum, produce también gran debilidad; las encias blanco amarillentas y amarilla la piel; el paciente es nerviosos y precipitado y constantemente se queja de temblor subjetivo.

Salicilicum acidum produce las úlceras cancroides, acompañadas de ardor doloroso y aliento fétido.

Lycopodium produce úlceras semejantes cerca del frenillo de la lengua, Lachesis en la punta; Nitricum acidum, Phitolacca y Natrum hipochloratum en las paredes laterales de la boca. Phytolacca tiene una semejanza sistemática con Lachesis, tanto en estos síntomas como en los de la garganta. (Vease la siguiente conferencia). Ambas ocasionan gran debilidad, manchas obscuras, cara demacrada, circulos azules en rededor de los ojos, boca adolorida, lengua avejigada a lo largo de los bordes y la punta roja, bóveda palatina sumamente adolorida y profusa salivación. Phytolacca se distingue por el gran dolor que produce en la base de la lengua al deglutir.

Estos dolores son una parte de la sensación de magullamiento que se experimenta en todo el cuerpo.

Helleborus, produce también úlceras cancroides en la boca pero, éstas son amarillentas y con bordes salientes.

Volviendo a lo ya expuesto, de la caries dentaria, debe tenerse en cuenta que Kreosotum cura las odontalgias del lado izquierdo; los dientes se deterioran rápidamente; las encías sangran, siendo la sangre obscura, per olos dolores faciales concomitantes, son abrazadores; el paciente está excitable y nervioso, y aun pueden presentarse convulsiones como en los niños.

Thuja occidentalis, deteriora justamente los bordes de las encías, dejando aparentemente sana la corona de los dientes; la encía tiene un color rojo-obscuro a rayas; los dientes se vuelven amarillentos y se caen a pedazos.

Ahora, consideremos la acción de Lachesis sobre la nariz, garganta y

pecho y en lo que se refiere a las afecciones catarrales. Lachesis produce una descarga acuosa por la nariz, que es precedida frecuentemente por dolores vibratorios de cabeza, peores en la sien izquierda y en la frente y que se mitigan a medida que la coriza se establece; algunas veces acompañan a este coríza, vesículas en torno de la nariz, rubicundez, hinchazón de la cara y párpados; escalofríos que recorren todo el cuerpo, palpitaciones de corazón y gran relajación en toda la economía, por lo que conviene para los catarros que se presentan con motivo del cambio de tiempo, a la entrada de la primavera. Lachesis puede también ser empleado en el ozena de origen mercurial o sifilítico. Aqui puede compararse con Kali bichromicum, que sigue con toda propiedad al uso de Lachesis y también con Aurum, Nitricum acidum, Mercurius y Lac caninum. Este último medicamento cura el ozena sifilítico y la angina, cuando las comisuras de la boca y las alas de la nariz están agrietadas.

El catarro puede extenderse a la garganta, y entonces encontramos que las amígdalas están inflamadas, particularmente la izquierda y la inflammación tiende a propagarse a la amígdala derecha. Examinando la garganta, se advierte un tinte rojo no encendido, o rosado, pero azuloso. El paciente se queja continuamente de una sensación de como si se le cerrara repentinamente la garganta, o como si tuviera una masa en la faringe que le obliga a deglutir constantemente y que constantemente también reaparece. Los dolores del lado izquierdo de la garganta, se extienden a la lengua, a la mandíbula y al oído, siendo abrasadores.

El exterior de la garganta esta excesivamente sensible al tacto.

A menos que las amígdalas evolucionen la supuración, el paciente se sentirá mejorado por deglutir cuerpos sólidos, en tanto que la deglución de líquidos y la deglución en vacío, aumentará los dolores. Hago excepción de la supuración de las amígdalas, porque cuando están agrandadas y obstruyen las fauces, nada puede ser deglutido. Entonces el intento de la deglución es seguido de una violenta expulsión de los alimentos por boca y nariz. Pero con la afección catarral común de la garganta, cuando el proceso inflamatorio de las amígdalas no invade el parénquima, la deglución de los alimentos, con frecuencia mitiga la irritación por algún tiempo.

El proceso catarral puede seguir más adelante y descendiendo, alcanzar a los tubos bronquiales, desarrollándose entonces una serie diferente de síntomas; el paciente experimenta una tos irritante con cosquilleo en la garganta, que aparece generalmente cuando empieza a dormir, despertando como si fuera a ahogarse. No puede soportar que le toquen la garganta, por cuya razón se afloja el cuello de la camisa. Estos en resumen, son los síntomas catarrales de Lachesis.

Pero supóngase, mientras nos ocupamos de esta localización, que nos encontramos con otras afecciones más serias que pueden presentarse en esas mismas partes, la difteria, por ejemplo. Lachesis puede estar indicado en la difteria de una o de todas estas partes. Los síntomas que inclinarán a prescribirlo, serán los que ya se han

dado, a mas de los siguientes: el flujo nasal es delgado, sanioso y esoriante, síntoma objetivo, realmente peligroso. La garganta tiene un rojo más obscuro que en estado castarral. Las falsas membranas son más abundantes en la amígdala izquierda o tienden a extenderse de izquierda a derecha. Pronto se desarrolla el estado gangrenoso que se produce en las difterias acompañado de aliento fetido e inminente peligro de una infección general..

Los tejidos que rodean la garganta, están a menudo infiltrados a tal grando, que las glándulas y el tejido celular que rodea el cuello, forman prominencia. La inflamación puede ser tan grande, que el cuello llega a nivel del mentón y el esternon. Los ganglios linfáticos están infartados también, tienen un tinte purpurino-obscuro y amenzan supurar. Cuando hay formación de pus, éste no es loable. El niño está soñoliento aun cuando tenga fiebre; el corazón, aun cuando late con más rapidez de lo normal está evidentemente muy debilitado, como lo muestra la debilidad del pulso y la frialdad de las extremidades.

Esta es la variedad de difteria en la cual puede esperarse mucho del uso de Lachesis. La difteria puede extenderse a la laringe y el medicamento todavía estar indicado. De esto no se debe inferir que Lachesis es siempre el remedio para la difteria laringea, sino cuando se presentan los síntomas característicos que se han mencionado; el paciente despierta ahogándose y tiene tos diftérica o crupal.

Crótalus y Naja; al igual que Lachesis, han curado la difteria. Crótalus ha sido seleccionado cuando la epixtasis es persistente; sale sangre por la boca, que no proviene unicamente de la parte posterior de las fosas nasales, sino de las mucosas de la misma.

Naja ha ayudado justamente en casos como los de Lachesis, cuando la laringe está invadida; el paciente se lleva las manos a la garganta, experimenta una sensación de como si fuera estrangulado; las fauces son rojo obscuras; hay aliento fétido, accesos de tos ronca y corta, con sensación de desolladura en la laringe y parte superior de la tráquea.

Lac caninum, es muy semejante a Lachesis en la difteria, pero se distingue con seguridad por su característico "LADOS ALTERNANTES". Comienza en un lado, frecuentemente el izquierdo; los dolores, la inflamación y aun las membranas, repentinamente cambian al lado opuesto, para volver en unas cuantas horas al punto de partida; las membranas son amarillas grisáceas y hay formación de ulceras, que son brillantes.

Lycopodium, que también se asemeja a Lachesis, tiene agravación de sus síntomas de las cuatro a las ocho de la noche; el lado derecho es mas frecuentemente afectado; el niño despierta asustado o enojado.

Apis debe distinguirse por el edema de la garganta, los dolores aguijoneantes y las vesículas en el borde de la lengua, etc.

Nuevamente puede encontrarse a Lachesis prestando un enorme servicio en las afecciones pulmonares. Podemos usarlo en el asma

cuando estén presentes uno o varios de sus síntomas; el paciente despierta con el paroxismo asmático y no puede soportar la menor presión al rededor del cuello o del pecho; finalmente arroja una cantidad de flema acuosa que le produce gran alivio. Esto último, constituye un síntoma caracteristico de Lachesis en el asma; yo he tenido éxito con él, aliviando a un asmático durante algunos meses.

En la neumonía, Lachesis puede ser útil, pero no en los períodos iniciales de la enfermedad, puesto que no hay ningún detalle en los experimentos de Lachesis que sugieran su utilidad en la neumonia; no produce la ingurgitación de los pulmones, ni fiebre, ni exudado fibrinoso, pero puede estar indicado en los últimos períodos de la afección, cuando esta asuma una forma tifódica, especialmente cuando se forman abscesos en los pulmones. Aparecen síntomas cerebrales tales como el delirio musitante y alucinaciones. El esputo es espumoso, mezclado con sangre y purulento y el paciente está bañado en sudor profuso.

Sulphur es quizá el mejor remedio para impedir la supuración, cuando no hay síntomas tifódicos, pero debe tenerse cuidado de administrar Sulphur, si la tuberculosis se ha desarrollado a consecuencia de la neumonía, pues hacerlo asi equivale a dar un empellón a una persona que apresuradamente baja una colina; esto sería una manera de apresurar su llegada al fin.

En las afecciones del pecho, Elaps presta algunas veces gran servicio. Afecta al pulmón derecho, mas que al izquierdo, pero ambos pueden ser afectados; por las mañanas se presenta un dolor en el torax, lo suficiente severo, para impedir al paciente levantarse; los dos vertices estan afectados; hay una sensación de escalofrío en el pecho, después de beber. La tos va acompañada de intensos dolores de tórax, peor en vértice derecho, que se siente como si estuviera despedezado. El esputo esta constituído por sangre obscura. También produce una sensación en el corazón como si éste fuera oprimido.

Puede usarse Lachesis en la tisis, no precisamente para curarla sino para aliviar. Recuérdese, cuando en el curso de una tifoidea o neumonía, aparecen focos tuberculosos, en uno o en otro pulmón. Puede ser usado en los periodos avanzados de la tuberculosis, cuando el paciente tiene tos con arqueo que le despierta y termina con la expectoración de un esputo verdoso, mucu-purulento, que causa náuseas y más bien es vomitado que expectorado. Cada vez que el paciente duerme, se cubre de un sudor copioso alrededor del cuello, hombros y pecho, cuando las fuerzas han disminuído y el pulso indica una extremada postración.

Digestive Volvamos ahora nuestra atención al canal alimenticio empezando por la boca. He hablado ya de la lengua al tratar del estado tifódico. Lachesis es muy útil para la debilidad digestiva en los pacientes de costumbres viciosas o que han abusado del Mercurio, la Quinina o el alcohol; que han debilitado a tal grado sus estómagos, que aun el más simple alimento causa indigestión Los ácidos le perjudican de un modo especial, pues agravan los síntomas del

estómago y causan diarrea; algunas veces se experimenta un dolor roedor que se mitiga al comer; otras inmediatamente después de haber comido, pero pronto aparece una sensación de presión y pesantez en el estómago, así como otros síntomas de indigestión. Hay un deseo especial de tomar ostiones, los cuales pueden no hacer daño.

El hígado es afectado por Lachesis. Como todos los venenos de las serpientes, causa ictericia; se presentan los síntomas característicos y aun cuando se hayan formado abcesos, puede ser útil por razón de la sensibilidad a la presión, la intolerancia de los vestidos y profunda pulsación en el hipocondrio derecho.

Los síntomas intestinales no son numerosos aunque sí importantes. Nos encontramos con la diarrea causada por la droga, horriblemente fétida; pero más a menudo estreñimiento. Lachesis puede ser usado con especialidad en la diarrea cronica con debilidad muy acentuada y agravación en la primavera. La lengua está tersa, roja y brillante (Kali bich). El abdomen está abultado y muy sensible al tacto, especialmente al nivel de la cintura, hay agravación por el vino y los ácidos. Hay constante dolor en el recto, que no es ocasionado preciasamente por las evacuaciones, sino por un estado espasmódico del intestino y una irritabilidad molesta en el esfinter. El recto empuja y su espasmo es nulificado por el espasmo del esfinter. Cuando se logra la evacuación, frecuentemente queda una molestia en el recto, a manera de pequeños golpes de martillo. Estos síntomas son muy comunes en los dispécticos, particularmente en los que han abusado del alcohol.

Este estado de cosas, favorece la formación de hemorroides, que empeoran cuando la menstruación es escasa o en la época de la menopausia, acompañadas de dolores punzantes y que son proyectadas hacia afuera en cada estornudo o acceso de tos. Hay un estreñimiento muy acentuado, el paciente intenta evacuar haciendo todo esfuerzo, pero desiste en atención a los dolores que siente en el esfinter.

La dispepsia de Lachesis es muy semejante a la de Hepar, aún cuando este último medicamento tiene mejoría de sus síntomas por el uso de los condimentos.

Bajo la acción de Hepar, el más ligero alimento no sienta bien. Como si conociera instintivamente lo que puede tonificar su estómago, constantemente, desea condimentos y vino. Cuando come, se mitiga la sensación de relajación, pero el alimento, molesta tan pronto como el proceso digestivo se inicia lenta e imperfectamente. Los intestinos se mueven lentamente aun cuando las evacuaciones sean blandas.

China también entorpece la digestion y causa gran debilidad y desfallecimiento después de los alimentos. Siente marcado apetito por el café en grano. Las frutas le producen diarrea con fermentación intestinal; ambos producen plenitud después de comer, pero solamente en China esta plenitud es tan notable, que puede ocasionar dolor, con poco o ningún alivio al eruptar. Los eruptos y el

sabor amargo, son comunes en ambos remedios; China tiene el gusto alterado después de la deglución. El alimento da un sabor normal cuando es masticado.

Las evacuaciones intestinales son fétidas, lo mismo que los gases; las evacuaciones son sueltas, amaríllas, lientéricas; pero la marcada agravación por la noche y la postración que resulta después de los alimentos, la distinguen de Lachesis. En la disentería, etc., cuando las alteraciones pútridas o gangrenosas se producen, la elección del medicamento es más dificil. En los dos hay evacuaciones de olor cadaverico, de color achocolatado, con frialdad y gran postración. Y aunque China es de preferirse si la enfermedad es de origen palúdico, tal complicación no contraindica el uso de Lachesis. Esta semejanza es todavía más marcada por la excitabilidad mental que producen ambos medicamentos. El más ligero tacto es penoso, el epigastrio está muy sensible y la ropa molesta, pero en China la hiperestesia es general, mientras que en Lachesis hay entorpecimiento, con hiperestesia de los nervios cutáneos; el primero conviene, cuando después de las evacuaciones fétidas, sigue un estado inflamatorio grave que agota rápidamente, o cuando la frecuencia y cantidad de las evacuaciones ha comprometido notablemente la vitalidad, favoreciendo así los cambios retrogresivos; la elección del medicamento será mas segura si se presenta la fiebre héctica. Como complemento, podemos referir también los bien conocidos síntomas anémicos de China : palidez, tintineo en los oídos, fácil desfallecimiento, etc., lo que demuestra claramente que la sangre se encuentra afectada.

Mercurius presenta muchos rasgos de semejanza con Lachesis. Lachesis sigue frecuentemente a Mercurius y también antidotiza su abuso. Hay pérdida de apetito, lengua sucia, náuseas, opresión y sensibilidad en el epigastrio; la presión en esta región produce un mortal desfallecimiento. El estómago se siente colgante y pesado, aun después de una comida ligera, sencilla y de fácil digestión. La sensibilidad del estómago a la ropa, es parte de un síntoma que es completado por una igual sensibilidad a nivel de los hipocondrios, con sensación de plenitud y presión hacia arriba en el abdomen. El paciente no puede acostarse sobre el lado derecho; si es melancólico, está suspicaz, ansioso e inquieto por la noche, con eretismo vascular y sudor. Este eretismo es precisamente opuesto al estado de entorpecimiento de Lachesis.

En las inflamaciones abdominales con supuración, como tiflitis, ambos medicamentos son útiles y se siguen bien el uno al otro. Mercurius, tiene sudores constantes que no producen alivio y evacuaciones viscosas con gran esfuerzo, siendo este a vesces inútil para expulsarlas. Lachesis sigue cuando los síntomas indicados amenazan un estado tifódico. El paciente puede acostarse solamente en decúbito dorsal y los muslos flexionados; si se voltea del lado izquierdo, le parece como si una bola le rodara en el abdomen.

En el recto y en el ano, Mercurius produce un tenesmo más

persistente y prolapso del recto, que se ve inflamado y negrusco. Lachesis produce un tenesmo más espasmódico, con constricción del ano, que comprime fuertemente al recto prolapsado. Ambos producen estreñimiento crónico. El primero ocasiona mayor esfuerzo con evacuaciones tenaces y desmenuzadas y escalorfrío durante la evacuación.

Arsenicum, vuelve todavía más intensa la debilidad gástrica y general a que nos hemos referido justamente en los medicamentos ya estudiados. En tanto que el paciente no se da cuenta completa de la falta de sus fuerzas y de ahí que no sienta mucho interés por el reposo, a pesar de que su estado actual de vitalidad esté seriamente reducido. En una palabra: está sumamente débil sin experimentar sensación de fatiga. Cualquier esfuerzo produce desfallecimiento. el gusto está perdido o hay un sabor amargo, agrio o corrompido. En el estómago se siente plenitud, como si estuviera lleno de agua, sintiendo deseos de ingerir ácidos o café; este último, lo mismo que en Lachesis, mejora al paciente. Hay sensación de ardor, lengua roja ansiedad y dolor después de comer, como sucede en la gastritis sub-aguda, cuya imagen es reproducida como en ningún otro medicamento. La náusea frecuente y a menudo periodica (12 p.m.) es acompañada de gran postración. El vómito es muy variado distinguiéndose del vómito bilioso, viscoso o sanguinolento de Lachesis, por su carácter convulsivo e irregular, indicio de una irritabilidad gástrica. Lachesis se adapta a la debilidad nerviosa y al temblor de los bebedores; espasmos del estómago, constricción espasmódica, mitigada transitoriamente por comer; vómitos biliosos o glerosos. Arsenicum es propio para los dolores quemantes, periodicos, acompañados de sed vehemente y vómitos ácidos y picante, pero solo de agua.

Cadmium sulphuricum, tiene náuseas y vómito negro o amarillento, eructos salados, acedos, sudor frío de la cara, enardecimiento mordaz en el estómago, molestias en el bajo vientre y cólicos después de tomar cerveza. Cadmium, juntamente con Lachesis producen marcada sensibilidad al ser tocado el estómago o abdomen; hay dolores quemantes en distintas partes de esta región, asi como timpanismo exagerado (peritonitis); evacuaciones fétidas y sanguinolentas de color achocolatado, como en la disentería, acompañados de constricción y dolores incisivos en los intestinos; pero en Arsenicum, hay más quejas con expresión de lucha desesperada, inquietud y movimiento a pesar de los dolores. La constricción de los intestinos produce gran tormento; el paciente declara no poder resistirla y camina de un lado para otro lleno de angustia, desesperando de su vida. La extremada delicadeza del epigastrio, acusa un estado más positivo de inflamación aguda que el producido por Lachesis.

En el vómito de la fiebre amarilla, Lachesis tiene, además de la hiperestesia abdominal, un sarro café sobre los dientes.

Arsenicum también tiene prolapso espasmódico del recto, tenesmo

muy penoso acompañado de ardor; hemorroides, especialmente en los bebedores, que se prolapsan con ardor al defecar. Las evacuaciones albinas son fétidas, obscuras y algunas veces involuntarias, acompañadas de frialdad y gran debilidad; pero Lachesis tiene menos tenesmo rectal, siendo atribuído el dolor a la contracción espasmodica del ano, lo que no se encuentra en Arsenicum. Arsenicum, por otra parte, tiene excrementos más acres y producen escoriación en el ano.

Todo lo que he explicado aquí con relación a la diferencia de estos dos medicamentos, puede ser concisamente establecido así: Arsenicum, produce irritabilidad intense e inflamación aguda en los tejidos, angustia mental y extremada posturación; Lachesis, entorpecimiento con pérdida de la vitalidad asociado con excitabilidad nerviosa, constricciones e hiperestesia cutánea. Todavía, algunas inclinaciones (diversos estados morales) requieren más atención en sus detalles y cada uno tendrá conceptos generales mas exactos, si presta la debida atención sobre el particular.

Cuando hay ulceración en los intestinos y tendencia a la formación de escaras, con evacuaciones pestilentes, purulentas o sanguinolentas, los dos medicamentos son muy parecidos. La vitalidad está menguada; de la lengua y de los labios partidos, brota sangre y las extremidades están frías; pero aun aquí, las principales distinciones son : en Arsenicum, la irritabilidad mental y en Lachesis, la intolerancia a la presión.

Carbo vegetabilis se asemeja a Lachesis en la digestión débil, propia de los bebedores; en el asma flatulento, en la constricción del esófago, la intolerancia de la ropa a nivel de la cintura, en las evacuaciones pestilentes, sanguinolentas, descompuestas, purulentas, en el colapso, etc.

Con esta substancia hay apetito por el café, que no produce alivio. La leche perjudica en ambos medicamentos, pero solamente en el veneno de la serpiente, se siente deseo de tomarla. Carbo veg., tiene agravación por los alimentos grasosos, carnes descompuestas, pescados, ostiones, causando flatulencia, lo mismo que los helados, el vinagre y la col especialmente. Los eructos son agrios y acedos. En ambas substancias, la flatulencia tiene alivio por los eructos, pero además Lachesis tiene una sensación de malestar que se mejora por los eructos, pudiendo respirar más libremente en ambos medicamentos después de eructar. Esto se explica en Carbo veg., por la disminución de la tirantez hacia arriba de las inserciones costales del músculo diafragmático. En Lachesis hay alivio después de los eructos. que parecen producir sofocación y que aparecen repentinamente, ocasionando la constricción constante que produce en la garganta este remedio, que también tiene eructos en vacío (aerofagia) que intensifican los dolores.

Carbo vegetabilis, tiene pesantez, plenitud, somnolencia después de comer, con llenura tal, como si fuera a reventar; también hay aumento en el ardor del estómago. Esta pesantez es muy

característica e igualmente notable en el abdomen que parece colgar pesadamente y en la cabeza que se siente tan pesada como el plomo. El ardor va acompañado de una sensación como de reptación con propagación a la garganta.

En Lachesis, la plenitud y la presión, son causadas como por un plomo y la sensación de repleción produce abatimiento moral. Hay también la sensación de como si una masa se acumulase en el estomago y los intestinos; ardor con distensión dura del abdomen y como si una piedra fuera descendiendo; el enfermo necesita estarse quieto o andar con suma precaución. Problablemente esta pesantez, forma parte de esa constricción de Lachesis que tantas veces hemos mencionado como su característica. En Carbo. veg., los gases son mas pútridos y queman al pasar por el ano, siendo húmedos y fétidos. Su acumulación con sesación de quemazon, es una causa de muchos de sus síntomas y es más abundante que en el veneno de las serpientes. También produce molestias que descienden hacia la vejiga y la región sacra.

Lachesis alivia la gastralgia con dolor roedor, que se mejora por comer; carb. veg., cura cuando hay ardor con calambre constrictivo, obligando al enfermo a encorvarse; los dolores son paroxísticos e impiden la respiración. El ardor se extiende al pecho y desciende alcanzando el abdomen, siguiendo al parecer, el trayecto del simpático.

El tenesmo rectal es prominente las más de las veces en Carb. veg., y la constricción anal en Lachesis. Como hemos observado antes, este último síntoma es el que nos explica el ineficaz esfuerzo para evacuar mientras que en Carb. veg., esta ineficacia en el esfuerzo, es debida a la presión de los gases. Ambos producen hemorroides azulosas y salientes como despues de una orgia, pero la constricción, asi como el dolor de cabeza y la diarrea, los hacen distinguirse. En los dos, hay dolores vibrantes de cabeza, pero Carb. veg., tiene más pesantez y la diarrea es más líquida.

En los estados tifódicos, y se trate de una fiebre específica o en el curso de una peritonitis, disentería, etc., Carb. veg., produce el más pefecto cuadro del colapso; mientras que en Lachesis la debilidad cardíaca, la somnolencia, las extremidades frías, etc., indican la pérdida de la vitalidad aun cuando el paciente no esté próximo a morir, como sucede en la primera droga. En el colapso de Carbo. veg., hay timpanismo, piernas frías, generalmente hasta las rodillas, pulso filiforme, respiración lenta, ausencia de las evacuaciones intestinales, o si las hay, éstas son involuntarias, pútridas, sanguinolentas y purulentas.

En la hernia, Carb. veg. tiene ansiedad como en Arsenicum, pero que se presenta más bien con desasosiego, que con inquietud y cambio de lugar; se asemeja a Lachesis en la moslestia que producen las ropas, en la plenitud de las partes como si estuviesen estranguladas, etc., hay sin embargo mas meteorismo y gases fétidos.

Graphites, tiene ansiedad y melancolía; la punta de la lengua

avejigada; sensación de una masa que comprime el lado izquierdo de la garganta, sobre la cual parece pasar el alimento con dificultad; en la deglución en vacío hay una sensación de constricción del esófago a la laringe; hay necesidad de aflojarse las ropas después de comer y gastralgia que disminuye precisamente después de haber comido; está indicado en gastritis crónia, especialmente si ha sido causada por el abuso de las bebidas alcohólicas. Sensación de un estorbo en el estómago; timpanismo del abdomen con congestión cefálica; espulsión de gases pestilentes. Accesos de sofocación que despiertan al enfermo, viéndose obligado a saltar de la cama de la cama y a comer algo para calmar su angustia. Las evacuaciones son fetidas.

Pero este medicamento produce mas flatulencia que Lachesis. Los dolores gástricos son quemantes, opresivos y pertinaces y la sensación de cuerpo extraño en el estómago, viene acompañada de constante latido; los eructos son acedos. Los períodos de sofocación se agravan generalmente después de las doce de la noche, en vez de ser después de dormir a cualquiera hora. Al quedarse dormido, siente la constricción en el pecho y no en la laringe. El contenido intestinal es incompletamente asimilado; las evacuaciones son obscuras y pastosas, indicando la imperfecta digestión que es tan carateristica en este medicamento.

Hay alguna semejanza entre los síntomas constitucionales de Graphites y Lachesis, por lo que en algunas ocasiones es necesario el uso de ambos medicamentos en subjetos de temperamento flematico, pero Graphites tiene un grupo de caracteres que lo distinguen de Lachesis y está especialmente indicado en personas obesas, frías y estrenidas; piel herpética, áspera y propensa a partirse, segregando un fluido glutinoso.

Prescindiendo entonces de los síntomas que lo asemejan a Lachesis Graphites se parece más a Arsenicum, Nux vóm., y Lycopodium; a los dos primeros, en la gastritis y en la gastralgia y al último en la flatulencia.

Sulphuricum acidum se asemeja a los venenos de las serpientes, especialmente en las indisposiciones de los bebedores. Sin embargo, los efectos corrosivos que se encuentran en la inflamación del canal digestivo, lo caracterizan de manera especial; pero el sistema nervioso está tan comprometido, que varios síntomas se parecen a Lachesis; tales son la sensibilidad del epigastrio, la sensación de constricción en los intestinos, siendo éstos pertinaces, mordentes y de torsión, acompañados de náusea, temblor, desmayo, cara pálida, aprehension, alteraciones del pulso, constricciones de la laringe, el paciente no puede deglutir, estrechez esofágica, gran débilidad, etc. Los dos medicamentos despiertan apetito especial por el aguardiente.

Sulphuricum acidum actuí bien cuando el paciente está débil, extenuado y se queja de temblor, el cual no obstante es más subjetivo que objetivo. Está impaciente y no puede dormir. Necesita hacer todas las cosas precipitadamente. La cara está pálida y algunas veces presenta partes secas y arrugadas, especialmente cuando

empeoran las hemorroides. Los eruptos son agrios, el estómago se siente relajado y frío. El vino puede aliviar y las bebidas espirituosas agravan los síntomas, como sucede en Lachesis; pero la particularidad en el Sulphuricum acidum, es que el estómago rechaza las bebidas frías, a menos que estén mezcladas con aguardiente. Los músculos abdominales se contraen espasmódicamente. Las evacuaciones son amarillas como en Lachesis, pero presentan un aspecto como de "picadillo" y son filamentosos, repulsivos y aguados, con carácter diarréico. Las hemorroides son húmedas, quemantes y pueden impedir la defecación.

Como el Sulphuricum acidum produce formas crupales. deberá recordársele con Lachesis, cuando los excrementos indican tal condicion en los intestinos.

El Sulphuric. ac., también se asemeja a Elaps, en que las bebidas se sienten intensamente frías en el estomago, nada más que el primero produce alivio al tomar el agua mezclada con aguardiente.

También la diarrea de Lachesis se parece a la producida por Elaps, solo que este ultimo medicamento, esta particularmente indicado, cuando las evacuaciones son obscuras, de sangre espumosa y acompañadas de colicos intestinales.

Colchicum merece mención especial aquí, puesto que es semejante a Lachesis; produce sensación de frío en el epigastrio (Elaps), intolerancia a la presión de la ropa, ardor en el estómago, vómito y diarrea con espasmo del esfinter, urgencia de evacuar, gases pestilentes, diarrea igualmente corrompida, sensibilidad al menor tacto, marcadísimo agotamiento, respiración lenta y pulso débil. Pero generalmente se presenta la náusea que se agrava por el olor de los alimentos; si el enfermo se sienta o se acuesta permaneciendo quieto, el vómito cesa (como el Veratrum). Los sentidos se agudizan extraordinariamente; una luz brillante, un ruido o un olor fuerte, lo irritan, (como en Nux vom).

El vómito y la diarrea son semejantes a los que produce el cólera morbus; el esfinter se contrae después de cada evacuación, resultando a veces infructuoso el esfuerzo. La semejanza existe entonces principalmente en la hiperestesia al tacto y en la constricción de los esfínteres, con debilidad; son los demás síntomas tan diferentes, que permiten hacer una fácil selección. (Véase más adelante).

En el cólera se ha empleado Lachesis, cuando el vómito reaparece por el más insignifiacante movimiento y la náusea es seguida de salivación profusa y como Colchicum, tiene precisamente los mismos síntomas, debe atenderse a otros detalles que decidan su elección.

En irritaciones de origen reflejo, como las convulsiones que aparecen en los niños durante la dentición, acompañados de evacuaciones veteadas y viscosas, y movimientos rotatorios de la cabeza, Colchicum se parece a Podophillium.

Belladonna, Lachesis, Rhus tox., y Baptisia, constituyen un grupo de mucha utilidad en las peritionitis, enteritis, etc.

Belladonna difiere de todos los demás por el carácter de la inflamación; los otros remedios son necesarios, cuando la afección llega a tomar carcáter asténico. Lachesis sigue bien a Belladonna especialmente en los niños, cuando con la diarrea inflamatoria, el estreñimiento aparece repentinamente, con inflamación abdominal e hiperestesia particularmente localizada; o cuando la supuración sobreviene y Mercurius falla, o por último, cuando amenaza la gangrena.

Lachesis tiene indicaciones tardías en la enfermedad cuando la fiebre continva y es peor después de medio día y en la noche, cuando el más leve tacto resulta intolerable; cuando los síntomas tifodicos complican el caso y por último, puede aún ser indicado, cuando hay tiflitis, después de la formación del pus. Sigue bien, después de Belladonna, Bryonia o Mercurius corros; es también semejante a Rhus tox., pero predominando los síntomas tifódicos, interviene más tarde en el caso.

Rhus tox., es requerido cuando hay adormecimiento, permaneciendo la fiebre alta, acompañada de inquietud, lengua seca y tostada, café, presentando en la punta un triángulo rojo. Hay diarrea viscosa, aguada y pútrida, café-amarillenta y sanguinolenta, involuntaria durante el sueño y generalmente acompañada de sensación de dislaceración en los muslos; mientras que en Lachesis hay rigidez dolorosa en la región lumbar, que se propaga a los muslos. En Rhus la tiflitis puede tener alivio por una presión suave ejercida de abajo arriba, pudiendo administrarse después de Belladonna o Rhus. En Lachesis hay intolerancia al tacto.

En la peri-proctitis, Rhus toxicod., puede ser de mucha utilidad si la inflamación es de origen traumático. Lachesis cuando se forma un abceso frío y los tejidos circunvecinos toman un tinte purpurino.

Colchicum debe compararse con Lachesis cuando la postración es extrema, llegando hasta el coma, el abdomen está caliente, las extremidades frías y el pulso es filiforme; si el paciente levanta la cabeza, cae pesadamente hacia atrás y la mandíbula inferior se relaja. La facies es hipocrática; la lengua sale con dificultad y hay evacuaciones intestinales involuntarias. La timpanitis es más marcada en Colchicum y las evacuaciones contienen tempanos desmenuzados; la lengua esta frecuentemente cubierta de una gruesa capa café o rojo brillante, excepto en la raíz, en donde está sucia. De acuerdo con las experimentaciones y las observaciones en los casos de envenenamiento, Colchicum no produce hiperestesia abdominal por debajo del epigastrio.

En Arnica montana, se produce un profundo estupor, acompañado de respiración jadeante, lengua seca y cafe en el centro, el abdomen distendido, habiendo evacuaciones intestinales y micción involunarias. Se caracteriza por las equimosis y el dolor contuso que impiden al paciente dormir, sintiendo mejoría por quitar las arrugas de la cama y por el cambio constante de posición.

Entre los medicamentos que producen constricción del ano, los

siguientes son dignos de mencionarse: Belladonna, Causticum, Nitricum acidum, Natrum muriaticum, Ignatia amara, Kali bichromicum, Opium, Plumbum, Mezereum y Cocculus.

Belladonna tiene pesantez y tirantez hacia el ano y órganos genitales, alternando con contracciones espasmódicas del esfinter anal, como sucede en la disentería.

Causticum produce tenesmo, con esfuerzos inútiles, acompañado de ansiedad y cara roja.

Nitricum acidum produce sensación de pinchazos en el recto y molestias como las que ocasiona una astilla; la constricción tiene lugar durante la evacuación y dura algunas horas después de ella, sintiéndose el recto como desgarrado.

Natrum muriaticum, produce una constricción en el recto durante las evacuaciones intestinales, las heces dislaceran el ano; hay deseos frecuentes e ineficaces de evacuar y contracción espasmódica del mismo.

Ignatia produce proctalgia y contracción con dolores y punzadas cortantes; la contracción del ano es peor después de evacuar; los síntomas son inopinados, irregulares, espasmódicos, presentándose por accesos, como sucede en la histeria.

Kali bichromicum produce sensación de cuerpo extraño semejante al de Lachesis; diarrea acuosa, espumosa y de color café, que sale disparada y se presenta en la madrugada siendo seguida de tenesmo rectal.

En Opium, el esfinter anal está contraído espasmódicamente durante el colico y hay una constipación persistente, en esto es muy semejante a Plumbum.

Todos estos medicamentos son fáciles de distinguir de Lachesis por los síntomas característicos de éste: necesidad urgente en el recto, que atormenta al paciente; la constricción del ano llega a ser tan dolorosa, que obliga al enfermo a desistir del intento de evacuar; hay además hemorroides procedentes con constricción anal.

Mucho más semejante y casi idéntico, es todavía Mezereum; después de evacuar, el recto prolapsado, es constreñido por el esfinter. En cuanto a lo demás, los dos remedios, son completamente diferentes.

Kali bichromicum debe ser recordado también como correlativo de Lachesis en la disentería. Ambos tienen lengua roja, partida, tersa, con evacuaciones negruscas; siendo en consecuencia los dos medicamentos útiles en estados tifódicos graves, siguiéndose bien el uno al otro. El olor fétido de las evacuaciones pestilentes, caracterizan perfectamente bien a Lachesis; así como el aspecto gelatinoso y en ocasiones moco filamentoso, hace distinguir a Kali bich. Una carácter peculiar de Cocculus, es el tenesmo después de la evacuación, acompañado de desaliento y movimientos peristálticos disminuídos. (Compárese con Ignatia).

Estas evacuaciones fétidas son tan características de Lachesis, que la hacen idealmente indicada en las enfermedades adinámicas. En estos

casos, puede darse Lachesis confiadamente. El recto y el ano están afectados de tal manera que hay tenesmo rectal molesto, sin lograr la defecación. Es meramente un estado espasmódico de los intestinos, con una irritabilidad extrordinaria del esfinter. Otro síntoma es el siguiente : el paciente está deseoso de hacer esfuerzos al defecar, impidiéndoselo el dolor; el recto se prolapsa y queda comprimido por el esfínter; después de la evacuación, hay una sensación en el recto como si éste fuera golpeado por pequeños martillitos.

Estos síntomas son bastante comunes en los dispépticos, particularmente en los alcohólicos.

En la peritonitis Lachesis está indicado en los estados avanzados, cuando la fiebre continúa, con agravación después de medio día y en la noche. Hay intolerancia de la superficie del cuerpo al más ligero contacto.

El caso está complicado con síntomas tifóidicos. Puede estar indicado cuando se presenta la tiflitis después de la formación de pus. Sigue particularmente a Belladonna, Bryonia o Mercurius cor. También es semejante a Rhus tox., pero tiene más síntomas tifódicos que éste y está indicado en estados más avanzados de la enfermedad.

Lachesis causa en el sexo masculino un aumento de lascivia, disminución de las fuerzas fisicas. La mente es presa de toda clase de tentaciones, pero la ereccion y la eyaculación son imperfectas.

Sobre los órganos sexuales femeninos, Lachesis actúa de un modo muy poderoso. Parece tener una afinidad especial sobre los ovarios, especialmente el izquierdo; la ovaritis, la ovaralgia y los tumores, pueden ser aliviados cuando hay hiperestesia a la presión de las ropas y los otros síntomas característicos de la droga. Las menstruaciones son escasas, débiles, de sangre grumosa, obscura y muy fétida : dolores en la pelvis, predominando a nivel del ovario izquierdo, que mejoran cuando el flujo se establece. El útero no tolera la más moderada presión.

Lachesis puede ser usado en la metritis puerperal, especialmente cuando los loquios son fétidos; la cara esta amoratada y la paciente está en estado inconsciente.

Está indicado en los tumores de los ovarios, cuando el mal tiene una tendencia a prolongarse del lado izquierdo al derecho; cuando la supuración haya tenido ya lugar. A Lachesis se recurre especialmente después de Hepar o Mercurius, cuando hay adinamia produnda.

En la sífilis se recurre a Lachesis como antídoto del mercurio o cuando el chancro llega a ser gangrenoso. Sus características deben ser buscadas en el peculiar dolor de la garganta, contorno azuloso de las úlceras, dolores de cabeza y osteócopos nocturnos y en el chancro fagédenico.

Las úlceras sifilíticas en las piernas son planas y de contornos azulosos; hay caries en la tibia y las partes afectadas están sensibles y lívidas. Puede también después del abuso del mercurio, haber ulceras en la garganta y dolores osteócopos nocturnos.

En las úlceras azulosas se asocia con : Hepar, Asofætida,

Lycopodium, Silicea y Arsenicum; en las erupciones, vesículas o pústulas que rodean las úlceras, se asocia con : Arsenicum, Phosphorus, Lycopodium, Mercurius Hepar, Silicea, etc.; en lo quemante de la úlcera, con : Arsenicum, Lycopodium, Mercurius y Silicea; en el pus fétido, se asocia con: Arsenicum, Asafoetida, Lycopodium, Silicea Sulphur y Hepar; en las úlceras planas, con : Arsenicum Asafastida, Lycopodium, Mercurius, Silicea, Phosphoricum acidum, etc.; si llegan a ser obscuras o gangrenosas, con: Arsenicum, secale, Silicea, Plumbum, Carbo veg., Euphorbium y Muriaticum acidum. Pero Lachesis tiene más marcado el ardor cuando la úlcera se toca. La piel circunvecina está jaspeada. Las úlceras sobre las piernas, tienden a extenderse superficialmente, mas bien que a ahondarse como en Kali bich., la secreción es escasa y las fuerzas están agotadas. Obscuras vesículas circundan las úlceras y la piel contigua está marchita. Algunas veces la secreción cesa y el paciente esta torpe, frío, llegando a ponerse la pierna edematosa y a aparecer una hinchazon roja a lo largo de las venas, demostrando con esto que la flebitis existe.

En todo esto se parece a Arsenicum, a carbo veg., a Bufo, a Secale, a China, etc., pero Arsenicum presenta más excitación vascular e irritabilidad nerviosa con postración; Carbo veg., lleva todavía a mayor postración de lo que hace Lachesis, hay sudor frío, aliento frío y colapso. La úlcera tiene un olor cadavérico. En los casos leves, no hay semejanza entre los dos medicamentos; puesto que Carbo veg., causa mucho ardor, con excoriaciones en los repliegues de la piel; los bordes de las úlceras están indurados, pero no tan sensibles como en Lachesis.

Hepar debe ser recordado como un concordante de Lachesis, especialmente porque es tan útil después de los abusos del mercurio. Los contornos de la úlcera son muy sensibles, pero con el dolor, hay una sensación de magullamiento, simultáneamente con la hiperestesia y aun cuando la parte que supura puede volverse azulosa y el paciente experimentar debilidad, hasta aquí no hay evidencia de la pérdida de la vitalidad, ni de gangrena como sucede con Lachesis.

Lycopodium es otra vez aquí un complementario de Lachesis, si las úlceras sifilíticas que aparecen en la garganta son de un color obscuro o amarillo grisáceo, más marcadas en el lado derecho. La frente exhibe una erupción cobriza y el resto de la cara está pálida, frecuentemente arrugada, pero carece del retículo rojo de las pequeñas venas, que se deja ver a través de la piel amarillenta de Lachesis. Los chancros son tórpidos; los condilomas pediculados; las úlceras de las piernas son rebeldes a la cicatrización y hay una sensación de ardor y desgarradura que se empeora por la noche; empeoran también por los emplastos y por cualquier intento de curación. El pus es a menudo de color amarillo oro; hay dispepsia flatulenta.

Nitricum acidum es también semejante a Lachesis en el chancro

fagedénico, en las úlceras de la tibia, etc., pero puede distinguirse fácilmente por los bordes irregulares de la úlcera, la cual se presenta exuberante y sangrando fácilmente sus granulaciones. Los síntomas de la boca y la garganta pueden diferenciarse fácilmente por las grietas de las comisuras de los labios, la sensación de una astilla en la misma, etc.

Kali iodatum presenta una serie de síntomas muy diferentes a los de Lachesis; hay dolores terebrantes y roedores en los huesos largos, vibración y ardor en los huesos de la frente y la nariz, ozena con secreción amarillo-verdosa; pápulas que se ulceran y dejan costras; rupia; chancros con bordes duros y pus espeso; las úlceras crecen en profundidad; hay violento dolor de cabeza, mas intenso que el producido por Lachesis, originando nudosidades duras en la cabeza; tendencia a infiltraciones intersticiales de los tejidos blandos y también los huesos, más extensas que con Lachesis, que solamente infiltra los tejidos blandos.

Para los síntomas de Lachesis en lo que se refiere a ovario y útero, hay que fijar la atención en las siguientes comparaciones:

Platina tiene menstruaciones obscuras y profusas en vez de escaso flujo y las ideas de grandeza son mucho más pronunciadas. La ninfomanía viene acompañada de titilaciones y comezón de los genitales o de vaginismo. En las afecciones de los ovarios, esta droga cura después de que Lachesis ha fracasado o también cuando la supuración del ovario, ha sido evacuada por la acción de Lachesis. Los dolores son quemantos, acompañados de violenta sensación de presión hacia abajo.

Palladium produce alivio en la dureza e hinchazón del ovario derecho como sucede con Lachesis.

En lo que se refiere a los síntomas mentales los dos son muy diferentes; en Palladium se produce un egotismo que se revela en el interés que tiene el enfermo de la buena opinión que de el tengan todos los demás; en consecuencia la presunción de la paciente, hace que su amor propio con frecuencia se sienta herido. Las emociones mentales agravan los dolores de los ovarios, pero de un modo diferente a como sucede en Lachesis. La paciente de Lachesis está arrobada o por lo menos excitable y las narraciones novelescas la incitan a llorar; la paciente de Palladium se afecta fácilmente en sociedad; una coversación animada o el entretenimiento de la tarde, aumenta su malestar y acrescienta también su fatiga física y mental.

Es las afecciones de los ovarios, Apis se coloca con todo derecho - como aliada de Lachesis, pero actuando de preferencia sobre el ovario derecho; hay sensación dolorosa de magullamiento, punzadas y ardor. Otras veces los dolores se presentan con carácter lancinante.

En los prolapsos del útero o durante la menstruación, hay una pesantez localizada en el ovario derecho, acompañada de fatiga y escurrimiento mucoso escaso y obscuro.

Ambos medicamentos tienen dolores que se propagan del ovario izquierdo al derecho, pero en Apis, éstos se presentan al estirarse.

Hay también una hiperestesia muy característica en las fosas iliacas; en ambos, el dolor tiene irradiaciones ascendentes, pero en Apis se colocan de preferencia en el ovario derecho y van acompañados de dolor en la región pectoral izquierda y tos.

En los síntomas mentales hay una gran semejanza; (vease acción mental) ambos despiertan los celos, con locuacidad y aumento del deseo sexual, inquietud y bulliciosas maneras.

Arsenicum afecta a los ovarios y útero y produce metrorragia de sangre obscura, con auménto también del deseo sexual; pero este poderoso medicamento, afecta de preferencia al ovario derecho, con marcado ardor, sensación de tirantez e inquietud, que algo se mejora por el constante movimiento de los pies; el cólico menstrual mejora por aplicaciones calientes.

Lycopodium, produce dolores que se propagan en sentido opuesto a los de Lachesis, yendo del derecho al izquierdo; sus síntomas gastroentéricos, se encuentran siempre presentes.

Aunque Graphites afecta más frecuentemente al ovario izquierdo, aliviara los dolores en el derecho si van seguidos de un escurrimiento vaginal, pero este medicamento y Lachesis difieren en su temperamento.

Un síntoma marcadísimo de Lachesis, es el alivio de los dolores, cuando aparece el flujo sanguineo. Campárese con Moschus en el que el dolor se adelanta al comienzo de la menstruación y cesa cuando el flujo menstrual se establece. Zincum produce alivio en los dolores terebrantes del ovario izquierdo, justamente como sucede en Lachesis.

Platina y Amonium carbonicum, producen dolores que persisten todo el tiempo del flujo; el primero, aun cuando sea abundante el escurrimiento y el segundo, con flujo entre los dolores. En Actea racemosa, mientras más abundante es el flujo, más intenso es el dolor.

Veamos ahora la acción de Lachesis; sobre el corazón, la circulación y los estados febriles; como ya se ha dicho, afecta notablemente a la circulación; produce bochornos como en la menopausia, aflujo de sangre a la cabeza, con frialdad de pies, palpitación del corazón, como si estuviera éste comprimido fuertemente por unas cuerdas. Estos últimos síntomas, con la opresión del pecho, con la disnea al despertar y la imposibilidad para permanecer acostado, ha conducido al uso de Lachesis en el hidrotórax e hidropericardio, cuando depende de una lesión orgánica del corazón.

Lachesis está indicado en la hidropesía general, cuando la orina es obscura, casi negrusca, contiene albúmina y la piel que cubre las partes edematosas, es de una color obscuro o negro azuloso.

Recuerdo a un hombre de sesenta años, que tenía justamente esta clase de hidropesía, que continuo viviendo por seis meses más bajo la acción de Lachesis y cuya muerte, cuando se presentó fué sin dolores. Es util especialmente en la ascitis consecutiva a la escarlatina y en la ascitis de los bebedores, cuando estan presentes

los síntomas arriba indicados.

En las afecciones renales y vesicales, se recurre a Lachesis, mas por los síntomas generales que por los locales; de consiguiente en la albuminuria, en el mal de Bryght, se decidirá por su indicación, cuando los síntomas respiratorios, la agravación después del sueño y la superficie del cuerpo azulosa, estuvieran presentes, sin fijarse solamente en los síntomas urinarios. En la cistitis, está indicado el medicamento, cuando la fetidez de las mucosidades, revela la tendencia general y característica a la putrefección y mientras más notable sea la falta de proporción entre la fetidez de la orina y el tiempo que el moco ha estado retenido en la vejiga, será más clara la indicación de Lachesis.

En la hematuria, este medicamento, lo mismo que su poderoso rival Crotalus, puede estar indicado cuando síntomas ocurren como evidente manifestación de la alteración cualitativa de la sangre, como sucede en las infecciones graves, encontrándose los característicos sedimentos de glóbulos rojos deformados, fibrina, etc., teniendo el aspecto de paja carbonizada. En la albuminuria post - escarlatinosa, hay hidropesía con retardada descamación, la orina está obscura y mancha de negro. En este aspecto manchado, se parece Helleborus. Otros medicamentos que tienen orina negra, se parece a Helleborus. Otros medicamentos que tienen orina negra, son : Colchicum, Natrum muriaticum, Carbólicum acidum y Digitalis.

Apis, Amonium benzoicum, Arsenicum, Bezoicum acidum, Arnica montana, Opium, Carbo vegetabilis, Kali carbonicum y Terebinthina, producen orina turbia y obscura. Solamente Lachesis tiene orina espumosa, y las característica generales tantas veces mencionadas.

Helleborus, debe distinguirse por la apatía sensorial, la debilidad muscular, la cara palidá e hinchada y la diarrea mucosa de aspecto gelatinoso, que acompaña a la hidropesía. El paciente puede respirar mejor cuando está acostado, lo que es precisamente contrario a lo que sucede bajo la acción de Lachesis y Arsenicum.

Digitalis produce orina escasa, turbia y negruzca, desvanecimientos a causa de la insuficiencia cardíaca y cara lívida, pareciéndose en esto mucho a Lachesis; en éste hay más constricción laríngea, así como opresión y constricción del pecho. En Digitalis, la constricción sofocante se experimenta como si las visceras torácicas, todas al mismo tiempo, estuvieran aumentadas de volumen; tiene también desfallecimiento gástrico, como si la vida se estuviera extinguiendo.

Terebinthina produce orina nebulosa y turbia, depositando un sedimento como de café molido. Está frecuentemente indicado en la hidropesía después de la escarlatina; el sedimento contiene glóbulos rojos semidestruídos; hay hematuria y dispnea, el paciente necesita estar sostenido en la cama y hay un marcado sopor; la lengua está seca y lustrosa. Clínicamente, Terebinthina puede ser útil al principio de las afecciones renales, esto es, cuando los fenómenos congestivos predominan, antes de que aparezcan abundantemente los cilindros renales. Causa más intenso ardor y dolor en la espalda, de lo que

sucede en Lachesis y la orina puede tener olor fuerte, (como de violetas). En la fiebre tifoidea, tanto la orina como las evacuaciones albinas, se asemejan a las de Lachesis. Las evacuaciones de vientre son pestilentes, hay hemorragias intestinales producidas por las ulceraciones; la sangre es obscura y digerida, semejándose en su aspecto, al café molido. La orina es fétida y sanguinolenta; además Terebinthina, produce estupor y lengua seca, lisa y lustrosa, acompañada de gran debilidad, pero se distingue de Lachesis por la preponderancia del timpanismo con ardor y lengua lisa, como si hubiera perdido sus papilas.

Apis se parece a Lachesis en los casos de hidropesía rápida post - escarlatinosa; en ambos medicamentos hay albuminuria y orina escasa y obscura a causa de los elementos sanguíneos que contiene; todo esto, acompañado de disnea; en Apis, sin embargo, hay ausencia de sed, la piel es pálida como de cera y hay erupcion diseminada, semejante a la urticaria, pústulas rojas o de aspecto erisipelatoso rosado y los miembros inferiores están edematosos.

Arsenicum es necesario en los casos de afecciones renales, cuando la orina escasa y albuminosa sin sangre; puede estar indicado por sus síntomas cardíacos, su inquietud mental, etc. Con estos detalles, nada es necesario ya para diferenciarlos; pero si la orina es obscura, turbia y sanguinolenta, dejando un sedimento de pozo de café, si hay ortopnea con frialdad en las piernas, gran dificultad para respirar mientras no se expulsan las flemas y constricción espasmódica de la laringe, estonces sí, deben establecerse comparaciones más detalladas. Arsenicum curará cuando la orina tiene el aspecto de agua sucia y los cilindros renales son abundantes; la dispnea es más marcada cuando el paciente intenta acostarse por la noche y siempre despierta después de las 12, todos estos síntomas mejoran por la expectoración de la mucosidad. En Lachesis la disnea empeora, cuando, después de acostarse el enfermo, empieza a dormir; la mejoría se inicia después de un vómito o expectoración de una pequeña cantidad de moco adherente; hay además más molestia por el contacto de las ropas, que en Arsenicum. En este último medicamento, la ropa se afloja, porque estando cañida, parece asfixiar al enfermo; en cambio en Lachesis, hay una hiperestesia notable.

Colchicum produce una intensa congestión de la mucosa gástrica, de la entérica y también de los riñones. La orina es obscura, turbia, albuminosa, sanguinolenta y negra como tinta; hay hidropesía.

Pero Colchicum se distingue de Lachesis, por la irritación notable del esfinter vesical, con tenesmo y escoriación después de orinar. Se indica especialmente en los pacientes gotosos, que al mismo tiempo sufren de una debilidad nerviosa que va acompañada de exquisita sensibilidad. Si este último síntoma parece confundirse con Lachesis, se distinguirá por los efectos generales que produce Colchicum, particularmente su exquisita sensibilidad al tacto (excepción hecha, tal vez, del abdomen timpanizado) mayor impresionabilidad de los

sentidos y muy principalmente para los olores fuertes; los síntomas gástricos son muy marcados; el trabajo mental fatiga y produce incapacidad para fijar las ideas o discurrir coherentemente; hay cefalalgia, el cuero cabelludo se siente tenso; la lengua esta sucia; hay náuseas y gran debilidad, sin embargo se exaspera fácilmente por las impresiones exteriores. Un síntoma muy característico de Colchicum, es que cuando hay salivación profusa y orina copiosa, las evacuaciones intestinales por el contrario son escasas y van acompañadas de pujo.

No necesito tratar más acerca de la fiebre que produce Lachesis, porque ya se hizo mención de ella, al hablar de los síntomas mentales de la droga, sin embargo, me ocuparé de la fiebre intermitente.

Esta se presenta durante la primavera, a pesar del uso constante de la quinina durante el otoño; el calosfrío tiene lugar entre dos y tres de la tarde y durante el mismo, hay un síntoma característico: el enfermo siente necesidad de tener la ropa amontonada, no tanto para conservarse caliente, sino para poder estar quieto; desea ser sostenido fuertemente para soportar el sacudimiento y los dolores que experimenta en el pecho y la cabeza; la fiebre se caracteriza por el intenso ardor, por la opresión del pecho y el corazón y por el inseparable amodorramiento y locuacidad.

El deseo de ser sostenido durante el escalofrío, también es característico de Gelsemium.

Carbo veg., como Lachesis, tiene repetición anual de los accesos, locuacidad durante el estado febril, ansiedad y respiración difícil. El paciente se encuentra agotado por la prolongada enfermedad y por el abuso de la quinina, pero la sed es exagerada durante el escalofrío y no antes de él; el escalofrío es acompañado generalmente de aliento frío y frialdad de las rodillas, aún cuando esté bien arropado en la cama; bochornos durante los accesos vespertinos y ausencia de sed; hay flatulencia, un lado del cuerpo está frío, generalmente el izquierdo y el colapso es bien marcado.

Capsicum, también presenta sed antes del escalofrío, deseo de calor moderado, el escalofrío comienza en el dorso y el pulso es irregular e intermitente; pero en este medicamento, el escalofrío comienza en el dorso, de donde se extiende a las demás partes del cuerpo; la sed continúa durante el escalofrío y el paciente se agrava por tomar agua, como en Elaps. El enfermo experimenta alivio por la aplicación de botellas calientes al dorso.

Menyanthes es de preferirse cuando la enfermedad se manifiesta por frialdad en los lóbulos nasales, y de los oídosy las extremidades de los dedos de las manos y de los pies. De la rodilla a los pies se experimenta un frío helado; manos y pies, también están helados y el resto del cuerpo caliente.

Cuando a Lachesis se recurre en tales casos irregulares con frialdad de los lóbulos nasales, de los oidos, etc., la piel es amoratada y hay gran debilidad que se manifiesta por el pulso filiforme, que le es tan característico.

Concuerda más exactamente con los siguientes medicamentos, todos los cuales producen pulso débil o filiforme, frialdad, piel azulosa y naturalmente gran debilidad: Carvo veg., (véase más arriba), Veratrum album en el que sin embargo el escalofrío va acompañado de sed y se propaga hacia abajo y nunca hacia arriba; la piel está azulosa, fría y marchita, las manos también azulosas, la cara, boca y lengua, frías; la respiración oprimida y difícil; el corazón débil; sudor frío y pegajoso, más acentuado sobre la frente; el calor, no produce ningún efecto paliativo.

En Arsenicum, el calor externo mitiga los síntomas; la boca y lengua están frías; la cara y diferentes regiones del cuerpo, también están azulosas; hay inquietud ansiosa a pesar de la gran debilidad; sudor frío y pegajoso y ataques de asfixia.

Camphora tiene superficie fría y helada, pero hay también sensación de calor interior, por eso desecha las ropas; la cara presenta palidez de muerte; los labios están azulosos y el aliento generalmente es caliente; hay espasmos y si está consciente, la voz está alterada; todo esto seguido por un estado de letargo.

Hidrocyanicum acidum, tiene frialdad de mármol en todo el cuerpo; el pulso es débil e imperceptible; constantemente hay prolongados desmayos; la deglución de las debidas, produce ruidos que pueden ser escuchados; el enfermo se lleva las manos al pecho, como amenazado por algún peligro; hay espasmos, especialmente en los músculos del dorso acompañados de trismus.

En Helleborus, los músculos están relajados; el enfermo cae repentinamente, con frialdad y sudor frío en la frente; el pulso es lento; hay tremendas convulsiones con extremada frialdad; dolores reumáticos en las rodillas.

Digitalis purpúrea, lo mismo que Lachesis, debilita el corazón; la piel está muy fría; hay copioso sudor que no alivia los síntomas cardíacos; el pulso se interrumpe a cada tres, cinco o siete pulsaciones y es muy lento. Conveniente es recordar que Lachesis tiene opresión en el pecho, acompañada de pies fríos y que a medida que estos se calientan disminuye la opresión.

Secale cornutum, también tiene superficie fría; la cara está palida y hundida y los labios amoratados; el enfermo rehusa estar abrigado; hay comezón en las extremidades; las manos se sostienen con los dedos separados y hay sudor frío y viscoso; el habla es débil y hay tartamudeo.

Hyosciamus niger se parece a Lachesis, en el frío que sube en la espalda; en la frialdad objetiva del cuerpo, en las convulsiones y en el delirio. Pero el frío es peor en la noche y se extiende de los pies a la columna vertebral y llega hasta el cuello. La temperatura amenazante va acompañada de funcionamiento arterial lento, somnolencia o por delirio y conversación animada; coge las ropas de la cama; teme ser envenenado; hay carfología, alucinaciones y contracciones fibrilares, etc.

Lachnanthes, como en Lachesis, tiene ojos brillantes durante el

escalofrío; el cuerpo está helado y los síntomas se mitigan por el calor moderado, pero solamente en Lachnanthes hay ojos brillantes y rubicundez circunscrita a los carrillos, acompañada de fiebre y delirio.

Lycopodium sigue bien a Lachesis; es necesario en las fiebres cuando el paciente llega a estar amodorrado o tonto, con sensación de frialdad, como si estuviera acostado en el hielo; tiene un pie caliente y el otro frío, lo que constituye un síntoma importante. Siente como si la sangre le dejara de circular.

En la fiebre intermitente, el escalofrío comienza por el dorso como en Lachesis; se agrava de 4 a 8 p.m. , o a las 7 p.m. ; las manos y los pies están adormecidos y hay frialdad de hielo. Los eructos y los vómitos acedos, invariablemente están presentes, con especialidad entre el escalofrío y la fiebre; la sed es más notable después del sudor y desea tomar solamente bebidas calientes.

Apis, aquí, como en muchos otros casos, favorece la acción de Lachesis; ambos medicamentos son útiles para los casos crónicos o mal tratados, en los que el escalofrío se presenta después de medio día, acompañado de opresión del pecho, nariz fría, pulso agitado, piel de las manos y los brazos azulosa y con apariencia general de colapso; pero el veneno de la abeja tiene azulosa y con apariencia general de colapso; pero el veneno de la abeja tiene agravación por el calor y Lachesis no. Apis tiene mas marcada la opresion en el pecho, con la consiguiente sofocacion. La lengua está roja, desollada y cubierta de vesículas en sus bordes y punta. La sed se presenta durante el frío no antes. Puede haber urticaria.

En Cuprum se presenta el escalofrío acompañado de fenómenos convulsivos. Hay helada frialdad en todo el cuerpo; calambres intensos en las extremidades, con sudor frío, piel azulosa y hasta colapso. Puede haber anuria; ha sido empleado con éxito en el estado álgido del cólera después de Camphora, pero también es útil en algunas otras formas de colapso. De consiguiente, por ejemplo, ha antidotizado la mordedura de las serpientes, que va seguida de calambres, delirio y finalmente letargo.

Lachesis también puede estar indicado en la escarlatina, pero no en la forma de Sydenham, sino en las formas en las que se revela una tendencia maligna. El niño está amodorrado y cae luego en profundo sueño. La erupción sale de un modo imperfecto o muy despacio, y tiene un tinte obscuro amoratado; puede al mismo tiempo haber erupción miliar; fácilmente puede complicarse con un depósito membranoso en la garganta que reviste el carácter que ya expliqué al hablar del medicamento relacionándolo con la difteria. El tejido celular de la garganta está inflamado y aún puede llegar a la supuración; los ganglios cervicales se hinchan. Observando el interior de la garganta, se verá que tiene un tinte rojo-obscuro; además de existir un depósito blanco-sucio sobre las amígdalas, especialmente en la izquierda; la lengua esta cubierta en su base de una capa sucia amarillenta y las papilas se muestran rojas y prominentes a través de esta capa.

El pulso es débil y la superficie del cuerpo fría; hay propensión a las hemorragias por boca y nariz.

La mayoría de los médicos cometen un error en el comienzo del tratamiento de la escarlatina; y UN ERROR EN EL COMIENZO, SIGNIFICA UNA DE DOS COSAS: O UNA LARGA Y TEDIOSA ENFERMEDAD, O CORTA QUE TERMINA CON LA MUERTE. Este error consiste en dar Belladonna sistemáticamente en cada caso. Consideremos de paso, las diferencias que existen entre Belladonna y Lachesis: ambos medicamentos tienen lengua de fresa, dolor pulsativo de cabeza, cara roja y temperatura elevada. Belladonna está indicada solamente en el tipo esténico, cuando hay delirio activo; la garganta tiene un color rojo encendido, el pulso es lleno y saltón y la erupción es rojo-encendida y lisa. Lachesis estará indicado, por otra parte, cuando predomina el estado asténico; cuando aparece tardíamente la erupción y es purpurina; hay somnolencia, marcada inflamación de los ganglios cervicales y en general, la malignidad antes mencionada.

En el carbunco y en el cáncer, pensemos en Lachesis, cuando el contorno de la superficie está hinchado, purpurino o negruzco y el pus se forma muy lentamente. Lachesis aplicado en estas condiciones, aumenta la cantidad y mejora la calidad del pus y hace que el paciente recobre sus fuerzas.

Al aplicar Lachesis en la pústula maligna, debe acompañarse al medicamento de bebidas alcohólicas, según la experiencia del Dr. Dunham.

Diré en seguida algunas palabras respecto a las modalidades de Lachesis, modalidades, como se sabe, que expresara la manera de calificar los síntomas y son por esta razón, importantísimos en el estudio de los medicamentos, especialmente al tratar de diferenciar a los que tienen alguna analogía. Ejemplo : Dos medicamentos pueden producir dolores supraorbitarios de carácter lancinante; pero si en el uno los dolores se modifican por la presión y en el otro por el sueño, estas modalidades nos pondrán en condiciones de distinguirlos en la práctica. Luego entonces, las modalidades califican los síntomas y son tan esenciales, como los adjetivos a los sustantivos. De cualquier modo, debe procederse con cautela, para no tomar las modalidades por los síntomas a los que califican. A menudo veremos casos referidos en los que la homeopaticidad entre el remedio y la enfermedad, solamente se revela por la modalidad simple; por ejemplo, en una agravación después del sueño.

Las modalidades de Lachesis son pues las siguientes:

PEOR durante el sueño, especialmente los síntomas de la garganta, que se cierra, obligando al enfermo a despertar; peor después del sueño, especialmente en la mañana.

DURANTE EL DIA - Generalmente empeora desde el medio día hasta la media noche; sin embargo, hay algunos síntomas prominentes que se agravan a la madrugada y el resto de la mañana; esto en parte es debido al malestar que se experimenta al despertar, aun cuando

algunos síntomas aparcen un poco más avanzada la mañana, pudiendo atribuirlos entonces al trabajo. Por ejemplo: el paciente tiene vértigos al despertar y esto se repite cada vez que se cierran los ojos, a las once de la mañana; el dolor de cabeza se presenta por la mañana y está localizado en la protuberancia frontal izquierda; la debilidad se acentúa en la mañana al incorporarse en la cama; las puntas de los dedos se sienten adormecidas; cuando por la mañana se incorpora el enfermo violentamente, la respiración se hace lenta, difícil y silbante.

POR LA TARDE y antes de las doce de la noche, encontramos las siguientes exacerbaciones: Hiperestesia de la garganta, diarrea, tos seca; escalofrío, que empieza algunas veces entre las doce y dos de la tarde, siendo la fiebre más marcada por la tarde y noche, peor antes de las 12 p.m.

TEMPERATURA, ESTADO ATMOSFERICO, etc. - Empeora por el aire frío y por los cambios de temperatura y por el calor moderado de la cama, (véase adelante, cambio de posición) empeora al mojarse, por la temperatura húmeda, por el viento; empeora también antes de aparecer la tormenta y por asolearse en la primavera. Mejora a menudo por un calor moderado, abrigándose cerca de la estufa, etc.; el frío o el calor excesivo, producen debilidad.

CAMBIO DE POSICION, REPOSO, etc. - Empeora en la cama y después de levantarse, empeora mientras está sentado y mejora después de levantarse del asiento; mejora acostándose sobre el lado sano; sin embargo, se empeora por el moderado calor de la cama; (vease arriba, temperatura) y por acostarse sobre el lado enfermo. Algunos síntomas se mejoran por el movimiento, que no sea prolongado.

TACTO, PRESION, LESIONES, etc. - Casi invariablemente se empeora por el tacto, aun cuando sea ligero. Es útil para los malos efectos de algunas lesiones, como heridas penetrantes, con hemorragia profusa, o gangrena.

Dd aracnidos

Acerca de los Arácnidos, o venenos de las arañas usadas en medicina, llamaré la atención, respecto de las siguientes:

Mygale lasiodroa.
Lycosa tarentula.
Tarentula cubensis.
Aracnea diadema.
Theridion curassavicum.

La acción de las drogas que proporciona esta grupo, debe considerarse bajo dos puntos de vista : todos ellos envenenan la sangre y todos también, actúan en una forma prominente sobre el sistema nervioso, produciendo enfermedades espasmódicas, como la

corea y la histeria.
Entre otros síntomas nerviosos producidos por dichas substancias, tenemos, la ansiedad, temblor, gran inquietud, hiperestesia y postración nerviosa; periodicidad de todas estas manifestaciones.
La economía es profundamente afectada por el veneno de las arañas, siendo útil por esta razón para el tratamiento de las discracias constitucionales y las enfermedades cronicas situadas profundamente.
Haciendo el estudio de estas drogas según están agrupadas, daremos principio con Mygale las.

Mygale lasiodora
Mygale lasiodora es una arana negra, nativa de la isla de Cuba, que fué experimentada primeramente por el Doctor Howard de Filadelfia. Es uno de nuestros mejores medicamentos en los casos no complicados, de corea. La enferma es propensa a ser abatida y deprimida de espíritu. Se queja de un sordo dolor en la frente; tiene constantes contraciones de los músculos de la cara; la cabeza es frecuentemente tirada por las contracciones hacia un lado, con particulariddad al derecho. Hay también contracciones y sacudidas de los músculos de un brazo y una pierna, particularmente el derecho. El control de los músculos está perdido completamente; al intentar levantar la mano a la cabeza, es tirada violentamente hacia atrás; cuando hace un esfuerzo para platicar, pronuncia las palabras con precipitación.
Recuerdo un caso de corea en el que los síntomas convulsivos, fueron rápidamente modificados con el uso de este medicamento; la paciente, que era una niñita, permaneció bien por varios años. El Dr. Howard, a quien justamente referí este caso, habiendo experimentado este medicamento, me ha dado los siguientes síntomas, que indican su uso: contracción nerviosa de los músculos de la cara; la boca y los ojos se abren y cierran con rápida sucesión; no puede llevarse la mano a la cara, pues es retenida a mitad del camino y lanzada hacia abajo. La marcha es insegura; las piernas están en constante movimiento mientras la enferma está sentada y las arrastra cuando intenta andar. Todo el cuerpo está en constante movimiento.
El medicamento más semejante a Mygale en la corea, es Agaricus, (1) el cual también tiene estos movimientos coreicos angulares. Pero como un síntoma distintivo, tiene comezón en los párpados o en diferentes partes del cuerpo, semejante a la que produce la quemadura por el hielo. Los párpados están constantemente en movimiento y la columna vertebral muy sensible al tacto.
Actea racemosa puede ser empleada en la corea, cuando los movimientos afectan principalmente el lado izquierdo y cuando la enfermedad va asociada de mialgias o afecciones reumáticas de origen reflejo, como resultado de un desalojamiento uterino.
Tarentula está indicado en la corea, cuando afecta la pierna y el

brazo derechos. Los movimientos persisten aún en la noche.
Se recurre a Ignatia, para la corea de origen amotivo.
Zizia puede usarse en los casos en que los movimientos coreicos continúan durante el sueño.
La corea de Stramonium se caracteriza por los síntomas siguientes: los rasgos fisonómicos cambian continuamente; a veces se ríe, a veces parece sorprendido; la lengua sale rápidamente; la cabeza es lanzada alternativamente hacia atrás y adelante; hay contracciones espasmódicas de los músculos espinales y de todo el cuerpo; las extremidades también están en constante movimiento, aunque no siempre lanzadas con fuerza, pues algunas veces su movimiento es rotatorio, giratorio y aun lleno de elegancia. Los músculos de todo el cuerpo están en constante movimiento. Puede haber tartamudeo. Si la mente está afectada, el paciente es fácilmente amedrentado; despierta aterrorizado o asume una actitud suplicante, con ferviente expresión y palmoteo de manos. Frecuentemente levanta la cabeza de la almohada.

Volviendo ahora a Mygale, doy los siguientes síntomas en adición a los ya descritos: delirio acerca de negocios; inquietud durante toda la noche; temor a la muerte; desesperación con ansiosa expresión; náuseas; fuerte palpitación del corazón; ofuscamiento de la vista; debilidad general; por las tardes, temblor de todo el cuerpo; escalofrío solemne, media hora después, calentura, acompañada de temblor, cafalalgia por la mañana, peor en los ojos y de sien a sien.
Mygale, despues de haber sido administrada a un niño por algún tiempo, produjo durante los síntomas espasmodicos, violentas erecciones del pene, que se ponía encorvado en el momento de la misma erección, ocasionando un inmenso dolor al paciente. El Dr. Williamson, por quien fué hecha esta observación, ha usado después dicho medicamento, contra la gonorrea llamada de garabatillo. La usó en atenuaciones bajas y desde entonces ha sido usada con igual éxito en las altas.

Tarentula hispanica

Los síntomas siguientes que produce el envenenamiento por el piquete de una tarántula son semejantes a los que producen los Ofidios. La parte mordida llega a hincharse y se decolora; los ganglios linfáticos se infartan. El tejido celular del cuello es especialmente infiltrado por la acción del veneno, dando origen al aumento de volumen y a un tinte rojo-obscuro o purpurino. La sofocación parece inminente, al tiempo que la epistaxis se presenta con descarga de coágulos obscuros, produciendo alivio de los síntomas. Es perceptible la violenta vibración de las arterias carótidas, que evidencia la congestión cerebral, existiendo a pesar de ello, palidez y un tinte terroso de la cara. Las fauces están hinchadas y purpurinas y hay disfagia de origen paralítico. El enfermo siente una sed abrasadora de

grandes cantidades de agua; las evacuaciones intestinales son obscuras y fétidas y la orina escasa y expulsada con dificultad. Hasta aquí no hay sino pequeños detalles que nos ayudarán a distinguir esta condición de un caso de Lachesis. Pero hay otros síntomas, sobre todo nerviosos, que son característicos de la droga. Los fenómenos nerviosos están presentes en todos los venenos de los arácnidos, pero Tarentula se adapta más que los otros miembros de este grupo, a la histeria. Hay una irritación espinal muy marcada y lo que he encontrado ser muy característico, es la gran excitabilidad de las terminaciones nerviosas. El paciente lleva las manos en constante movimiento y trata de dominar su excitabilidad. Al oir tocar una alegre pieza de música se excita y es impulsada o obrar como si estuviera loca. Cuando no hay quien la observe, desaparecen todos los fenómenos histéricos, pero tan pronto como se le presta alguna atención comienza a torcerse bruscamente. Cuando hay cefalalgia, se alivia por las fricciones o por hundir la cabeza en la almohada.

Tarentula actúa sobre el útero y los ovarios; hay que considerarlo como paliativo en la hipertrofia de dichos órganos. Hay un dolor en la región uterina, asociado a una cefalalgia constrictiva; hay también ardor en el hipogastrio y cintura, con sensación de gran peso en la pelvis. La menstruación es profusa y seguida de prurito vulvar; la enferma se siente magullada, particularmente cuando se mueve, desea dormir, lo que no consigue a pesar de su intento, por estar tan nerviosa.

Ahora vamos a estudiar por un momento, los medicamentos concordantes de Tarentula, comenzando por Kali bromatum. No tenemos ningún medicamento en la materia médica, que presente tantos síntomas reflejos como Kali bromatum. Cualquiera irritación de poca importancia, tal como la indigestión, la dentición en los niños, puede producir convulsiones. Pero el síntoma sobre el que deseo particularmente llamar la atención, es la irritación periférica que se alivia por el movimiento o por el ejercicio de la parte afectada.

Crocus merece ser mencionado por el estado histérico que es capaz de producir, juntamente con síntomas coreicos, produce saltos, bailes, risas, deseo de besar a todo mundo, contracciones aisladas de grupos musculares; la enferma se encoleriza y en seguida se arrepiente o está alternativamente colérica, locuaz y risueña. Como en Tarentula, la música le afecta; oyendo cantar, canta ella también, pero no hay el alivio subsecuente que se observa en el veneno de las arañas por la música.

Actea racemosa se semeja a las arañas produciendo insomnio, inquietud, temblor y temor a la muerte y estos signos, que son a menudo, evidencias de un estado nervioso, tanto en Actea como en Tarentula, son reflejos de afecciones uterinas. Actea, produce sacudimientos que se presentan despues de acostarse y que se inician por el lado en que se acostó, obligando al paciente a cambiar de posición; hay estremecimiento y frío nerviosos. En los síntomas mentales, las dos drogas difieren : Actea, produce un estado

nervioso, siente como si la bóveda craneana fuera levantada; delirio en el que pasa de un asunto a otro; ve objetos extraños; hay gran aprehensión como resultado de la irritación uterina; dolores como de dardo en los globos oculares que llegan hasta el occipucio; la enferma se siente apesadumbrada, molesta y suspira con frecuencia; al día siguiente hay un regocijo desbordante, jovialidad y alegría con temblor.

Este principal síntoma de Actea, no es exactamente igual al de Theridion, bajo cuya acción la enferma experimenta una sensación de como si pudiera coger su cabeza y quitársela.

Hyosciamus es útil cuando son bien marcados los sacudimientos y contracciones bruscas de grupos musculares aislados. La paciente padece insomnios y está nerviosa o bien solloza y grita durante el sueño. La cabeza se inclina de un lado a otro; se ríe de todas las cosas de una manera boba y tartamudea. Hay excitación mental, locuacidad; está nerviosa, suspicaz y enfadosa, pero no es maniática.

Causticum tiene alguna semejanza, porque también produce inquietud y movimiento nocturno; no puede encontrar posición que le agrade. Por la tarde experimenta una inquietud intolerable en las piernas, ansiedad y timidez; temblor. Por las noches también está intranquila y despierta con ansiedad después de haber dormido un momento, que apenas le permite permanecer quieta en una posición diez minutos; se ve obligada a voltear la cabeza involuntariamente de un lado a otro, hasta que, agotada, se duerme. Durante el sueño, hay frecuentes movimientos de los brazos y las piernas; los sobresaltos son más marcados del lado derecho; movimientos convulsivos de la boca y ojos, con insomnio e inquietud, después de algunas erupciones repercutidas. Especialmente se acomoda a pacientes reumáticos o a aquellos que sufren afecciones paréticas, especialmente de un lado de la cara y la lengua, estando en consecuencia la boca torcida.

Belladonna, produce inquietud corporal, como en la corea; el paciente se ve obligado a moverse de un lado a otro, especialmente mueve las manos y los pies; no puede permanecer largo rato en una posición; predominan las contracciones hacia atrás, aun cuando pueden alternar con inclinaciones hacia adelante. Hay hundimiento de la cabeza en la almohada y no un simple frotamiento contra la misma, como se observa en Tarentula. En Belladonna hay también constricción, hiperestesia, manía conrisas, baile, alborotados gritos, etc., pero se distingue por la intensidad de sus síntomas; hay violentas congestiones, latidos carotídeos visibles, mirada salvaje, pupilas dilatadas y ojos inyectados.

Aun cuando en muchos aspectos los estados histéricos de Ignatia concuerdan con los de Tarentula, la primera presenta una individualidad que le es propia : el sistema nervioso es impresionable de todo a todo, hay incoordinación en las funciones y contradicción en su acción. La paciente es extremadamente susceptible a influencias emotivas. El temor y el pesar la afectan seriamente, la menor

contradicción la ofende, con facilidad se entristece y se apesadumbra y llora por los más ligeros motivos. Sin embargo, su estado mental no se manifiesta generalmente por la violencia y el arrebato de colera. Al contrario, mantiene sus pesares en la soledad y el silencio y los oculta hasta que hacen presa de todo su sistema, volviéndose de este modo más y más nerviosa, aumentando en la misma proporción su debilidad. El corazón late nerviosamente con pulso variable; con frecuencia suspira profunda y lentamente; sufre desfallecimientos en el estómago, con náuseas y sabor insípido y experimenta una sensación de cuerpo extraño en la garganta e inflamación de origen simpático con la intensidad de sus trastornos mentales. Insomnio y violentos movimientos especialmente en las piernas. La pena moral, el temor, el amor frustrado o alguna otra causa semejante, pueden dar origen a paroxismos histéricos o corecicos. El estado de ánimo cambia con maravillosa rapidez; a veces ríe y chancea, después, rápidamente prorrumpe en llanto. Llega a tener un hábito violento, de tal manera que todo lo ejecuta torpe y precipitadamente. Es afligida por intensa cefalalgia; ésta se caracteriza por la predominancia de una sensación de presión; los dolores van hacia los ojos, que se sienten como si fueran expelidos de sus órbitas, o la raíz de la nariz, o de otro modo se limita a un pequeño sitio, siendo semejante al producido por un clavo, de donde el nombre de "clavo histérico.

En el momento álgido del peroxismo, se pone inquieta y friolenta y a menudo se queja de una perversión de la mirada que le es peculiar; ve zigzags luminosos cuando fija la vista fuera del campo. (Vease Theridion).

En tanto que ambos remedios producen tristeza, indiferencia, profunda melancolía y estados histéricos, solamente Ignatia tiene el estado caprichoso mental, y Tarentula, la simulación astuta de los paroxismos y danzas extravagentes.

Platina no debe ser confundida aquí con los venenos de los arañas, pues desarrolla una forma diferente de histeria. Verdad es que presenta trastornos de las funciones de coordinación del juicio, ansiedad, temblor y temor a la muerte, que al enfermo le parece inminente; también alternativas de depresión, alegría y risas; excitación sexual y convulsiones; pero la paciente asume una actitud altiva y cierto amor propio exaltado, que no se encuentran en las demás drogas conocidas. Los desarreglos mentales se desarrollan por una estimación exagerada de sí misma, durante los cuales mira desdeñosamente a todos los que le rodean. Sus paroxismos de risa, no son solamente ruidosos y turbulentos, sino inoportunos y se presentan aun en circunstancias propicias para la tristeza. Los dolores de cabeza son de carácter constrictivo como en Tarentula, pero hay además, sensación de compresión, especie de calambres con adormecimiento y los dolores aumentan gradualmente y disminuyen en la misma forma.

La induración del útero es común a ambos medicamentos.

Palladium se distingue desde luego, por sus peculiares fenómenos

mentales : la enferma no es altiva, pero es irritable y usa por desgracia, un áspero y violento lenguaje. La música, las reuniones o las conversaciones animadas, la excitan y le ocasionan dolores en el ovario derecho, sintiéndose al día siguiente muy agotada. Su egotismo se manifiesta por el anhelo que tiene de la buena opinión que de ella tengan las demás personas y de esto resulta que se considere continuamente "despreciada". Los síntomas úterinos estan caracterizados por una debilidad, con sensación de como si el vientre estuviera hundido; sensación de vacuidad en las ingles y como si la faltasen las vísceras.

En Moschus se observa lo mismo que en Palladium, pero la enferma no se reprime hasta que sus labios se pones azules, sus ojos parecen inmóviles y cae al suelo desmayada. Sufre sofocaciones repentinas por el espasmo de la glotis o calambres del pecho; también sufre algunos desmayos; hay palpitación, temblor de cuerpo; frialdad del mismo, cefalalgia histérica, desmayos accidentales, orina clara y profusa; temor a la muerte como en Platina y Tarentula, pero con palidez y desmayo. Habla solamente de la proximidad de su muerte. Hay vertigo, náusea, disminución del poder visual; vertigo rotatorio. (Moschus alivia, cuando Theridion produce vértigos que empeoran al cerrar los ojos). Cefalalgia como si algun peso oprimiera distintos puntos de la cabeza.

Un síntoma nervioso muchas veces observado, es la inquietud de las piernas, que a veces impide el sueño.

Además de Tarentula, pueden estudiarse los siguientes medicamentos que guardan relación con ella.

Zincum, produce movimiento de los pies que duran algunas horas después de haberse acostado y aun durante el sueño.

Asa foetida ha remediado varias veces esta inquietud, lo mismo que Amonium carbonicum.

Actea racemosa ya ha sido mencionada.

Arsenicum, tan útil en los casos obstinados de corea, tiene los siguientes síntomas : inquietud en las piernas; necesita cambiar de posición los pies todo el tiempo o andar para encontrar alivio.

Mephitis ha corregido la inquietud de las piernas, cuando parece que van a quedar insensibles.

Sticta pulmonaria, produce una sensación de como si las piernas flotasen en el aire. Una experimentadora estaba tan estusiasmada, que se tendió en un camapé y comenzó a mover las piernas, exclamando que sentía como si estuviera volando. Esta excitabilidad, nos recuerda el deseo de saltar que produce Tarentula. (Compárese con Stramonium, Agaricus, Cicuta, Hyosciamus, crocus y Natrum mur). Este último tiene saltos muy elevados no haciendo caso de los objetos cercanos.

Asarum produce una sensación de como si el cuerpo estuviera revoloteando en el aire. También produce estremecimiento y frialdad por cualquiera emoción, pero no ofrece semejanzas con Tarentula, aunque sí las tiene muy ligeras con Theridion, en aquello de que los

ruidos llegan a ser intolerables. Su diferenciación es evidente : en Asarum la sensibilidad es tan exagerada y el enfermo es tan nervioso que se estremece al pensar solamente el ruido que produce el frotamiento de la seda, y aun sin quererlo. piensa en ello continuamente.

A pesar de haber mencionado muchas drogas por tener alguna semejanza con el veneno de las arañas, solamente las siguientes tienen intima relación : Ignatia, Moschus, Actea racemosa, Agaricus, Stramonium, Belladonna, Magnesia mur. (Este ultimo en los calambres uterinos).

Tarentula cubensis

Tarentula cubensis, la araña peluda, produce una perfecta imagen del carbunco, hasta en la escara, y es considerada como competidora de Arsenicum y Carbo veg.

Puede ser usada eficazmente cuando hay gran postración y diarrea, con fiebre intermitente de exacerbación vespertina.

Al aliviar los dolores intensos que acompañan a este estado, obra como por arte de magia. Debe ser comparado, por lo tanto, con Arsenicum y no menos con Lachesis, Anthracinum y Silicea.

Aranea diadema

La Aranea fué propuesta por Grauvogl, como uno de los medicamentos para lo que él llama "constitución hidrogenoidea" es decir, un estado en el que no se puede tolerar la humedad. Bajo la acción de esta substancia todos los síntomas se agravan durante el tiempo húmedo o por habitar en regiones húmedas. Especialmente es eficaz en lo que podemos llamar fiebre intermitente crónica, para que la Aranea es el remedio eficaz cuando los síntomas se agravan durante los días humedos. El paciente puede sentirse muy bien en los días calurosos, pero tan pronto como se pone el tiempo húmedo, se agrava. Durante esta agravación, se queja de frialdad, como si tuviera helados los huesos; dolores esteocopos seguidos de poca o ninguna elevación de temperatura. El escalofrío tiende a ser típico, presentándose a la misma hora cada tercer día, cada semana o por períodos regulares. También se encontrará que el bazo está aumentando de volumen y que el paciente es propenso a las hemorragias, ya sea que previamente se haya tratado o no con quinina.

China y Chininum sulphuric., son muy semejantes a Aranea diadema en la repetición periódica de los síntomas y ambos están indicados en la esplegnomegalia y fiebres intermitentes, adquiridas por habitar en lugares húmedos.

Cedron, del que se asegura que alivia la mordedura de la serpiente de cascabel y modifica la hidrofobia, es reputado como un análogo de

Aranea diadema, generalmente y del veneno de las arañas en general.

Se dice que obra mejor sobre las personas nerviosas, excitables y aun sobre los pacientes voluptuosos, especialmente del sexo femenino. Los síntomas febriles y neurálgícos se repiten con regularidad cronométrica.

Se usa en las fiebres intermitentes contraídas en los países cálidos o en los lugares bajos y pantanosos; en lo que respecta a este último detalle, tiene similitud con Aranea diadema.

Pero Cedron se ha encontrado más eficaz en los climas cálidos, mientras que Aranea diadema obra mejor en los fiebres intermitentes adquiridas en los lugares fríos y húmedos. El escalofrío predomina y la fiebre es ligera o falta del todo. En cedron al contrario, hay congestión cefálica y fugaz en la cara, alternando con frialdad, con pulso lleno y frecuente.

Esta demostrado que Aranea diadema no desarrolla la extremada excitación que los otros tres venenos antes mencionados; sin embargo, es evidente que afectan el sistema nervioso. Hay connfusión mental y cefalalgia después de comer, mejorandose por fumar; el dolor de cabeza mejora al aire libre. Durante la noche, hay repentinos y violentos dolores de ambos maxilares, inmediatamente despues de acostarse; sueño intranquilo en el que el enfermo despierta frecuentemente; tiene un síntoma que es común a todos los medicamentos que afectan los nervios cerebroespinales y que consiste en una sensación, de como si alguna parte del cuerpo estuviese crecida; por ejemplo : cuando despierta siente los brazos y las manos sumamente grandes, mucho más grandes de lo que son normalmente.

Aranea diadema es útil en las odontalgias que se agravan particularmente por el tiempo húmedo y también tan pronto como el paciente se acuesta, recordándonos esto a Mercurius.

Hay un síntoma de Aranea, que yo no he tenido oportunidad de observar en la práctica y es el adormecimiento en el trayecto del nervio cubital.

Aranea diadema ataca también al sistema óseo y está indicada especialmente para las enfermedades del calcáneo, cuando el enfermo se queja de un violento dolor en este hueso, pudiendo esto ser debido a una simple periostitis o estar asociado a una caries del mismo hueso. Algunas veces hay la sensación de como si el hueso estuviera en el hielo, lo que es puramente subjectivo.

Theridion curassavicum

Theridion debe ser comparado con Tarentula, en el estado nervioso y en la histeria. Conforme a los experimentos, hay una semejante inquietud y actividad; el paciente desea ocuparse en algo, aun cuando no encuentra tranquilidad en ninguna ocupación; pero hay un distintivo característico notable, y es la sensibilidad al ruido. Esto caracteriza al vértigo, la cefalalgia y aun a las indisposiciones

gastricas. El vértigo y la náusea se presentan al cerrar los ojos, por el movimiento o por el ruido. (1) Cada sonido cala hasta los dientes y éste repercute en todo el cuerpo. La cefalalgia se agrava por el ruido que otras personas producen al andar. Yo he curado una cefalalgia intensa con Theridion, estando presente la hiperestesia a los ruidos, así como la náusea y la agravación por el movimiento. Los síntomas generales concomitantes, son precisamente los efectos que producen los venenos de las arañas : debilidad, temblor, frialdad y ansiedad. También la histeria se ha curado con Theridion, existiendo los síntomas siguientes : al enfermo le parece que el tiempo pasa demasiado rápido; hay risas y locuacidad y siente como si su cabeza no fuera suya, como si pudiese desprenderse de ella; hay vibraciones luminosas ante los ojos; sensibilidad a la luz; si ve hacia ésta, percibe vibraciones obscuras; hay diplopia; desvanecimientos después de cada esfuerzo y en lo que se refiere al corazón, hay sensación de ansiedad en el hemitórax izquierdo, o en el hombro del mismo lado, con dolores agudos.

Se muerde la punta de la lengua durante el sueño. Todo esto viene acompañado de debilidad, frialdad; sudor frío, facilidad para excitarse, náuseas y confusión de ideas, grandemente aumentados por cerrar los ojos.

Theridion es muy semejante a Spigelia, que produce dolores neurálgiacos agudos sobre el ojo izquierdo. En Spigelia el dolor se presenta generalmente en la mañana, parte de la nuca a la parte superior de la cabeza y se va haciendo mas intenso a medida que avanza el día, para disminuir gradualmente a la caída del sol. Moschus es antídoto de Theridion, cuando este medicamento produce la cefalalgia citada.

Bryonia le es a veces muy semejante en la cefalalgia. Una ocasión traté a una señora que padecía intensa cefalalgia y náuseas que se agravaban por el menor movimiento; di Bryonia y falló; hasta después que el paciente agredo el dato de : náusea y agravación por el movimiento, encontré el similimum en Theridion. En las cefalalgias que empeora la trepidación del piso, campárece con Belladonna y Sanguinaria.

Theridionn puede usarse también en el mareo de las mujeres nerviosas, que cierran los ojos para librarse de los movimientos del mar, poniéndose mortalmente enfermas. La médula es muy irritable; hay, como ya se dijo, irritación espinal; el examen revela hiperestesia de la columna vertebral. Tan notable es esta hiperestesia, que el enfermo al sentarse en una silla, lo hace de lado para evitar la presión del respaldo contra la columna vertebral.

Otro empleo, tal vez especial de Theridion, pero que en la práctica he tenido ocasión de comprobar en en la TISIS FLORIDA; se ha dicho que esta substancia tiende a estacionar en algunos casos el rápido progreso de esta fatal enfermedad. Un síntoma que justifica su indicación, es : violentos dolores punzantes en la parte superior izquierda del tórax, que irradian a la espalda. El doctor Baruch, tuvo

exito en el tratemiento de este síntoma con Theridion, después de que otros médicos lo habian intentado inútilmente.

Myrtus communis y Pix liquida, compiten con Theridion en los dolores de la parte superior izquierda del pecho; el primero tiene dolores a traves del borde del omoplato, síntoma que hasta en los tísicos se alivia frecuentemente; Pix, localiza su dolor en el tercer cartílago costal izquierdo en su unión con la costilla. (Si este falla, debe consultarse Anisum stellatum, que afecta a uno u otro lado a este mismo nivel). Los estertores y la expectoración muco-purulenta, son otros tantos síntomas de Pix.

El doctor Baruch ha hecho uso también de Theridion en las enfermedades de origen escrofuloso localizadas en los huesos, particularmente después del uso de Sulphur, Calcarea y Lycopodium y cuando los medicamentos ordinariamente indicados han fallado. Creo que este medicamento puede curar el ozena con caries, supuesto que ataca los huesos y muchas veces estará indicado cuando hay descargas amarillentas o verde - amarillentas y espesas por la nariz.

Cantharis vesicatoria

El medicamento que ahora me propongo presentar ante ustedes, para su estudio, es Cantharis, vulgo cantárida. Mi proposito es hablar de los más importantes síntomas que produce la droga y compararlos, aunque sea superficialmente, con otros medicamentos que tienen efectos semejantes a ella. Por razón de orden, permítaseme hacer referencia a otros dos medicamentos : Lytta vittata y Cantharis strygosa; la primera de estas es la mosca de la papa y no la chinche de la papa, cuyo nombre farmacológico es Doryphora. Cuando se aplica a la piel, obra la mosca de la papa, de una manera parecida a Cantharis; primero produce dermatitis que muy pronto es seguida de formación de vesículas. Las partes afectadas llegan a ser rojas y casi de apariencia erisipelatosa. Las vesículas se rompen finalmente dejando una superficie ulcerada y por último puede sobrevenir la gangrena.

Cantharis strygosa, es una especie de Cantharis, que asola las plantaciones de algodón; también produce una vesicación característica.

Hay otras variedades de Cantharis entre las cuales se cuentan la C. cinerea, C. marginata, C. atrata, C. nuttali y Mylabis cichorii y Phalateria; estas dos últimas son importadas de china.

Cantharis o la mosca española se ha usado desde hace tiempo por los alopatas como revulsivo; cuando es aplicada a cualquier parte de la superficie del cuerpo produce una violenta inflamación, naturalmente con eritema y que rápidamente llega a la vesicación. Las vesículas así formadas están llenas de una serosidad blanco-amarillenta y si la inflamación progresa, aumentan de tamaño las vesículas, volviéndose el contenido de carácter purulento y finalmente

se presenta la gangrena; por supuesto, siempre que la aplicación haya sido continuada por un tiempo prolongado; otras veces pueden formarse grandes flictenas, adquiriendo en muchas ocasiones el diámetro de una moneda de un peso, levantandose sobre la superficie cutánea y conteniendo un líquido escoriante.

ESTA PROPIEDAD IRRITANTE DE CANTHARIS, CONSTITUYE LA PIEDRA FUNDAMENTAL DE LA EXPERIMENTACION. Los consecutivos dolores de esta clase de inflamación, son, naturalmente, muy intensos; de carácter quemante; y cuando los nervios están invadidos en el proceso inflamatorio, habrá agudos dolores lancinantes en todo su trayecto.

Sin embargo, Cantharis no es el único medicamento que produce estos efectos eminentemente irritantes al ser aplicado sobre la piel o al ser ingerido.

Los siguientes medicamentos, al ser aplicados exteriormente, también desarrollarán vesículas : las variedades de Cantharis, Formica; las variedades de Rhus, Anacardium orientale y occidentale; entre las ranunculáceas, Clematis, Ranunculus bulbosus, Ranunculus sceleratus, Pulsatilla, Aconitum, Caltha, Helleborus, Actea spicata; entre las aráceas, especialmente : Arum maculatum, Arum tryphillum, Palladium, Pix, Terebinthina, Thuja, Nux juglans, Chininum sulph; varias especies de plumbago; Allium sativa; entre las plantas euforviáceas, particularmente : Crotum tiglium, Hura. Euphorbia corolata, Euphorbium officinale, Mancinella, Sinapis, Piper nigrum, Capsicum, Mezereum, Thapsia garganica, Chloral, Cotula murata, Drosera, Podophyllum, Chimaphila, Oleander, Chelidonium, Cochlearia, arm., Veratrum alb., Camphora, Picricum acidum, Ammoniunm causticum, Calcárea cáustica, Sulphur, Sulphuricum acidum, Kali sulphide, Nitricum acidum; las preparaciones arsenicales; el Acido carbólico, Mercurius, Cuprum arsenicosum, Antimonium tartaricum, etc.

Rhus tox. y Anacardium, producen vesicación, con notable infiltracion rojiza de la piel. Anacardium tiene, además, anorexia y otros síntomas gástricos como concomitantes esenciales. Rhus, produce piel roja y numerosas vesículas, rodeadas de una aureola infiltrada de color rojo. Una línea bien marcada delimita la inflamación, señalando los progresos de la enfermedad. La sensación predominante es de escozor o punzadas, mientras que en Cantharis, la sensación principal es de quemadura y ardores, como producidas por la sal. Anacardium, en algunos casos, cuando es empleado como topico, produce una erupción eczematosa al rededor de la aplicación y en otras, la superficie vesiculosa toma un aspecto blanco-pultáceo y casi de apariencia gangrenosa; pero la piel no es de color café rojizo como en Rhus.

Croton tigl., da origen a multitud de vesículas pequeñas, que producen un escozor terrible y tienen base roja. Cuando los órganos genito-urinarios son atacados, hay dolor al orinar y algunas veces vesículas que llegan a adquirir dimensiones notables; otras se

rompen, dejando una superficie roja y húmeda. Las vesiculas pueden desarrollarse y convertirse en pústulas, las que al romperse, forman costras grisáceas.

Hura brasiliensis, medicamento análogo a Croton, también produce vesículas rojas; los dos producen estiramiento de la piel y una sensación de estar adherida a los huesos, que ha sido más notable en Croton; pero Hura tiene el siguiente carácter en su vesicación : las vesículas llegan a ser tan tensas, que al abrirse, literalmente salta su contenido seroso. Una característica de este medicamento, es también la sensación como de uña astilla debajo de la uña del dedo pulgar; la erupción se localiza de preferencia en las salientes óseas, como por ejemplo en el hueso malar.

Formica, aplicada localmente, produce una rubicundez inflamatoria, con escozor y ardor, ligera exudación y descamación. La orina es albuminosa, sanguinolenta y hay mucha urgencia de orinar.

Clematis crispa, sirve de alimento a la mosca española; Clematis erecta irrita la piel hasta producirá vesículas ardorosas, las que se convierten en pústulas y secretan un flúido amarillo y corrosivo; la orina sale por gotas y de una manera intermitente, a causa de la estrechez uretral.

Ranunculus bulbosus y Ranunculus sceleratus, obran de un modo parecido; en Ranunculus bulbosus, las vesículas pueden tener un color azul obscuro, puede producir una secreción de apariencia córnea. Ranunculus sceleratus, produce vesículas que dejan una superficie desnuda y producen uns secreción acre semejante a Cantharis en el pénifigo. En el color azulado, Ranunculus bulb., más se parece a Lachesis; aun cuando este último produce vesículas azulosas y profundas (las que aparecen después de rascarse). En las costras costras de aspecto córneo se parece a Antimonium crudum.

Las diversas especies de Euforbias, han producido vesicación; la variedad llamada Euphorbium officinarum, se ha empleado en la erisipela vesículosa; las mejillas estan rojas, cubiertas de vesiculas amarillentas, tan grandes como un chícharo y hay fiebre intensa. Al igual que Hura, esta planta y Euphorbium cyparissias, tiene una afinidad por la región malar; Cantharis afecta la región nasal, lo mismo que las mejillas. (Como Graphites).

Euforbia peplus afecta también la nariz, así como la región malar.

Mancinella es tan irritante, que aún el agua de las hojas que gotea sobre la piel puede levantar vesículas; pero el eritema concomitante excede en alto grado al que produce Cantharis; se parece al enrojecimiento de la escarlatina, y se ha usado contra esta enfermedad.

Thapsia garánica, es una planta umbelífera, que se parece sensiblemente a Croton; produce, sin embargo más pústulas que se llenan rápidamente de pus.

Mezereum produce multitud de pequeñas vesículas, acompañadas de una comezón intolerable, pero la secreción rápidamente se transforma en costras gruesas, fluyendo por debajo de éstas un pus

acre.
Capsicum, Camphora, Terebinthina, Pix y Piper nigrum. producen una vesicación muy lenta; varios de ellos mas bien son usados como rubefacientes; Capsicum puede distinguirse, por razón de que las vesículas aparecen sobre las superficies que han estado humedecidas por el sudor y por que van acompañadas de un ardor punzante; en tanto que Cantharis produce una sensación de ardor, como el producido por la sal.
Camphora, aplicado localmente, produce una dermatitis erisipelatosa con rojo encendido y eventualmente vesículas. (Cuando la solución es concentrada). Generalmente pensamos en Camphora cuando hay repercusión de enfermedades cutáneas, acompañada de sus bien conocidos síntomas de colapso y convulsiones.
Pix y Terebinthina, producen un violento escozor, especialmente el primero. La piel piel llega a estar agrietada bajo la acción de Pix, sangrando al rascarse, habiendo además insomnio.
Las preparaciones de Hidroxido de potasa, producen más bien una erupción papulosa que vesiculosa, siendo esta última forma intermedia entre la pápula y la pústula. Kali hidrosulphuricum y Kali nitricum, desarrollan vesículas papulosas, cuando son aplicados localmte. Kali bromatum, produce vesículas al rededor de los folículos pilosos (usado al interior). Kali bichromicum produce erupción con vesículas umbilicadas que supuran y dejan cicatriz al secarse.
Kali hidroiodicum, por su uso al interior, produce vesículas papulosas, conteniendo pequeñas cantidades de yodo. Ninguna de éstas, por lo tanto, se asemeja a la vesicación superficial de Cantharis.
Chloral es susceptible de producir diversas formas de erupción; sus vesículas están circundadas de una hiperemia capilar bien notable.
Chininum sulphuricum ha provocado un aspecto erítematoso muy semejante al de la escarlatina; pero también de lugar a formación de vesículas confluentes que se ulceran y al secarse producen costras; puede también producir pénfigo.
En la producción de pénfigo, Cantharis debe ser comparado con Causticum, Rhus tox., Ranunculus sceleratus, etc. Los siguientes medicamentos también han producido esta forma de erupción y merecen ser considerados : Caltha, Nitricum acidum, Copaiva, Sulphuricum acidum, Chininum sulphiricum, Carboneum oxygenisatum.
En Caltha las flictenas están rodeadas de un anillo, producen mucha comezón y al tercer día están transformadas en costras.
Copaiva, afecta las membranas mucosas, después el estómago e intestinos y por último la piel. Aparece una erupción miliar roja sobre base del mismo color; hay urticaria o pénfigo con una secreción abundante y fétida.
Carboneum oxygenisatum es susceptible de producir vesicación en el trayecto de los nervios, (ciático, trigémino, etc.) y de ahi su indicación en el herpes zoster, enfermedad que Cantharis ha curado

de vez en cuando. También produce "grandes y pequeñas vesículas de pénfigo".

Cantharis tiene una marcada afinidad por los órganos génito-urinarios. Los síntomas notables de los riñones y la vejiga, pueden aparecer por el uso externo del medicamento; los mismos síntomas aparecen cuando se toma al interior. Fijemos ahora nuestra atención en algunos de ellos : hay dolores sordos a nivel de la región renal; otras veces son intensos, cortantes y quemantes e irradian a todo el trayecto de los ureteres hasta la vejiga; hay en la región renal una hiperestesia superficial al tacto y un conato persistente y violento de orinar. Muchas veces estos dolores cortantes se extienden también a lo largo de los cordones espermáticos, llegando hasta los testículos, y aun llegan a alcanzar al pene, yendo acompañados de retracción de los testículos. Otras veces irritación en el glande, que se revela en los niños por los tirones que frecuentemente se dan de este órgano.

El dolor, puede no ser de carácter agudo, pero produce intranquilidad e incomodidad. Cuando se note este síntoma en los niños, generalmente estará indicado Cantharis; otras veces se puede pensar en Mercurius soluóilis. Como dicho síntoma puede ser resultado de un mal hábito contraido por el niño, es natural creer que entonces no tiene aplicación los medicamentos.

En tratándose de la vejiga, encontramos que también hay una hiperestesia superficial en la región hipogástrica (especialmente cuando la vejiga está distendida por la orina) acompañada de intolerable tenesmo vesical. Algunas veces el paciente sentirá deseos de orinar a cada dos o tres minutos. La orina no pasa libremente, sino gota a gota, con ardor y dolores incisivos, algunas veces la orina es sanguinolenta; estos ardores no podrían ser peores si el enfermo orinara plomo derretido. Los dolores y continuo tenesmo después de orinar son de tal naturaleza, que el infeliz enfermo está en una constante tortura. Las exacerbaciones se repiten con intervalo de pocos minutos, pues los esfuerzos para orinar son tan urgentes que no se pueden resistir. La orina de por sí presenta cambios en su composición. La sangre está mas o menos mezclada, según el punto de procedencia. Sin embargo, puede tener un color rojo independientemente de la sangre que contenga y deposita un sedimento mucoso. Copos fibrinosos, células epiteliales, pequeños fragmentos membranosos enrollados que provienen del revestimiento de las partes por las que pasa la orina, cilindros renales, celulas. de los ureteres y de la vejiga, se observan al microscopio.

Tal es el cuadro de los efectos que produce Cantharis cuando alcanzan su máximun de intensidad. Desde estos síntomas extremos, tenemos todas las escalas de gravedad , hasta la más ligera irritación del cuello de la vejiga que se agrava después de la micción. Conocidos los síntomas que caracterizan a Cantharis, se verá que puede estar indicada en diferentes afecciones; se podriá hacer uso de ella en la inflamación de los riñones, particularmente si ésta es aguda, lo mismo que de los otros órganos que afecta, más bien que

en las afecciones evidentemente crónicas de mal de Birght. Juntamente con los síntomas ya descritos, nos encontramos casos de uretritis y de escurrimiento blenorreico, mucoso o purulento.

Encontramos también que Cantharis es un valioso medicamento en el paso de los calculos renales, especialmente cuando los dolores son muy intensos. Se ha controvertido mucho la aseveración de que los medicamentos homeopáticos pueden producir algún alivio durante el paso de los cálculos renales. El ureter es un tubo estrecho y el cálculo frecuentemente grande y por eso se sostiene que no puede pasar sin producir dolor. Esto es un error. El medicamento indicado puede disminuir tanto la irritabilidad local, que el dolor concomitante al paso del cálculo puede modificarse considerablemente.

Frecuentemente estará indicado Cantharis en la litiasis de los niños, cuando presentan esta irritación que se extiende hacia abajo hasta el pene y el constannte tirón de esta órgano.

Cantharis está indicado en la cistits aguda, más frecuentemente que todos los otros medicamentos juntos.

Está indicado en la hematuria de origen inflamatorio.

También tiene una acción secundaria produciendo la retención urinaria, como resultado de la gravedad de los síntomas preexistentes. En la gonorrea, está indicado Cantharis, CUANDO EXISTE LA MAS INTENSA IRRITACION y no un simple escurrimiento con los necesarios ardores, punzadas, etc., sino con violentas y dolorosas erecciones en garabatillo; hay un eretismo sexual notable y escurrimiento purulento o sanguinolento. Está indicado también en los casos en que ha sido suprimido el escurrimiento por medio de inyecciones y por este motivo se encuentra afectado el cuello de la vejiga.

Diré algunas palabras sobre los medicamentos que guardan relación con Cantharis:

Cannabis sativa es muy semejante a Cantharis en sus síntomas uretrales; tiene la misma secreción uretral purulenta y amarillenta, pero es más importante cuando el flujo es delgado y hay escozor y ardor al orinar. Parece haber más ardor y escozor bajo la acción de Cannabis; y en Cantharis más tenesmo y dolores intensos. El glande está rojo-obscuro e hinchado; la erección es dolorosa y en garabatillo. Cannabis sativa puede estar indicado en la nefritis aguda simple, pero probablemente no es muy útil en el mal de Bright. Sin embargo, produce dolores tirantes en la región renal, que se extienden hasta los ganglios inguinales, con sesación de ansiedad en el epigastrio y náuseas.

Cannabis indica se usa mucho en los países asiáticos. Produce los mas notables fenómenos mentales, excediendo en alto grado a Opium en sus efectos. Los dos rasgos característicos centrales de los fenómenos mentales de este Cannabis indica, son las ilusiones relativas a la distancia y al tiempo. Tiempo y espacio parecen prolongarse mucho. Por ejemplo : el paciente dice tener mucha hambre, que nada ha comido por espacio de seis meses, cuando aun

tiene cerca los platos de la comida que hace un momento tomó; si se asoma a una ventana, asegura que los objetos están muy distantes, cuando apenas estan a distancia de unos cuantos pies.

Pero los síntomas de Cannabis indica, que nos interesan por el momento, son los urinarios. Es muy semejante a Cantharis y aun se dice que es superior en los casos de gonorrea, cuando la erección en forma de garabatillo es bien marcada. En las afecciones renales se indica Cannabis, cuando hay inflamación acompañada de dolores punzantes, molestias en la región renal que se agravan al reír y también cuando la uremia se ha declarado y va acompañada de una intensa cefalalgia, como si el vértice de la cabeza se abriera y cerrara. Si aparece el delirio, viene acompañado de ilusiones referentes al tiempo y la distancia, que justamente se han mencionado como característicos del medicamento.

Equisetum hyemale, es una planta que crece en el agua; contiene una gran cantidad de ácido silícico; actúa con mucha semejanza como Cantharis, en tratándose de los riñones y la vejiga, aun cuando hay menos escurrimiento de sangre y también menos tenesmo vesical, del que encontramos en Cantharis; la orina es menos quemante y no contiene tantos copos fibrinosos. Cantharis no se usa con tanta frecuencia como Equisetum, cuando la orina contiene un exceso de moco; la vejiga está sensible y hay intensos dolores que no disminuyen después de la micción. Hay constante deseo de orinar y algunas veces sensación de dilatación de la vejiga y orina profusa. en el momento de la micción se experimenta un ardor uretral. Equisetum tiene más propiedades que la indican en la enuresis. Se ha demostrado que es un agente curativo en estos casos, aun cuando la irritación vesical sea pronunciada y la orina contenga sangre y albúmina, especialment en las mujeres.

Linaria es otro medicamento que ha producido y curado la enuresis, con conato frecuente y doloroso de orinar, obligando al paciente a levantarse por la noche.

Eupatorium purpureum es semejante a Equisetum en la irritabilidad vesical de las mujeres, para cuyo caso, fué usada por el Dr. Richard Hughes de Inglaterra. Produce conato frecuente y penoso de orinar, con escaso o excesivo flujo de una orina de color rojo subido, conteniendo moco.

Petroselinum, una variedad del perejil, está indicado frecuentemente, cuando hay urgencia repentina e irresistible de orinar. Cuando se trata de niños, se ven repentinamente atormentados por el deseo, que si no satisfacen inmediatamente, los obliga a saltar, por el dolor.

Se encontrará útil a Petroselinum para la blenorragia, cuando hay esta urgencia característica y estranguria. Cannabis, Cantharis y Mercurius, todos tienen esta repentina urgencia de orinar, pero es más marcado en Petroselinum.

Clematis erecta debe ser preferida cuando hay moco en la orina, pero no pus; cuando la orina sale en pequeñas porciones y se detiene

antes de terminar la micción o el paciente tiene que esperar mucho tiempo para poder orinar y entonces sólo lo hace por gotas, experimentando intensos dolores quemantes en todo el trayecto de la uretra, seguidos de un chorro abundante sin dolor.

Es de pensarse en Clematis al principio de los estrechamientos inflamatorios. Curará esta afección en un principio, pero no cuando esté bien desarrollada.

Conium es útil en las afecciones de la uretra y la vejiga, cuando hay pus en la orina; por otra parte se parece a Clematis, pues produce salida intermitente de la orina, con ardores contantes después de la miccion; terminada esta, sigue escurriendo la orina mientras el enfermo está de pie. (Zarza parrilla).

Doryphora está indicado en la uretritis de los niños menores de diez años, cuando esta molestia ha sido provacada por irritación local. En estos casos, debe también pensarse en Hyosciamus.

Capsicum está indicado algunas veces en la gonorrea en personas obesas, de fibra laxa y disposición indolente. El flujo es de carácter espeso y amarillo. El paciente se queja de agudos dolores filiformes en el meato urinario y dolor punzante en la uretra entre los actos de la micción.

Copaiva y Cubeba son medicamentos de los que tanto han abusado los alópatas y que nosotros, según creo, hemos olvidado. Copaiva produce uretritis con ardor en el cuello de la vejiga y en la uretra. El flujo es de un color como de leche y de carácter corrosivo; el meato urinario está tumerfacto, dolorido y como si estuviese lastimado.

Cubeba tiene dolores incisivos y constricción después de orinar; el flujo es de carácter mucoso. Ambos, Copaiva y Cubeba, son útiles en la irritación vesical, acompañada de engrosamiento del epitelio. Ni el uno ni el otro, tienen tan violenta acción como Cantharis.

Thuja produce síntomas de gonorrea continua o de repetición. El paciente tiene deseos constantes de orinar; el tenesmo es violento y sin embargo, sólo pasan unas cuantas gotas de orina sanguinolenta o no pasa nada y entonces hay intenso escozor. El flujo uretral es delgado y verde. Tanto en los órganos genitales como en la margen del ano, aparecen excrecencias verrugosas. Por la noche hay erecciones dolorsas que quitan el sueño. En Cantharis, las erecciones impiden la micción, lo que no sucede en Thuja.

Argentum nitricum sigue a cantharis en la gonorrea, cuando la secreción se vuelve purulenta y la uretra se siente dolorida e hinchada.

Mercurius solubilis y corrosivus, le siguen cuando el escurrimiento se agrava en la noche y es purulento y de color verde. Mercurius corrosivus produce el más violento tenesmo, ardor e hinchazón y en esto es muy semejante a Cantharis. El meato urinario está rojo. Mercurius solubilis, tiene más ardor en el intervalo de una y otra micción de lo que sucede en Cantharis.

Chimaphila ha sido de utilidad en el catarro vesical ocasionado por cálculos. Produce frecuentes micciones nocturnas, aumentando la

debilidad; el dolor se extiende desde el cuello de la vejiga hasta el meato urinario.

En la irritación del cuello de la vejiga, pueden usarse algunos otros medicamentos, de los cuales mencionaré los siguientes :

Erigeron, con o sin orina sanguinolenta.

Pulsatilla está indicada cuando la micción es seguida por dolores cortantes y hay presión y dolor sobre la región del pubis.

Ferrum phosphoricum, tiene agravación de sus síntomas por permanecer mucho tiempo de pie y se mejoran despues de orinar.

Epigea, Apis y Copaiva, deben ser estudiados en esta afección, sobre todo el último, en tratándose de ancianos.

Capsicum produce contraccion espasmódica y cortante en el cuello de la vejiga; Mercurius aceticus, justamente produce este dolor cortante al terminar la micción, lo mismo que Natrum mur.

El enfermo de Digitalis, encuentra alivio estando en decúbito dorsal, debido a que en esa posición disminuye la presión que se ejerce sobre el cuello de la vejiga.

Sulphur, despierta las reacciones orgánicas, para curar los restos de una gonorrea.

Ipomea nil., que es una variedad de la "gloria de la mañana", es un medicamento que fué usado por el finado Dr. Jacob Jeanes, para el paso de los cálculos renales a la vejiga, cuando encontró los siguientes síntomas: intensos dolores incisivos en cualquier parte de la región renal, extendiéndose hacia el uréter correspondiente. El detalle especialmente característico que lo distingue de otros medicamentos, es que los dolores producen náuseas.

Hydrangea también ha sido empleado para los dolores intensos que acompañan a la litiasis.

Zarza-parrilla es útil en la litiasis de los niños, cuando los dolores producidos al orinar, les obligan a gritar, encontrándose arenillas grisáceas en los pañales.

Ocinum puede ser empleado en el cólico nefrítico, cuando hay considerable hemorragia; cuando la orina no solamente tiene un sedimento rojo ladrillo, como en Pareira brava, sino que contiene considerable cantidad de sangre; afecta con preferencia el lado izquierdo.

Terebinthina, como Cantharis, tiene una acción muy marcada sobre los riñones, pero difiere de ella, en que la orina es siempre obscura, nebulosa y como ahumada, pues contiene sangre, debido a la congestión renal.

Cochlearia armoracea, o rábano picante, rústico, es un valioso medicamento. Produce ardores y dolores cortantes en el glande tanto antes como después de orinar y notable estranguria; la orina se vuelve gelatinosa cuando se deja reposar.

Después tenemos a Uva ursi, que es un medicamento sin igual, cuando los síntomas uretrales y vesicales dependen de cálculos en la vejiga; los síntomas de esta droga son: micción ardorosa y escaldante; el chorro se detiene bruscamente, como si el orificio

uretral estuviera obstruído por una piedra; la orina es viscosa debido a la mezcla de moco y sangre; parece adelgazar el engrosamiento inflamatorio de las paredes vesicales y alivia el sufrimiento, hasta que el cálculo puede ser removido por un tratamiento quirúrgico.

Semejante a éste es Pareira brava, que resulta ser un excelente medicamento en la litiasis y en la cistitis calculosa, cuando el paciente tiene que "andar a gatas" para orinar; el tenesmo es considerable y la orina pasa por gotas; los dolores se originan en la región renal y descienden a los muslos y aun hasta los pies. La orina deposita un copioso sedimento de ácido úrico y sangre.

Esto nos recuerda a Berberis vulgaris, medicamento que se adapta a las afecciones renales, cuando hay agudos dolores pungitivos en esta región que irradian a todos lados, pero especialmente se dirigen hacia abajo y hacia adelante, abarcando toda la pelvis; hay dolores en la región lumbar y en las caderas; la orina es más viscosa de lo que sucede en Pareira brava y deposita abundantes sedimentos arcillosos, teniendo un aspecto turbio y amarillento. Berberis es un excelente medicamento en los casos de cálculos en las pelvecillas renales o en los ureteres. Con lo explicado, se podrá ver la diferencia que hay entre los dos medicamentos : Pereira, tiene dolor que desciende a los muslos, Berberis, solamente en las caderas y región lumbar.

Puede recurrirse a Camphora, cuando con motivo del abuso de Cantharis, hay estranguria, retención de orina, etc.

En algunos casos, Kali nitricum puede substituir a Camphora, cuando los síntomas renales han sido producidos por Cantharis.

Se asegura que también Apis mejora la cistitis producida por Cantharis.

Aconitum frecuentemente se acomoda en el principio de las afecciones renales y vesicales, las que si no son modifieades, pueden llegar al estado que exige Cantharis. La urgencia para orinar, la disuria y la hematuria, vienen acompañadas de una inquietud ansiosa y elevada temperatura, todo lo cual es muy distinto del estado de Cantharis.

Asi como Cantharis obra sobre los tejidos reduciendo inflamación, en la misma forma excita el cerebro. De ahí encontramos al paciente, en ocasiones, violento, con paroxismos de rabia : se rasga los vestidos y pretende morder al que se le acerca. Da gritos descompuestos como si fuesen ladridos de perro; el más ligero tacto agrava sus síntomas, lo mismo que la presencia de algún objeto brillante, como un espejo o un vaso de agua. Todos estos síntomas son muy semejantes a los de la hidrofobia.

También se señala a Cantharis como un medicamento indicado en las convulsiones puerperales e inflamación del cerebro. Los ojos brillan, las pupilas están muy dilatadas y la cara es pálida o amarillenta y traduce la expresión de sufrimiento profundo.

Estos síntomas, indicadores de una acción inflamatoria del cerebro o sus meninges, encuentra su concordante más próximo en Belladonna, que tiene la mayoria de los síntomas ya citados. La diferencia entre

los dos medicamentos se encuentra en la expresión del rostro : Belladonna tiene cara roja y el pulso carotídeo es muy notable; generalmente en Cantharis la cara es pálida, amarillenta, constantemente contraído el ceño indicando un intenso sufrimiento. Cuando Cantharis es el medicamento de elección, casi siempre hay disuria.

Camphora y Arsenicum se relacionan muy de cerca con Cantharis. En los tres medicamentos hay ansiedad, inquietud y la expresión de sufrimiento; detalles que indican una enfermedad grave o la disminución de las energiás vitales.

Arsenicum se asemeja muy estrechamente a Cantharis en la producción de inflamaciones violentas, intenso ardor, paroxismo, sed, aspecto agónico y el subsecuente colapso. Ambos medicamentos pueden encontrarse indicados en la uremia; a pesar de que Arsenicum no tiene el eretismo sexual y su delirio va acompañado de una tendencia a la auto-mutilación o al suicidio. El paciente manifiesta temor a la muerte e inquietud, a menudo alternando con un estado en estupor.

Camphora, como Cantharis, produce delirio, convulsiones, manía sexual, priapismo, estranguria, ardor interior con frialdad exterior, hiperemia o inflamación de los órganos internos, como cerebro, estómago, vejiga. etc. La frialdad y pérdida de energías vitales, son ordinariamente consideradas como su efecto más característico; los síntomas de excitación, son los de reacción. En Cantharis al contrario, los principales efectos son los de excitación; la frialdad que se experimenta es el resultado de su acción prolongada o continuada. Prácticamente puede asegurarse que Camphora está indicado cuando hay delirio, manía o convulsiones, frialdad y extremada postración, especialmente si ha sido ocasionado por una erupción suprimida.

Sobre las superficies mucosas encontramos que Cantharis justamente produce una inflamación tan violenta, como lo hace sobre la piel. Está indicada en las inflamaciones de la garganta, de carácter diftérico, acompañadas de intenso ardor y de una sensación de desolladura, notable constricción de la garganta y laringe, pudiendo llegar esta constricción hasta la sofocación en cada intento de deglutir líquidos; diremos de paso que aun los mismos síntomas vesicales se agravan por tomar agua. Parece como si la vista del agua o el ruido de la misma produjera la constricción de los esfínteres. Cantharis se ha usado con mucho éxito en la difteria, cuando estos síntomas de la garganta y la disuria, han estado presentes y cuando la debilidad también ha sido notable.

Mientras que Belladonna tiene constricción de la garganta que empeora por la deglución de los líquidos, acompañada de intensa inflamación de la misma, no tiene la vesicación ardorosa y demás síntomas que caracterizan a Cantharis.

Tienen más estrecha relación con Cantharis en lo que se refiere a los síntomas de la garganta, los siguientes medicamentos : Mercurius corrosivus, Arsenicum, Arum triphillum, Diffenbachia y Capsicum.

Aun cuando Mercurius corrosivus tiene síntomas idénticos, deberán decidirnos por su aplicación sus rasgos característicos, además de que causa mayor inflamación, afectando especialmente la lengua. Hay lugar a formación de úlceras profundas, más bien que extensas como sucede en Cantharis.

En Arum triphyllum están agrietadas la lengua y las comisuras de la boca; hay coriza con descargas acres y la saliva es escoriante.

Diffenbachia ha ocasionado una intensa estomatisis con vesicación y ardor.

Capsicum, alivia las vesículas ardorosas; la boca y la garganta estan hinchadas y de color obscuro; produce constricción de la garganta, úlceras planas y los síntomas empeoran por la deglución.

Cinnabaris, se usa también en la escarlatina; el moco de la retrofaringe es amarillo, sucio-glutinoso; hay sequedad de la garganta que despierta por las noches al enfermo.

Apis tiene semejanza con Cantharis en los estados erisipelatosos de la boca y la boca y la garganta y en la difteria; pero la debilidad en Apis se presenta al principio, en Cantharis al final.

Sobre el tubo digestivo, encontramos que Cantharis produce una inflamación en el estómago, del mismo carácter y los síntomas ya mencionados: desolladura, gran sed, aversión por las bebidas y vómito.

Es útil en el tratamiento de la disentería; las evacuaciones son sanguinolentas y viscosas, están mezcladas con copos semejantes a raspaduras de intestino. Estos no son realmente fragmentos de intestino o pedazos de mucosa, sino formaciones fibrinosas resultantes de la inflamación. El tenesmo es marcado y casi siempre va asociado de disuria. Los dolores abdominales son como de colico, que obligan al paciente a doblarse; son de un carácter cortante, quemante, incisivo.

En la disenteria, Cantharis tiene muchos remedios que concuerdan con él. Uno de ellos es Colocynthis, que tiene los dolores cólicos que obligan al paciente a doblarse. Las evacuaciones son sanguinolentas y mucilaginosas que se empeoran por cualquier intento de comer o de beber; también contiene las llamadas "raspaduras de intestino". Colocynthis difiere de Cantharis en lo siguiente : los dolores cólicos de Colocynthis cesan después de evacuar, el paciente encuentra alivio doblándose y por la presión fuerte en el abdomen. Si se examina a los dos remedios bajo el punto de vista patológico, Cantharis produce mayor inflamación y Colocynthis mayor numero de síntomas nerviosos.

Otro medicamento muy semejante a Cantharis es Colchicum. Este produce distensión timpánica del abdomen; las evacuaciones intestinales están formadas por masas gelatinosas de color blanco y que van seguidas de violento tenesmo y constricción anal que atormenta al paciente más que la urgencia durante la evacuación.

Otro remedio concordante es Capsicum; muy útil en el tratamiento de la disentería que aparece en el tiempo húmedo. Es un

medicamento ideal para las personas robustas y de fibra laxa. Los dolores y demás síntomas se agravan por la más ligera corriente de aire frío o caliente. El hecho de tomar agua, produce estremecimiento y aumenta los dolores.

Sulphur se adapta muy bien a los casos crónicos y persistentes; especialmente cuando el tenesmo dura desde una evacuación hasta la siguiente, como en Nux vomica, o cuando la sangre y el tenesmo han disminuído, pero persisten las evacuaciones glerosas, con deseo frecuente y repentino.

Zincum sulphuricum ha curado muchas veces casos subagudos de disenteria; los dolores irradian a los lados del abdomen, probablemente en el trayecto de colon.

Kali bichromicum sigue bien a Cantharis, cuando aún persistiendo estas "raspaduras de intestinos" las evacuaciones son de aspecto gelatinoso.

Tenemos que hablar todavía de la acción de Cantharis sobre los órganos sexuales : Cantharis acrecienta el apetito sexual, produciendo un violento y casi insaciable deseo del coito, con erecciones tan violentas y persistentes, que llegan al priapismo; ni el mismo acto sexual reduce siempre la erección. Estos síntomas reclaman a la droga en la erección en forma de garabatillo durane el curso de la gonorrea. Indican también su empleo en la irresistible pasión, sea o no resultado de una afección mental.

Este priapismo de Cantharis no debe ser confundido con el de Picricum acidum. Bajo la acción de este último medicamento, el priapismo va asociado a padecimientos espinales, tales como mielitis, meningitis o ataxia locomotriz. Las erecciones son violentas y el pene se distiende casi a reventar.

Cantharis también obra sobre los órganos genitales femeninos produciendo ninfomanía, para cuyo estado puede ser muy útil. Podemos también hacer uso de Cantharis en el momento del parto; tiene la propiedad de expulsr molas u otros cuerpos extraños al útero. Podemos hacer uso de estas propiedades en el caso de retención placentaria, ya a término, después del parto, o después de un aborto.

Cantharis es un medicamento útil en las erisipelas, especialmente de forma vesiculosa. La inflamación erisipelatosa comienza sobre las narices; puede haber o no vesiculas; de aquí se propaga a una u otra mejilla con formación de vesículas, que al reventar dejan escapar un líquido escoriante.

Graphites también produce erisipelas que comienzan sobre la nariz, pero se adapta mejor a los casos crónicos.

A Cantharis debe recordársele en el tratamiento de las quemaduras, es notable lo que este remedio hará mitigando los penosos síntomas y acelerando la reparación de las superficies afectadas; puede ser dado al interior y aplicado localmente al mismo tiempo; si se administra en el principio de ligeras quemaduras, puede evitarse la formación de vesículas.

Para las quemaduras, puede compararse la loción de Cantharis, Sodium bicarb., Arsenicum y Carbolicum acidum; este último, cuando se ulceran las partes afectadas.

Dd himenopteros

Del orden de los himenópteros, obtenemos Apis mellifica, Vespa, Crabro, Formica rufaa y Bombbus.

Los efectos locales de los venenos de estos insectos, son bien conocidos; la piel se pone roja e hinchada con dolor quemante, a lo que puede seguir la formación de una escara.

En personas susceptibles o después de la absorción de considerables cantidades de veneno, los síntomas generales pueden desarrollarse, tales como el desmayo, postración, escalofríós, frialdad, gran inquietud o insensibilidad y aun puede producir la muerte.

Los piquetes de ciertas hormigas (Formica y no Termites, que son neurópteros), contienen un veneno cuyo principal componente es el ácido fórmico. Este ácido altamente irritante, también se encuentra en las glándulas adjuntas al pelillo de las ortigas, en algunas orugas y en el aceite rancio de trementina.

Apis mellifica

Para este medicamento tenemos dos nombres, de acuerdo con la manera de su preparación. O es Apis melifica, abeja obrera que produce la miel, o es Apium virus, el veneno de las abejas. La preparación original del medicamento fué del siguiente modo : se coloco sobre un platillo grande, una especie de capelo en el cual había un orificio por el que se introducía una varilla; se colocaron varios cientos de abejas en el interior del capelo, después se les agitó con la varilla en todas direcciones y las abejas, irritadas, picaban el capelo y el plato; poco después se dejaron escapar las abejas y se notaron numerosas gotitas; en seguida se vertió una cantidad conocida de alcohol sobre éstas y así se obtuvo el poderoso extracto del veneno de la abeja. este es el Apium virus. Posteriormente toda la abeja fué empleada; se hicieron trituraciones del insecto entero y así se obtuvo el Apis mellifica. Los síntomas de las dos preparaciones no han sido aislados. Apis mellifica es un medicamento relativamente nuevo, y una valiosa adquisición para nuestra Materia Medica. Con el fin de entender su sintomatología, vamos a estudiar su toxicología. Se puede, si se desea como ilustración, observar un piquete en una mano o un dedo. Justamente después del piquete, que produce un agudo pinchazo, se experimenta un ardor intenso y rápidamente comienza a hincharse en medio de fuertes dolores. La región se siente como si hubiera sido golpeada o machacada. La hinchazón adquiere en un principio un tinte rosado; se extiende rápidamente; los dolores son cada vez mas intensos, siendo de un carácter quemante, aguijoneante, punzante y rara vez vibrante. El calor de la

región aumenta con el ardor y el aguijoneo; esto puede terminar muy pronto por resolución o continuar; si continúa, se notara que el color rosado se vuelve más intenso y tiende a tomar un aspecto erisipelatoso. Más tarde aún cambia de color y toma un tinte pálido azuloso; la hinchazón al ser comprimida, demuestra que las partes están edematosas. Poco después, si las condiciones del estado general lo permiten, aparece la gangrena.

La experimentación nos enseña que los síntomas dérmicos o celulares, generalmente están presentes en cada caso en que Apis resulta el medicamento de elección; merecen por lo tanto ser mencionados enfáticamente. El dolor es tan importante como el frecuente ardor ya descrito; el agijoneo varía desde la simple magulladura, hasta la más delicada hiperestesia al tacto. De la inflamación del tejido celular, resulta una rápida efusión serosa, considerada como un síntoma general. La inflamación producida por Apis, no es, por lo tanto, de carácter esténico; no es por consiguiente como la que produce Aconitum, es decir, una inflamación repentina y que invade rápidamente, terminando por la resolución; no es como la que produce Belladonna, inflamación muy roja, acompañada de dolores pulsativos y que también termina ya sea por resolución o por supuración. La inflamación que produce Apis, es muy ditinta, es francamente astenica, . de coloración blanquecina y con tendencia a la gangrena y destrucción del tejido. En un caso en que la picadura había sido en la mano, el paciente se quejaba de una pústula maligna en la nuca.

Por la acción da Apis se reduce la vitalidad en forma alarmante, como lo demuestran los siguientes caracteres del medicamento : gran postración, deseo de acostarse, desmayos, y un presentimiento de muerte próxima, pero sin temor, en lo que se diferencia de Aconitum y Ars.; hay temblor nervioso, frialdad y pérdida de conocimiento principalmente en las fiebres eruptivas. El corazon se debilita, late muy despacio, haciéndose casi imperceptible el pulso radial.

Apis puede ser empleado en los trastornos mentales parecidos a la histeria. La paciente es excitable y baila con excesivo gozo; le causa risa el más grande infortunio como si estuviera en una comedia; es inconstante en sus ocupaciones.

Si se juzga por los síntomas mencionados, se verá que efectivamente, Apis puede ser utilizado en los trastornos mentales parecidos a la histeria. Las agitaciones, la inquietud, la excitabilidad y la hilaridad, reunidas a la inconstancia en el trabajo, han hecho que sea Apis un medicamento útil para las niñas nerviosas; se ha observado además que son torpes y que dejan caer los objetos, produciéndoles risa su torpeza; se excita la pasión sexual y son muy propensas a los celos. La confusión mental y la falta de percepción justamente anotadas, indican al medicamento en las enfermedades adinámicas, tales como en la escarlatina maligna, difteria, fiebre tifoidea, etc. Un completo estupor después de la apoplejía, indicaria a

Apis, cuando Opium ha fallado.

En la escarlatina la fiebre se eleva mucho, y inquietud coexistente es debida a la agitación nerviosa. La boca y la garganta están muy rojas; la lengua presenta ampollas en sus bordes y las fauces están hinchadas; hay ardor aguijoneante, sensación como de brasas y de escoriación en la boca y la garganta. La piel se siente como aguijoneada por agujas y la erupción va mezclada a un rash miliar; hay siempre abotagamiento de alguna parte de la superficie. La postración es rápida; la orina escasa o suprimida; hay fiebre alta y somnolencia.

En la fiebre tifoidea, el delirio es musitante. La debilidad es tan grande que la lengua se saca con dificultad, y es tal la relajación muscular que el enfermo se desliza hacia los pies de la cama.

La lengua está avejigada, seca, partida y aun ulcerada. Síntoma muy importante es el adolorimiento del abdomen al tacto.

En la meningitis y la irritación meníngea, Apis ocupa un lugar predominante como agente curativo. Es frecuentemente el remedio cualquiera que sea la enfermedad, cuando los gritos agudos durante el sueño hacen suponer una irritación cerebral. Tales casos, frecuentemente comienzan los característicos síntomas nerviosos del veneno de las abejas, pudiendo llegar a los estados más serios. En la meningtis tuberculosa o en los derrames cerebrales agudos, una erupción suprimida o mal desarrollada, es un buen síntoma para la indicación de Apis.

Podemos, en estos casos, comparar provechosamente a Apis, con Belladonna, Helleborus, Arsenicum, Bryonia, Zincum, Sulphur, Cuprum, Glonoinum, Lachesis, Rhus tox., Hyosciamus, Natrum mur. Bovista, etc.

Belladonna es frecuentemente empleado cuando Apis sería mejor aplicado; aun cuando un poquito de cuidado permitira al médico distinguir la agitación nerviosa de Apis, de la más intensa irritación cerebral de Belladonna. Las cóngestiones de Belladonna son más violentas y van acompañadas de latidos de las carótidas, los ojos rojos, inyectados y un sopor interrumpido por sobresaltos y gritos de terror. La adinamia es mucho menos marcada que en Apis. Si la enfermedad es la escarlatina, la erupción es lisa y de un rojo encendido, pero no miliar; la piel está caliente y la cara roja o en algunos casos pálida; pero no pálida y edematosa como en Apis; los ganglios cervicales pueden inflamarse, pero no hay infiltración celular con un rojo erisipelatoso, como en el veneno de la abeja.

Si hay irritación meníngea, Belladonna se hace necesario por los síntomas congestivos intensos; Apis, cuando la agitación nerviosa predomine, con agudos gritos que demuestran los penetrantes dolores o la agitación. En la meningitis, Belladonna va teniendo una indicación limitada a medida que los síntomas del derrame aumentan; en tanto que Apis tiene una indicación más precisa, mientras que los síntomas de irritación predominan y el grito cefálico es notable.

Helleborus reclama la preeminencia, cuando la irritación de Apis deja lugar al entorpecimiento mental, con falta de reacción; la frente está arrugada, las pupilas dilatadas y la mandibula inferior tiende a caer; el sopor es absoluto; hay movimientos automaticos en un brazo y una pierna; la frente se baña de sudor frío. En tales casos Helleborus puede despertar la reacción, para que otro medicamento fácilmente cure.

En la fiebre tifoidea, difieren notablemente. Aún cuando Apis tiene gran debilidad, apatía y estupor, tiene lengua seca, avejigada y dolor abdominal agudo. Helleborus produce completa apatía sensorial; las ventanas de la nariz están como ahumadas, el pulso es débil, lento y sin reaccionar al tacto o a la presión.

Bryonia sostiene alguna ligera semejanza con Apis, especialmente en los casos, en que como ésta, puede amplearse para las efusiones cerebrales. consecutivas a la supresión de un exantema. Pero el sensorio está entorpecido, aun cuando los sentidos no están tan pervertidos como en Apis o Helleborus. Hay un costante masticar; la cara es rojo-obscura; los labios resecos; cuando se le ofrece una bebida, la toma precipitadamente y con impaciencia; si se hace mover al niño, éste grita acusando dolores. Después, cuando la depresión sensorial llega al estupor, Helleborus le sigue bien, aun cuando el constante masticar continue lo mismo que la precipitación al tomar la bebidas. Apis sigue si el estado de sopor sobreviene con el grito cefálico mas agudo que en el caso de los otros medicamentos.

Cuprum se compara con Apis, cuando la meningitis resulta de una erupción suprimida, pero sus síntomas son claramente diferentes : Cuprum produce un grito fuerte seguido de violentas convulsiones; los dedos pulgares son aprisionados y la cara está pálida, con los labios azules; los globos oculares están constantemente girando. Si las convulsiones sobrevienen en el caso de Apis, son menos violentas, consistiendo en agitación y sobresaltos de la mitad del cuerpo; en la otra mitad son menos notables y permanece tamblorosa.

Sulphur está más estrechamente relacionado en la supresión de las erupciones; los dos se siguen bien el uno al otro.

Glonoinum, como Apis, tiene el grito cefálico; sensación de como si la cabeza estuviera enormemente dilatada. Los vómitos espasmódicos de origen cerebral, son más prominentes en Glonoinum, lo mismo que la congestión más intensa y los batimientos arteriales.

Zincum produce irritación cerebral; el niño despierta aterrorizado, mueve la cabeza, grita y se estremece en el sueño; constante movimiento de los pies. Está también indicado en los niños anémicos que están demasiado enervados para el desarrollo de un exantema. En los estados tifoideos la postración es muy notable, con inminente parálisis cerebral; hay inconsciencia, manos y pies azules, frialdad, pulso débil, mandíbula inferior caída. Aquí el óxido se ha empleado con éxito.

Rhus tox., aunque incompatible con Apis, tiene muchos síntomas

semejantes. En la escarlatina, por ejemplo, los dos se acomodan en la adinamia, con la garganta hinchada, inflamación erisipelatosa de la piel del cuello, rash miliar, somnolencia y edemas. En Rhus, sin embargo, la erupción es más obscura, la erisipela de un color rojo moreno y hay agitación corporal y no la inquietud nerviosa de Apis.

Arsenicum es semejante a Apis en muchos puntos; ambos tienen cambio de lugar ansioso, temor a la muerte, inquietud, gran debilidad (Véase también más adelante en muchas otras circunstancis). Pero aunque la irritabilidad mental ocurre en ambos, en Arsenicum es más marcada la ansiedad y el temor; en Apis, la inquietud nerviosa.

Si bien se parecen en las afecciones cerebrales, como posiblemente sucederá, especialmente en la hidrocefalia, Arsenicum, será el medicamento de elección cuando la piel esté caliente y la cara pálida y caliente. El niño yace en estupor; repentinamente se desvía la boca y las sacudidas agitan todo el cuerpo; o yace como muerto, con los ojos entreabiertos, hay moco adherido a la conjunctiva y no reacciona si se tocan los párpados.

Hyosciamus y Lachesis son semejantes en los celos.

Natrum mur., Bovista, Lachesis, Ætusa, Ignatia, Nux vom., producen torpeza; el primero sobre todo se parece a Apis.

Ya he indicado que Apis puede ser útil en las hidropesías. Los siguientes, son, en resumen, los síntomas que lo indican: en las hidropesías generales lo encontramos indicado, por el aspecto particular de la superficie del cuerpo, la piel es transparente y como de cera, con un tinte blanquecino, o puede ser ligeramente amarillo. La orina es escasa y casi siempre hay ausencia de sed. Los síntomas característicos son la transparencia de la piel y la falta de sed. Ahora, etiológicamente, Apis es más frecuentemente usado en la hidropesía de origen renal, sea o no la consecuencia de una escarlatina. La orina es escasa, con bastante albúmina y contiene cilindros renales. Hay hinchazón en los parpados; la superficie del cuerpo se siente adolorida y magullada, en algunos casos el dolor es de carácter quemante. Si la hidropesía es de origen cardiaco, los pies estan edematosos, especialmente después de andar. Todo esto va acompañado de una insoportable dolencia y ardor.

Aun cuando la hidropesía haya invadido el pecho y tengamos el hidrotórax, Apis puede ser el medicamento, especialmente cuando el trastorno es de origen cardíaco. El paciente está imposibilitado para acostarse; tiene la misma sesación constrictiva del pecho, que encontramos en Lachesis. Hay tos seca, que parece tener origen en la tráquea o laringe, generalmente en la tráquea, no cesando sino hasta la expectoración de una pequeña cantidad de flemas. Hasta aquí, es exactamente como Lachesis. Pero Apis, tiene además de estos síntomas, un síntoma mental que proviene del pecho y que es, una constante sensación de como si no pudiera sobrevivir. Esto no es una sensación de disnea, sino que parece ser una especie de angustia mental. Al paciente le es imposible comprender cómo podrá seguir respirando, tan grande es la sensación de sofocacion. Asociado a

estos síntomas del pecho, tiene una extraña sensación de como si fuera a morir, pero no hay el gran temor y la fiebre esténica de Aconitum, ni la gran inquietud de Arsenicum en el hidrotórax; no hay temor a la muerte.

En la pleuresía con derrame, Apis es uno de los mejores medicamentos que tenemos para la reabsorción del exudado. Apis y Sulphur, curaran en su mayoría estos casos.

Apis también obra sobre las membranas sinoviales, reproduciendo un perfecto cuadro de la sinovitis, particularmente cuando ataca a la rodilla. Está indicado cuando hay agudos dolores aguijoneantes a través de la articulación, con agravación por el más ligero movimiento.

Bryonia afecta las articulaciones y sus membranas sinoviales, pero los dolores son de carácter más punzante, acompañados de tensión y mejoran por el moderado calor de la cama, en tanto que los dolores de Apis, mejoran por las aplicaciones frías.

Iodium es útil en los derrames de la articulación de la rodilla y ha seguido bien a Apis, especialmente en los niños escrofulosos. (Compárese con Kali jodatum).

Tenemos todavía otra forma de hidropesia en la que Apis es un buen medicamento, es la hidropesía del cerebro, o sea la hidrocefalia. No está tan frecuentemente indicado en la hidrocefalia verdadera; es decir, cuando por efecto de alguna causa mecánica se ha declarado la inflamación de las membranas del cerebro, seguida de una acumulación de serosidad. Pero, repito que, en la meningitis tuberculosa es un remedio útil. Aquí Apis está indicado en la primera etapa; los síntomas que lo reclaman son los siguientes : el niño hunde la cabeza hacia atrás en la almohada y la hace girar de un lado a otro; a cada momento despierta con un penetrante y agudo grito; este grito peculiar es debido al dolor; un lado del cuerpo presenta convulsiones mientras que el otro parece paralizado. Hay estrabismo; el pulso es rápido y débil y la orina escasa. No hay remedio que dad que mencionare y que es la lentitud en su acción. En ocasiones se tendrá que esperar hasta tres o cuatro días antes de que se noten los efectos. La acción favorable del medicamento, se anuncia por el aumento en la cantidad de orina.

En las hidropesías, Apis puede compararse ante todo con Arsenicum, que tiene la misma transparencia de la piel y es también útil en las hidropesías de origen renal, hepático o cardíaco; las diferencias entre los dos medicamentos son las siguientes : Arsenicum, tiene sed insoportable, pero el paciente, sólo bebe a pequeñas cantidades y con frecuencia, porque el agua le molesta el estómago. Hay vómitos después de comer o beber. Yo he visto casos en los que una sola cucharada de té, ha provocado el vómito. El paciente revela una marcada inquietud.

Otro medicamento que debe compararse con Apis, es Apocynum cannabinum. Es muy usado en el Oeste para las hidroposías generales, para la hinchazón de una parte cualquiera del cuerpo, la

ascitis, hidrotórax, etc., ordinariamente sin ninguna enfermedad orgánica como causa. El paciente no puede tolerar ningún alimento. Estos o el agua son inmediatamente vomitados; hay una sensación de hundimiento, languidez y agotamiento en el epigastrio.

El medicamento que sigue en semejanza a Apis, es Aceticum acidum. Es útil en las hidropesias, cuando la cara y los miembros tienen apariencia de cera o de alabastro; especialmente está indicado cuando las partes más declives del cuerpo, el abdomen y los miembros inferiores, están hinchados; es por lo tanto útil en la ascitis; hasta aquí es semejante a Apis, pero siempre hay sed, lo que en Apis no, y los desarreglos gástricos casi siempre están presentes; hay eruptos acedos, pirosis y diarrea. Acidum aceticum es un medicamento injustamente descuidado en la hidropesía; por lo visto se notará que está colocado entre Apis y Arsenicum, difiriendo de los dos remedios por la preponderancia de sus síntomas gástricos.

En la hidrocefalia, el medicamento más semejante a Apis en la etapa de la exudación, es Sulphur. Se indica más bien por sus caracteres generales, que por su afinidad particular para las meninges. La meningitis tuberculosa, no puede ocurrir en un niño que esté sano en lo demás debe haber ahí una diátesis en el origen del mal. Sulphur es útil en la misma etapa en que Apis cuando éste no ha podido despertar la reacción y particularmente cuando el niño es escrofuloso y presenta algunos otros síntomas de Sulphur. El niño yace en estupor, con sudor frío sobre la frente; hay sacudidas de los miembros, particularmente los inferiores, con espasmo de los dedos gordos y algunas veces de los pulgares. La orina está suprimida. Sulphur estará indicado si ha habido retrocesión de alguna erupción, antes de que la enfermedad se haya desarrollado.

Helleborus es también semejante a Apis en la hidrocefalia; Apis es útil mientras hay todavía irritación del cerebro, como lo indica el grito encefálico. Helleborus está indicado cuando el entorpecimiento predomina y el niño pierde el conocimiento completamente. Las pupilas no reaccionan a la luz; la orina está suprimida; hay movimientos automáticos de un lado del cuerpo; se notará también una contracción particular de los músculos de la frente, especialmente del occípito-frontal; en los casos benignos, antes de que el estupor sea profundo, se encontrara a Helleborus indicado por estos síntomas. Este fruncimiento de la frente, existe junto con una continua masticación; el niño parece no desear nada, no pide nada; sin embargo, agua que se le dé, la toma con avidez.

Ahora diré algunas palabras respecto a las diferencias que hay entre Belladonna y Apis : Belladonna, generalmente no está indicada en la meningitis tuberculosa; es el primer medicamento, para la meningitis simple, pero no para la forma tuberculosa; Belladonna es esencialmente aguda por su sintomatología; cada síntoma aparece repentinamente y con gran intensidad, y la meningitis tuberculosa tiene un desarrollo lento; sin embargo, si los síntomas premonitores son violentos se puede emplear Belladonna en el estado de hiperemia

con dolores agudos, agitación, sacudidas, gritos durante el sueño, hundimiento de la cabeza en la almohada, pero deja de ser el remedio indicado, cuando la exudación se establece. La esfera de acción de Belladonna, termina cuando comienza la de Apis.

Hay otro medicamento que se acomoda algunas veces entre Belladonna y Apis, y es Bryonia, que actúa sobre las membranas serosas produciendo copiosa exudación; está indicado después de Belladonna; el niño se vuelve torpe por la compresión cerebral. La cara, repentinamente se pone roja y después palidece, siendo esto, generalmente un mal síntoma el niño grita, especialmente cuando se mueve en lo más mínimo; este es un síntoma característico. El niño está estuporoso, el abdomen está dilatado y la lengua generalmente cubierta de un blanco saburroso en el centro. Esto será todo lo que digamos acerca de Apis y sus remedios concordantes en las hidropesías.

El uso siguiente que nosotros podemos hacer de Apis, es en la erisipela. Es útil particularmente en la erisipela de la cara, cuando se inicia por debajo o cerca del ojo derecho y se extiende desde ahí cruzando la cara, al lado izquierdo; la región rápidamente llega a ponerse edematosa y al principio, presenta un tinte rosado. Los dolores pronto llegan a ser intensos, seguidos de ardor, y aguijoneantes; hay temperatura elevada, la piel está seca y ausencia de sed.

Ahora, si la enfermedad no es detenida y la cara adquiere un tinte livido purpúreo, como en los casos flegmonosos, en los que el proceso inflamatorio compromete los tejidos profundos causando destrucción de los mismos, Apis puede todavía ser el medicamento de elección.

Tiene varios medicamentos concordantes en la erisipela: el primero es Belladonna. La diferencia consiste en que Belladonna está indicado en la hinnchazón roja y brillante de la cara (la forma lisa de la erisipela). No hay gran tendencia al edema o a la vesicación; los dolores son siempre agudos, con latidos en las partes afectadas. Casi siempre el cerebro simpatiza de modo marcado, produciendo batimientos de la cabeza; ve visiones tan pronto como cierra los ojos; se agita y tiene estremecimientos durante el sueño; el pulso es lleno y duro.

Otro medicamento, mas semejante a Apis que Belladonna, es Rhus toxicodrendon. Hay que ser muy escrupuloso al diferenciar estos medicamentos, porque son antagónicos y no pueden darse el uno después del otro. Bajo la acción de Rhus tox., el color de la cara es rojo moreno y no rojo encendido como en Belladonna, no rosado o livido purpúreo como en Apis. Hay casi siempre vesicación que arde y aguijonea; esta es distinguida de la de Apis, por la preponderancia de la comezón. Bajo la acción de Rhus, generalmente la enfermedad va del lado derecho al izquierdo cuando invade la cara. Apis se coloca entre Rhus y Belladonna por su nerviosidad, participando de la inquietud del primero y de la excitación cerebral del segundo; ni el

uno, ni el otro, reproduce exactamente el tinte livido o azuloso de Apis. En esto, Lachesis se le asemeja más, en ciertos casos, cuando la cara está azulosa, pero los demás síntomas nos pondran en condiciones de distinguirlo.

Cuando la nariz es la región primeramente invadida, Apis debe ser comparado con Cantharis, aunque éste produce vesículas más grandes con más ardor.

Cuando la cara, después de la erisipela es sensible al frío, compárese Rhus tox., Belladonna, Hepar sulph., Silic., Sulphur, etc.

Apis puede ser usado en la urticaria, cuando repentinamente aparecen sobre la superficie del cuerpo ronchas blanco-rosadas; la comezón, ardor y aguijoneo, son intolerables; la erupción puede venir como resultado del frío o en el curso de la fiebre intermitente.

En esto, Apis es semejante a Arsenicum, que también produce urticaria y a Urtica urens. Este último se indica para las ronchas, cuando en extensión no son tan considerables como las de Apis; cuando la comezón y el ardor son intolerables y especialmente cuando el mal ha provenido por la ingestión de mariscos.

Terebinthina y Copaiva, son también útiles en la urticaria que resulta de comer mariscos.

Kali bromatum está indicado cuando la urticaria sobreviene con desarreglos nerviosos.

Debe pensarse en Rhus tox., cuando acompaña a las fiebres intermitentes o al reumatismo.

Bovista será el medicamento de elección cuando es acompañada de diarrea, siendo las evacuaciones intestinales seguidas de tenesmo y ardor.

Pulsatilla, cuando la urticaria es de origen gástrico o uterino.

Calcarea ostrearum, se adapta especialmente a los casos crónicos; y Sulphur y Rhus se indican cuando la molestia empeora al aire libre y sobre todo el ultimo, cuando empeora mientras se desviste el enfermo.

Apis también puede ser empleado en la variola, cuando hay intensa hinchazón y comezón.

También en el reumatismo, ya sea articular o muscular está frecuentemente indicado; en el reumatismo articular comúnmente llamado reumatismo inflamatorio agudo. Las partes afectadas se sienten tiesas y sumamente sensibles a la presión; hay con frecuencia sensación de adormecimiento; la articulación o articulaciones afectadas están hinchadas, experimentando el paciente una sensación de estiramiento. La hinchazón es más bien de un color rojo pálido y puede descubrirse alguna fluctuación en la articulación; hay ardor y aguijoneo que empeora por cualquier movimiento.

La debilidad paralítica en Apis es semejante a la que produce la absorción de venenos animales y puede compararse con los efectos subitos y violentos de ciertos vegetales y minerales.

Apis ha sido empleado con éxito en las parálisis que siguen a las afeciones debilitantes, tales como la difteria, fiebre tifoidea y también

cuando las efusiones meníngeas persisten después de la inflamación. Todos estos casos, sea que haya sido suprimido el exantema o éste exista, constituyen una indicación característica para el veneno de las abejas y la reaparición de los síntomas cutáneos deberá indicar su interrupción tanto tiempo como dure la mejoria asi producída. En esto, Sulphur es un gran coadyuvante.

En los casos de postración, el paciente está nervioso, inquieto y excesivamente sensible o enardecido y somnoliento, ya sea que tenga o no sed.

Apis produce un tipo de fiebre intermitente y puede, en consecuencia, ser empleado en la misma. El frío se presenta característicamente a las tres de la tarde y es acompañado o no de sed; una opresión en el pecho como si estuviera demasiado lleno, siendo esto resultado, en buena parte, de la congestión de las vísceras torácicas. El escalofrío empeora por el moderado calor de la cama y es seguido de calor enardecedor en todo el cuerpo, aumento de la sensación de opresión del pecho, somnolencia, pero generalmente no hay sed y el calor de la habitación llega a ser intolerable; después viene el sudor, aunque éste puede ser imperfecto; nunca hay sed durante el sudor, lo que es característico.

En la apirexia muchos de sus síntomas están presentes; el paciente a menudo se queja de dolores en la región costal en uno u otro lado; los pies están edematosos, la piel lívida y con aspecto céreo; la orina es escasa y puede haber urticaria.

Por esto se verá que está indicada en las formas más graves de estas afecciones, cuando el abuso de la quinina ha hecho confuso el caso y en las formas crónicas cuando el estado general está debilitado y hay repercusiones en el hígado, bazo, etc.

El medicamento más concordante con Apis en estos achaques, es Natrum muriaticum; está indicado en los tipos de fiebre intermitente idénticos a los de Apis; la principal diferencia consiste en la hora en que aparece el escalofrío; en el caso de Natrum es a las diez de la mañana y a las tres de las tres la tarde en Apis.

La elección de Apis en los tipos de fiebre tifódica, se funda preferentemente en el estado mental; el delirio no es de carácter activo; el paciente yace en el estupor y musita entre dientes; la cara está o no sonrojada, más frecuentemente pálida y como de cera: hay cierto grado de ansiedad como si se tratara de una afección visceral o es manifiesta una expresión de felicidad. La piel, en este tipo de fiebre, está enardecida en algunos lugares, mientras que en otros está más fría de lo natural y casi siempre seca; si hay sudor, es generalmente de carácter transitorio; tan grande es la postración del paciente que carece de fuerzas musculares para mantenerse en una sola posición sobre la almohada y sé desliza hacia los pies de la cama; la lengua está seca, partida y roja como en Lachesis; al intentar sacarla, queda temblorosa y apretada por las arcadas dentarias; casi siempre está cubierto su dorso de una capa obscura o blanquecina, mientras que en sus bordes, especialmente en la punta,

está roja y cubierta de pequeñas vesículas; la sensación de magulladura es muy notable en el abdomen abultado.

En estos casos Apis se parece a Muriaticum acidum, el cual presenta esta postración, pero además su característica diátesis ácida.

Apis, a más de los usos que se han mencionado, está indicada en la escarlatina. Aquí nos encontramos con la misma falta de reacción natural para producir la fiebre. Apis no está indicado en la variedad de Sydenham, en la que Belladonna sí está con frecuencia indicada, pero es útil cuando existe una erupción miliar que Belladonna no produce. El cuerpo esta muy caliente en algunos lugares, pero frío en otros. La erupción es de un color intensamente rojo, tanto como en Belladonna, pero difiere este remedio como se recordará, en la presencia de la erupción miliar. El niño está amodorrado y duerme la mayor parte del tiempo o bien somnoliento y, sin embargo, no puede dormir. Debemos recordar este último síntoma, porque es idéntico al que produce Belladonna. El estado de asoporamiento o la ausencia de sueño va asociado de agitación e inquietud. Se notará también que el enfermo está de mal humor y manifiesta en cada síntoma, estar muy irascible.

Este estado de agitación de Apis debe ser ditinguido del que produce Rhus y Belladonna; con Rhus, hay un estado de inquietud general del cuerpo y de la mente; el paciente está cambiando constantemente de posición y sin embargo no es la ansiedad de Arsenicum. En Apis, esta inquietud, proviene de una sensación neviosa general; en Rhus es un deseo de moverse.

La imposibilidad para dormir en Belladonna, proviene de la inflamación o congestión del cerebro. La hiperemia produce este estado de amodorramiento y el cerebro está tan agotado que el paciente no puede dormir.

Además de los síntomas ya mencionados para la escarlatina, encontramos que Apis está indicado cuando la enfermedad avanza hasta el derrame seroso en el cerebro.

Los síntomas de la garganta son importantes; a menudo se encontrarán membranas diftéricas sobre las amígdalas; la garganta en su interior está hinchada y de color rojo - rosado, mientras que exteriormente esta inflamada y con un tinte erisipelatoso azulado. Apis podría también usarse en esta enfermedad tardíamente, para las secuelas; es decir, para cuando los riñones han sido atacados y la anasarca aparece con albuminuria.

De nuevo encontramos a Apis indicado en la difteria. La enfermedad avanza tan insidiosamente que su presencia no es sospechada; desde el principio el niño está en una profunda postración con temperatura no muy elevada y somnolencia; el pulso es rápido pero no fuerte; al principio la garganta está como si hubiera sido barnizada; como si las amígdaleas y las fauces estuvieran cubiertas con un barniz rojo y lustroso. Las falsas membranas se forman sobre una de las amígdalas, más frecuentemente la derecha, que se engruesa y adquiere una apariencia como de cuero lavado; la lengua casi

siempre está inflamada de tal manera que el niño con dificultad puede pasar el alimento. Si es suficientemente grande para poderse explicar, se queja de una sensación como de un cuerpo extraño que necesita deglutir constantemente, lo que hace con mucha dificultad. la explicación de esto se encuentra en el siguiente síntoma : la úvula está inflamade y edematosa, cuelga como un saco de agua y por esto hay una sensación de plenitud. Si se examina la garganta detenidamente se encontrarán los bordes de la glotis, edematosos, rojos haciendose la respiración muy dificil; esto se debe a que la entrada de la laringe se estrecha. en algunos de estos casos el aliento es muy fétido, mientras que en otros es poco o nada.

En otros casos se encontrará como característico de Apis, un rash rojizo sobre la superficie del cuerpo, induciendo a pensar que se trata de un caso de escarlatina. La garganta en el exterior está hinchada y erisipelatoria y también para el edema de la glotis.

Hay muchos otros remedios semejantes a Apis en la difteria, uno de ellos es Arsenicum.

Arsenicum, se indica, como es de suponerse, en los casos serios cuando la garganta está muy hinchada tanto interior como exteriormente; la membrana es de un tinte obscuro y hay gran fetidez. Hay escurrimiento delgado y escoriante por la nariz. La garganta está edematosa como en Apis; el paciente está inquieto, sobre todo después de la media noche; la orina es escasa y puede haber constipación, o bien una diarrea acuosa y fétida.

Todavia, en otros casos, cuando a despecho del tinte obscuro y purpurino de la garganta y de la gran inflamación y postración, no hay mucho dolor, Natrum arsenicosum será el remedio indicado; aquí también la úvula cuelga como una bolsa de agua.

Hay todavía otro remedio y es Kali permanganicum. Este medicamento, raramente empleado en altas potancias, se indica cuando la garganta, interior y exteriormente esta hinchada, edematosa y horriblemente fétida y hay un escurrimiento nasal espeso. El gran característico es la fetidez.

Apis produce una irritación del revestimiento mucoso de la laringe y tráquea y también dolor de las paredes torácicas.

Se ha encontrado muy útil cuando los síntomas laríngeos acompañan a la erisipela, edema de la garganta, edema de la glotis o laringe y en la supresión de las erupciones; menos frecuentemente está indicado en la simple laringitis o en el catarro laríngeo.

La dificultad para respirar y especialmente el síntoma único de Apis "no ve cómo podrá seguir respirando", ha conducido al éxito empleando la droga en el hidrotórax, en el hidropericardio, en el edema pulmonar y en el asma.

Los dolores lancinantes en forma de dardo, las palpitaciones, la ortopnea, etc., convierten a Apis en un precioso medicamento en las inflamaciones cardiacas y en la hidropesía. Los síntomas esenciales parecen ser el edema o una inflamación brusca de las mucosas; la dispnea y los dolores repentinos, lancinantes o picantes; la inquietud

y la ansiedad. Debe compararse con Lachesis, Arsenicum, Sulphur, Belladonna, Kali carbonicum, Spigelia, Digitalis, Asparagus, Apocynum cannabinum.

Arsenicum y Apis tienen mucha semejanza; son muy parecidos en lo que se refiere a la agitación al cambio de lugar y a la dispnea y frecuentemente son mal aplicados el uno por el otro. La mejor distinción es la inquietud nerviosa peculiar de Apis. Si hay hidropesía, los dos pueden ser empleados, si los miembros están inflamados, hay tensión y están pálidos; pero Apis tiene frecuentemente enrojecimiento, comezón o existe un estado erisiplatoso y casi siempre falta la sed.

Belladonna puede también equivocarse muchas veces con Apis en las afecciones de la laringe; el último produce un estado inflamatorio más edematoso con la consiguíente dispnea; en cambío, en Balldonna, es más característica la constricción espasmódica.

En las afecciones cardíacas. Arsenicum, Apocynum cannabinum, Digitalis y Asparagus, tienen mucha semejanza con Apis, especialmente cuando hay gran debilidad e hidropesía. Apocynun cannabinum se hace necesario cuando el pulso es pequeño y débil y los batimientos cardíacos irregulares; unas veces débiles y otras veces fuertes, y hay desfallecimiento en el epigastrio. Asparagus se acomoda mejor a las personas ancianas con pulso débil y dolor en el acromión izquierdo.

Digitalis produce una apariencia pastosa de la piel; el pulso es lento o débil, con aceleración a cada movimiento del cuerpo; sensación de desfallecimiento y náusea mortal en el epigastrio, inmediatamente después de comer.

La tos no es un síntoma poco común en los casos que reclaman el uso de Apis. Se asemeja más o menos a Lachesis, Carbo vegetabilis, Rumex, Belladonna, Chamomilla, Crotalus horridus, Nux vómica, Bryonia, Ignatia, Arsenicum Hyosciamus.

Lachesis, Nux vom., Bryonia, Hyosciamus, están indicados cuando el moco es adherente. Pero en Lachesis hay intolerancia al tacto, aun a los vestidos, sobre todo al rededor del cuello, síntoma que no es muy marcado en Apis, excepto cuando esta presente la sensación de sofocación.

Rumex produce una tos molesta y persistente que se agrava por el aire frío o por todo lo que acrecienta el volumen o la rapidez del aire inspirado.

Chamomilla, difiere mentalmente.

Nux vom. cura la tos producida por un moco adherente en la parte más elevada de la tráquea, pero hay una sensación de aspereza y raspadura de la garganta.

En Bryonia la irritación epigástricia la irritación supræsternal y los dolores de la tráquea y paredes torácicas son agudos, punzantes, al mismo tiempo que hay sensación de magullamiento.

Ignatia produce una tos nerviosa, y mientras más tose el paciente, la irritación es más molesta.

Arsenicum produce sensación de ardor y cosquilleo en la fosa supraesternal, pero como coincide en esto con Apis, podría ser comparada con este último, especialmente cuando la tos acompaña a la hidropesía, a una enfermedad del corazón, etc. Arsenicum es realmente un concomitante.

Belladonna podría ser empleado sin razón en lugar de Apis; pero debe distinguirse por la característica constricción de la garganta y por la inflamación más intensamente enrojecida.

Corbo vegetabilis está indicado en la ronquera, cuando hay sensación de desolladura, pero la irritación es parecida a la que produjera el vapor del azufre.

Veremos ahora cómo Apis obra sobre los órganos genitales: frecuentemente esta indicado en las enfermedades de los órganos de la mujer; casi todas las experimentadoras han encontrado síntomas que se relacionan al utero o los ovarios; debe darse con cautela en el embarazo, porque empleado a dosis frecuentes y en bajas atenuaciones puede ocasiónar el aborto, principalmente en el tercer mes, pues produce una sensación de pesantez en el útero. Podemos emplearlo en la amenorrea, cuando hay congestión cefálica, con sensación de pesantez en la región uterina. Particularmente está indicada en la edad de la pubertad, cuando la niña es nerviosa y torpe. No se trata de una torpeza natural, sino que consiste en una incoordinación muscular. Con estos síntomas hay afluencia de sangre a la cara.

Podemos también hacer uso de Apis en las afecciones de los ovarios, especialmente del derecho; afecta en la misma relación el ovario derecho, como Lachesis lo hace con el izquierdo. Está indicado en la ovaritis con intensos dolores en la región ovárica derecha, cuando al mismo tiempo hay ardor y sensación de aguijoneo o alguna tumefacción que se descubre, ya por encima de la pelvis o de un modo más característico, a través del recto o la vagina.

En los quistes del ovario, Apis es un excelente medicamento para controlar su desarrollo, especialmente en las fases iniciales; debe agregarse aquí a la sensación de ardor y aguijoneo, un entumecimiento que desciende al muslo y abarca todo el lado derecho del cuerpo; hay una sensación de opresión en el pecho acompañada de tos, que no es sintomática de una afección de las vías respiratorias, sino refleja del útero.

Hay una mezcla de miel de abejas con sal, conocida con el nombre de Mel cum sale. Este fué un medicamento popular en Alemania para las molestias de la vejiga, y que son peculiares a la mujer. Lo he usado en el prolapso uterino y en las metritis crónicas, especialmente cuando va asociada a la subinvolución e inflamación del cuello; el síntoma característico que induce a usar esta mezcla es un dolor que atraviesa el epigastrio y va de ilion a ilion.

Apis puede ser útil en las enfermedades de los ojos. Yo he visto muchos casos de astenopía curados por este medicamento, cuando la lectura produce esozor con lacrimeo y comezón en los parpados y

algo de ardor y aguijoneo; también esta indicado en el estafiloma, con asiento en la escleróticas o en la córnea.

En las enfermedades externas del ojo Apis no carece de valor : los ojos se ponen muy sensibles a la luz; la conjunctiva está roja e hinchada y quemotica; sin embargo, esta inflamación de la conjuntiva palpebral que produce Apis es más bien congestiva que debido a la verdadera quemosis, como sucede en Rhus, el cual es muy semejante, especialmente en lo que se refiere a la hinchazón edematosa de los párpados; quemosis; lacrimeo abundante y caliente y erisipela. Pero Apis tiene menos tendencia a la formación de pus, síntoma que es altamente característico de Rhus tox. En Apis, los dolores son de aguijoneo; las exacerbaciones son vespertinas y el agua fría mejora la inflamación de los párpados. Si están erisipelatosos éstos, tienen un color rojo azulado, de apariencia acuosa como semi-transparentes. En Rhus, los dolores empeoran por la noche, particularmente después de las 12 p.m. ; el moderado calor de la cama los alivia; los párpados erisipelatosos tienen un color rojo moreno y juntamente con las mejillas, están salpicados de pequeñas vesículas acuosas. Los dolores en Rhus tox., son generalmente de un carácter tirante y desgarrante, aunque en la erisipela puede haber dolor y punzadas, pero con más escozor que en el veneno de las abejas. Los párpados casi siempre se sienten pesados y tiesos.

Arsenicum se compara con Apis en el lacrimeo caliente, violentos dolores y párpados edematosos; pero el lacrimeo es más acre; los párpados edematosos son pálidos y no rojo-azulosos; la conjuntiva palpebral y los bordes de los párpados son muy rojos; la inquietud es más pronunciada; la mejoría se experimenta, generalmente, por aplicaciones calientes, aunque el paciente escrofuloso puede abrir los ojos en el aire frío y libre, lo que no consigue en su habitación, aun cuando ésta esté obscura. Los síntomas empeoran después de la media noche.

Volviendo a los síntomas que Apis produce en los ojos, diremos que los párpados están hinchados, rojos y edematosos; hay ardor en los cartílagos tarsos, aglutinación en los párpados; repentinos y muy intensos dolores atraviesan los ojos que se alivian por aplicaciones de agua fría; generalmente se empeoran en la primera mitad de la noche. Apis frecuentemente está indicado en la oftalmía escrofulosa, en cuya afección, puede ser seguido a menudo por Kali bichromicum.

Me resta hablar solamente de los síntomas intestinales de Apis. Este puede ser un valioso medicamento en las diarreas, como por ejemplo, cuando se presentan en el curso de la fiebre tifoidea o de la escarlatina o bien como consecuencia de la influencia debilitante del calor continuado.

Será útil en la diarrea de los niños, cuando están muy debilitados; generalmente hay irritabilidad cerebral y un estado conocido como hidrocefaloide. Los síntomas son muy semejantes a los que reclaman a Apis en la hidrocefalia. El niño despierta con un grito; las deyecciones son delgadas y acuosas, amarillentas y generalmente

empeoran por la mañana; a cada movimiento del cuerpo, los intestinos funcionan como si el esfínter anal careciera de fuerza; las evacuaciones pueden o no ser fétidas.

Apis difiere de Bryonia, que produce diarrea por la mañana y que empeora por el movimiento; en Apis, el movimiento agrava, no porque sea uno de sus efectos generales, sino porque el esfínter anal está inseguro.

En los casos graves, se encontrará escasa la orina.

También puede pensarse en Apis en el panadizo. Los dedos se inflaman rápidamente; su superficie es tensa, rojo-brillante y hay violentos ardores y aguijoneo.

Bajo este punto de vista es muy semejante a Sulphur, que le sigue bien cuando su acción sea incompleta.

MODALIDADES - Apis tiene mejoría general por aplicaciones frías; muchos de sus síntomas empeoran por las tardes y en la noche; solamente la diarrea aumenta en la mañana. El movimiento generalmente agrava, como también se agrava el enfermo por estar en una habitación caliente.

Plantago y Lachesis, parecen antídotos de Apis y éste es complementario de Natrum muriáticum.

Ledum palustre fué propuesto por Teste, como un antídoto para los piquetes de insectos. El Dr. Drydale, ha curado con él, el escozor nocturno de los pies.

Para terminar me permito recomendar se tengan presentes las relaciones de Apis con Arsenicum, Acidum acéticum, Belladonna, Rhus y Sulphur, Debemos recordar también su antagonismo con Rhus.

Moschus

Del orden del los rumiantes, obtenemos el Moschus que es producido por el Moschus moschiferus o gamo almizclado. Se le encuentra en una bolsa colocada inmediatamente por detrás del ombligo, y es probablemente una secreción de las glándulas prepuciales.

La segunda palabra, moschiferus, es un calificativo necesario porque varios gamos almizclados están desprovistos de esta bolsa portadora del Moschus, tales son el Tragalus javanicus y el Meminna indica.

El olor de esta substancia es tan penetrante, que resulta molesta la caza de una pieza, porque el olor presiste aún después de lavarse cuidadosamente y cambiarse la ropa.

Moschus es de algún valor en las afecciones nerviosas y también en muchas formas graves de enfermedades. Inyectada en las venas de los animales, produce narcotismo con espasmos musculares, evacuaciones sanguinolentas y finalmente la muerte. Wood considera su acción sobre el hombre, como débil e incierta, aun cuando admitió su uso clínico cuando el sistema nervioso está deprimido y va acompañado de agitación, etc. Ringer lo consideró aplicado sin razón en la medicina, por su olor nauseabundo. Bartholow, Flint, Hammond

y Rosenthal, no lo empleaban en la histeria.

Algunos autores americanos lo emplean con más confianza la pneumonía y en el espasmo de la glotis. Trousseau, con su caracteristico conservatismo, condena las exageradas alabanzas de los autores antiguos, y procede según su propia manera de pensar, para definir su aplicación exacta en las enfermedades.

En nuestra propia escuela, la exactitud de sus prescripciones ha ejercido su influencia, para definir más claramente el poder de Moschus, demarcando en estas condiciones su acción dentro de límites razonables. Los experimentos de Joerg y Sunderling que Allen ha adoptado incorporándolos a su Enciclopedia, son considerados por algunos como contradictorios. Sin embargo, no se oponen a otros experimentos hechos con diluciones o por inhalaciones y por eso son de valía y merecen ser retenidos.

Homoeopáticamente empleado, Moschus se usa en diversas afecciones cuando los síntomas nerviosos predominan. La enfermedad, en consecuencia, no sigue su desarrollo normal, sino que permanece sin curación, con manifestaciones de síntomas serios que indican un agotamiento nervioso. A el se recurre algunas veces en la histeria y la hipocondríasis.

Moschus porduce además numerosos síntomas que se refieren al sistema nervioso. Los siguientes son especialmente dignos de atención : el paciente esta excitado como por el alcohol; el pulso es lleno y frecuente; la temperatura ligeramente elevada; hay congestión cerebral y desvaríos; monta en cólera habla rápidamente y con confusión; riñe hasta que los labios se le ponen azules, la cara palidece y cae en estado de inconsciencia; hay ansiedad, cualquier ruido le produce susto y tiene además, angustia de muerte; siente desaliento, hay frialdad, la cara está pálida y hay completa inconsciencia; llora un momento y se echa a reír después de un modo precipitado; hay delirio, insomnio; contracciones nerviosas musculares; ataxia, la cara tiene una expresión de sorpresa; las convulsiones son más tónicas que clónicas.

Síntomas concomitantes : taquicardia, como ocasionada por una ansiedad desesperada; nerviosidad; atareado pero débil; pronto desiste de lo que está haciendo; hay temblor nervioso; lipotimia; la cara está pálida, hay frialdad; sueño durante el día; fluxión de sangre a la cabeza; la mirada fija; inestabilidad vertiginosa, falta de firmeza como si alguna cosa se moviera de arriba abajo; vértigo, dolores de cabeza, espalda y piernas, acompañados de una sensación de estiramiento, inflexibilidad o tensión; los músculos y la piel sumamente restirados (espasmo tónico); frecuentemente se queja de náusea; cólicos en la región umbilical, como si hubiera desgarro provocado por un garfio; desasosiego en los miembros inferiores que empeora por estar sentado; gran timpanismo, desmayo, orina copiosa y clara, espasmo de la glotis. La menstruación se adelanta mucho y es demasiado profusa, yendo precedida de cansanicó, tirantez y tensión que se propaga a los órganos genitales.

Hay aumento del deseo sexual con titilación local.
Repentina sensación en la parte mas elevada de la laringe, como si se cerrara al respirar.
Una especie de compresión torácica que se revela por cierta inclinación a toser, gradualmente va aumentando hasta hacerse verdaderamente desesperada; hay una constricción sofocante del pecho.
Los más importantes síntomas histéricos que produce Moschus, son: ataques hasta el más completo desmayo o pérdida del conocimiento; frialdad de la superficie del cuerpo; cara pálida; paroxismos de sofocación, riñe hasta caer sin conocimiento.
Debe compararse con Castoreum, Nux moschata, Asafoetida, Amoniacum, Valeriana, Ignatia, Magnesia mur. Camphora antidotiza muchos de los síntomas de Moschus, especialmente si la inconsciencia y la frialdad estan presentes.
Castoreum proviene del saco prepucial del castor. Como Moschus, produce nerviosidad, contracciones nerviosas y menstruaciones desordenadas. Pero se adapta más a los síntomas nerviosos que preceden a la histeria completamente desarrollada. Conviene a las mujeres que padecen una debilidad irritante, predominando los síntomas abdominales.
Chargé, por ejemplo, lo emplea en las mujeres que durante la convalecencia de una enfermedad agotante, como la tifoidea, sufren afecciones espasmódicas y sacudimientos musculares nerviosos, con agotamiento extremado. La falta de reacción nerviosa tiende a prolongar la convalecencia de un modo anormal y Castoreum fortificando el sistema nervioso, apresura el restablecimiento.
Trousseau emplea este medicamento para los cólicos nerviosos acompañados de palidez, sudor frío y pérdida repentina de las fuerzas, causados por emociones, enfriamiento de los pies, etc. También para la amenorrea con timpanismo doloroso; la sangre menstrual sale por gotas, debido al tenesmo uterino. Teste considera estos síntomas como de la mayor importancia.
Las experimentaciones desarrollan una serie de síntomas enteramente de acuerdo con estos efectos clínicos. Las mujeres son nerviosas, tímidas y tristes, poniendose caprichosas durante la menstruación. Hay dolores desgarrantes que mejoran por la presión o el frotamiennto. Sensación de presión desgarrante en distintas regiones durante la menstruación.
El abdomen está distendido, hay flatulencia; esta distensión se propaga con dolores a las regiones inguinales, con deseo frecuente de evacuar durante las reglas y dolores incisivos a nivel del ombligo.
Las evacuaciones intestinales son muco-sanguinolentas o acuosas de color blanquecino, produciendo ardor en el ano. Pueden ser verdes, también con ardor, precedidas de cólico que mejora por la presión o por encorvarse.
Un médico español ha confirmado esta modalidad de Castoreum: mejoría de los dolores por la presión. Podemos aprovecharnos de la

experiencia de autoriadades francesas y españolas en el tratamiento de afecciones nerviosas, porque con motivo de sus particularidades nacionales, frecuentemente tienen oportunidad de tratar tales casos.

Las semejanzas entre Moschus y Castoreum son más bien por la clase de padecimientos en que están indicados, que por sus síntomas especiales. Sin embargo, Trousseau los coloca juntos en los ataques nerviosos cuando el aura epiléptica o histerica, parte de las vísceras abdominales. Pero sólo Moschus produce ataques histéricos claramente desarrollados, con espasmos pulmonares, laríngeos e inconsciencia.

Diremos de paso que Castoreum ha corregido las evacuaciones verdes, sueltas y mucosas, cuando se han presentado en niños débiles y nerviosos, que debilitados por el calor del verano o durante la dentición, no han reaccionado a los medicamentos acostumbrados.

Nux moschata ejerce una original influencia sobre la mente. El estado varía desde una perplejidad en que sus conocidos le parecen gente extraña, volviéndose contemplativo y fantástico, hasta un estado de enajenación, somnolencia, y finalmente, profundo estupor con pérdida del movimiento y de la sensibilidad. Estos estados mentales pueden alternar. A veces se ríe como si todo le pareciera cómico; chancea aun tratandose de asuntos serios. Repentinamente cambia esta situación y se pone triste, gime y llora aparatosamente, o revela una expresión de estupidez; todas sus ideas se desvanecen y parece como agobiado por el sueño. Hay además, errores de percepción, le parece que un momento de inconsciencia ha tenido larga duración; dice tener las manos demasiado grandes; los objetos le parecen disminuir gradualmente de tamaño cuando los ve con fijeza. Las funciones corporales están bajo la misma influencia. Hay un gran debilitamiento y sensación de magulladura desde la cintura hasta las piernas; las rodillas se sienten débiles, como después de una larga jornada; hay postración, tendencia al desmayo; respiración difícil; agolpamiento de sangre al corazón; piel fría y seca. Hay un relajamiento tal, que el pulso y la respiración son apenas perceptibles; la cabeza cae hacia adelante, la barba toca el pecho; como un masa inerte se balancea la cabeza; los intestinos están enormemente distendidos por los gases, como si la digestión fuera muy lenta. Aun los excrementos blandos son expulsados con dificultad. Esta es la atonía general, que por excelencia ha curado Nux moschata, no solamente en la debilidad histérica, sino en la fiebre tifoidea y el cólera infantil. Los síntomas histero-espasmódicos del medicamento están íntimamente relacionados a las manifestaciones antes mencionadas; la cabeza cae hacia adelante; hay trismus; el corazón está como oprimido; violenta opresión cardiaca, con sensación de choque; espasmos tónicos seguidos por espasmos clónicos; inconsciencia y desmayo.

Los síntomas concomitantes son : gran sequedad de la boca y la garganta, de lo que el enfermo, con su tendencia a exagerar, se queja escandalosamente. La más pequeña excitación emotiva

remueve los síntomas, aumentando la distensión abdominal, etc. La piel está seca y fría, sin tendencia a sudar; hay palpitaciones cardiacas y pulso variable.

Se ha abusado tanto de Valeriana como antiespasmódico, que los homeópatas casi lo desdeñamos. Pero ocupa un lugar definido en el tratamiento de la histeria, diferente a Moschus, Asafoetida y otros medicamentos nervinos. No se adapta con claridad al espasmo histérico acompañado de inconsciencia como las drogas ya estudiadas, sino a un estado de excitación nerviosa y vascular.

Hay irritación mental y corporal; la paciente está nerviosa, alegre, platica rápidamente y hay violenta sucesión de ideas. Algunas veces le parece que es perseguida por algún peligro y los objetos que le rodean le parecen desconocidos. Sufre una cefalalgia que le desvanece e inquieta. Sus músculos están tan irritados, que no puede permanecer quieta, necesita moverse; este estado despierta sus dolores. Las experimentaciones han producido dolores agudos, sacudidas como de calambre, punzadas aguijoneantes o lancinantes. Todo esto empeora cuando la enferma se sienta y mejora cuando camina. La circulación también está exagerada; la cabeza se siente llena a reventar; hay calor y constante intranquilidad; una sensación de calor seco y bochornos en la tarde mientras permanece sentada. Por las noches no duerme debido a la inquietud y por las mañanas cae en un sueño interrumpido por desvarios. La digestión es imperfecta Antes de comer tiene un sabor como de sebo rancio, mientras que por las mañanas al despertar, es insípido y gleroso. Náuseas, como si un hilo pendiera de la garganta y partiera de la región umbilical, elevándose gradualmente hasta las fauces. El abdomen está abultado.

En el orden de las umbelíferas tenemos dos gomas, que han sido usadas en las afecciones nerviosas. Me refiero a Gumma ammoniac. y de una manera especial a Asafoetida.

Esta última actúa de un modo prominente sobre los ganglios abdominales y desde ahí se extiende su acción a todo el sistema nervioso. Sus efectos más característicos, son los siguientes: inversión de la acción peristáltica de los intestinos, estómago y particularmente de la garganta; eructos rancios y sonoros con salivación profusa; sabor a sebo; sensación de ardor en el estómago y esófago; enorme meteorismo gástrico; evacuaciones intestinales pulposas, de color café y olor repulsivo. Compresión espasmódica del pecho, como si los pulmones no pudieran ensancharse libremente; opresión al grado de causar un intenso sufrimiento; el corazón está congestionado y distendido, con pulso débil; sensación de tirantez y estrechez en varias regiones del cuerpo. El pulso, además de ser débil, es pequeño y hay frialdad en la región lumbar. La opresión que se siente es generalmente de adentro hacia afuera. Hay dolores comparables a los del parto en la región uterina. La orina es de color café y olor acre. Más tarde, como la paciente se debilita, hay indisposición, bostezos, estremecimiento de cuando en cuando,

vértigo, debilitamiento visual y sudor frío.

Clinicamente se ha confirmado que Asafoetida se adapta a pacientes nerviosas, cuando su estado es consecuencia directa de la detención de evacuaciones habituales, como la curación por medios externos de las úlceras resumantes, la supresión repentina de una diarrea, etc. También después del abuso del Mercurio, cuando además de la nerviosidad, están presentes las afecciones de los huesos y del periostio. Hay extremada sensibilidad en la región afectada e intensos dolores nocturnos. Las mujeres son frecuentemente aliviadas por Asafoetida, cuando una espectoración habitual es detenida bruscamente, siguiendo a esto los síntomas histéricos acompañados de opresión toracica. Aquí el medicamento deja entrever una semejanza de familia con Gumma ammoniac., la que se ha dado frecuentemente para casos pulmonares semejantes.

Moschus y Asafoetida, concuerdan en la producción del globo histérico en el espasmo del pecho y en las palpitaciones. Moschus se adapta mejor al espasmo histérico, muy acentuado, cuando hay desmayo e inconsciencia. Asafoetida produce excresiones más fétidas y el globo histérico es consecuencia de la inversión de los movimientos peristálticos. En cambio, el desmayo no ha sido notado más que cuando la intensidad del dolor lo produce. Hay también timpanismo marcado.

Magnesia muriática se asemeja a Asafoetida y también a Moschus. Como las otras preparaciones de Magnesia, afecta el estómago, intestinos y sistema nervioso. Así, el Carbonato y el Fosfato, están indicados en las neuralgias, especialmente en los casos sujetos a repetidos ataques debidos a la debilidad nerviosa. La Magnesia muriática, sin embargo, ha probado ser eminentemente útil en la histeria. Observamos prominentes síntomas abdominales; náuseas con acumulación de agua en la boca; hígado dilatado, lengua agrandada, flácida y amarilla; el enfermo necesita apresurarse cuando trata de evacuar, siendo las evacuaciones desmenuzadas y como quemadas; indicando todo esto una combinación de síntomas abdominales y nerviosos; hay ruidos en el abdomen con sensación de calambres, tensión y un dolor como si los intestinos estuvieran despedazados; sensación de como si una bola subiera hasta la garganta e impidiera la respiración, mejorando por los eructos.

Los gases se acumulan en el estómago y abdomen, ocasionando síntomas espasmódicos reflejos debidos a la irritación nerviosa.

La indicación de Mg. mur., es además confirmada por los síntomas siguientes : accesos de desmayo durante la comida, ansiedad con náuseas, palidez de la cara; temblor del cuerpo que mejora por los eructos. Puede haber además repentina pesantez en el pecho durante la comida, náuseas, secreción salival abundante; calor que sube a la cara; todos estos síntomas parecen mejorar por los eructos o el vómito.

Se han observado ilusiones caprichosas. Muy importante es el dolor de cabeza; constricción violenta en los dos temporales; sensación de

como si fuera a presentarse el vértigo y pérdida del conocimiento, desapareciendo al comprimirse con ambas manos. El dolor mejora por envolverse la cabeza.

El flujo menstrual es de color obscuro, coagulado, con dolores en el dorso al caminar y en los muslos cuando se sienta. Espasmos uterinos con tensión en las ingles. (Hale conjetura que es sobre los ligamentos anchos). Dolores cortantes en el bajo vientre durante las reglas; calambres en el abdomen, con presión en el recto y órganos genitales.

Palpitaciones de corazón, no como las que produce Moschus (como de ansiosa espectación) sino inorgánicas; porque sobrevienen estando sentada y al levantarse del asiento; desapareciendo por el movimiento. Esto ha sido confirmado varias veces.

Resumiendo brevemente: la enferma de Moschus está excitada, regañona, propensa al desmayo con indiferencia, frialdad; espasmo de la glotis y de los pulmones.

En Castoreum, la enferma está deprimida, agotada, los dolores mejoran por la presión; el cólico menstrual se presenta con palidez y sudor frío.

En Nux moschata, hay errores de percepción, amodorramiento, desfallecimiento, enorme timpanismo, opresión que va del corazón a la garganta, piel seca y fría.

En Valeriana, los nervios están irritados, no puede permanecer quieta; hay subsaltos musculares, calambres, mejoría por el movimiento, sabor de sebo o gleroso.

En Asafoetida hay inversión de los movimientos peristálticos, eructos rancios, flatulencia fétida, opresión del pecho, secreciones detenidas.

En Magnesia muriatica, hay desfallecimientos en la comida; la mejoría se presenta por eructar; la cabeza mejora por la presión y envolviéndola; las palpitaciones mejoran por el movimiento; las evacuaciones intestinales son desmenuzadas.

Moschus ha sido empleado por los médicos alópatas, cuando en el curso de una neumonía, se tiene un delirio puramente nervioso. El cerebro está muy excitado y el paciente habla tonterías con furiosa vivacidad. (Trousseau).

Nosotros empleamos estos remedios para casos precisamente como éstos que mejorarán el sistema nervioso en la debilidad irritable y permitirán a la enfermedad seguir su curso normal.

Los siguientes medícamentos pueden ser muy útiles en las enfermedades complicadas por ausencia de reacción debida a la debilidad irritable : Moschus, Ambra grisea, Asafoetida, Valeriana, Castoreum, Coffea, Scutellaria, Cypripedium, Coca, Zinc ox., China, Camphora, Agaricus y Tarentula.

Sepia officinalis

Perteneciente a los moluscos hay un animal llamado Sepia, jibia o pulpo. Una substancia calcárea, dura, que proviene de la jibia, se

sabe que es utilizada para alimentar a los pájaros. El animal posee un saquillo que contiene un liquido de color café obscuro, casi negro.

Cuando es perseguido por algún pez grande deja escapar este liquido y así, enturbiando el agua, se protege de su enemigo. Durante mucho tiempo se había creído que este líquido no tenía ningún otro uso. Se le había supuesto sin ninguna acción cuando era ingerido. Después de los experimentos de Hahnemann se ha demostrado la falsedad de esta creencia; hay probabilidades de certeza de que esta jibia usa también el líquido para matar a los pequeños peces en los cuales hace su presa. La palabra Sepia, es el término comúnmente empleado para designar este medicamento en nuestra Materia Médica. Justamente el líquido de referencia es la parte empleada. Los artistas se sirven de él frecuentemente. La historia de la introducción de esta substancia es la siguiente:

Afirma el Dr. Hering, que es una autoridad, que un íntimo amigo y paciente de Hahnemann, artista, tenía el hábito de humedecer con su propia saliva el pincel lleno de la mencionada tinta. Como no cedieran a su tratamiento sus padecimientos crónicos, Hahnemann, sugestionado por esto, creyó que la tinta era la causa de sus síntomas persistentes. Ordenó al enfermo la modificación de su costumbre, el que no obstante dudando, la modificó protegiendo su boca con un resguardo impermeable y en breve espacio de tiempo desapareció su confusa enfermedad. Hahnemann hizo después experimentaciones con Sepiæ succus y todo los síntomas observados por el desde entonces, han sido confirmados después. En 1874 el Instituto Americano de Homeopatía, actuando bajo la idea de que nuestros antiguos medicamentos deberían ser rectificados, inició la tarea con Sepia.

Se hicieron más o menos veinticinco experimentos con el medicamento desde la 3a. hasta la 200a. potencia.

En la sesión de dicha sociedad en 1875 se hizo mención de estas experimentaciones y se declaró que los datos legados por Hahnemann no podían ser mejorados.

Sepia es un medicamento de inestimable valor. Obra especialmente sobre el organismo femenino, aunque también sobre el masculino. Se adapta particularmente a la mujeres delicadas, con una piel demasiado fina, sensibles a todas las impresiones, generalmente de pelo obscuro, aunque no necesariamente; su cara es frecuentemente de color cetrino y hay ojeras obscuras.

Obra sobre las fuerzas vitales, así como también sobre diferentes órganos del cuerpo. Obra de un modo notable sobre la circulación, que se trastorna más y más a medida que el experimento avanza. Cuatro horas después de iniciado el experimento, se desarrollan bochornos y ebullición de la sangre; estos bochornos terminan con sudor, debilidad y desmayo; cualquier movimiento o ejercicio es seguido de oleadas de calor y francos sudores.

Con este estado coexiste un eretismo del sistema nervioso, que produce agitación, ansiedad, etc. Estos dos grupos de síntomas

hablan de la influencia perturbadora que Sepia ejerce sobre el sistema nervioso de la vida animal y especialmente sobre los nervios vaso-motores. Por este motivo se producen los dolores de cabeza y las diversas congestiones locales.

Bien pronto aparecen los síntomas que indican el relajamiento de los tejidos y la debilidad nerviosa. El experimentador languidece, está postrado y desmayado. Las articulaciones están flácidas, como si fácilmente pudieran dislocarse. Las vísceras trabajan lentamente, de donde proviene la bien conocida sensación de languidez, etc., Las congestiones venosas se extienden y, naturalmente, aumentan en razón de la debilidad de los nervios vaso-motores. El útero prolapsado llega a estar más y más congestionado; la estasis portal aumenta y el hígado está inactivo y se siente pesado. Los vasos sanguíneos están llenos y en consecuencia los miembros inferiores se sienten adoloridos, magullados y como cansados. La influencia general que deprime las energías vitales, se manifiesta por gran debilidad, desmayos y temblor. Los miembros del cuerpo, especialmente los inferiores, se sienten pesados como si estuvieran paralizados; rigidez y pesantez de las piernas, especialmente después del sueño. Los esfínteres, al igual que todos los tejidos cuyo funcionamiento depende de los músculos lisos, están debilitados. Por esto el recto llega a prolapsarse. Las evacuaciones intestinales y de la vejiga, son tardías, y lentas, y sin embargo, no hay una parálisis completa.

Los cambios orgánicos se manifiestan en el tinte de la piel que es amarillo terroso; en las secreciones que son corrompidas, agrias y excoriantes, etc.; el estado de la piel que da exhalaciones fétidas, tiene predisposición a las erupciones, decoloración, descamación, úlceras, etc.

Entre las condiciones que modifican el estado de Sepia, ninguno más importante que los efectos del movimiento. Dos o tres experimentadores encontraron marcado alivio de sus síntomas por el ejercicio violento. Uno de ellos, por todos los ejercicios, menos por el de equitación. Pero también muchos de sus síntomas empeoran por el esfuerzo. ¿Cómo los podremos entonces separar? Como muchos de los síntomas provienen de la laxitud de los tejidos, con entorpecimiento y sobre todo, con ingurgitación de las venas, el ejercicio, favoreciendo la circulación de retorno produce la mejoría. La agravación de los síntomas por la equitación o por el movimiento de un barco, se explica porque agita las partes sensibles y favorece la congestión venosa, aumentando necesariamente las molestias. Pero los dolores de cabeza, el estado de depresión y de desfallecimiento, los dolores sacro-lumbares y frecuentemente también el prolapso uterino, son agravados, naturalmente, por la marcha.

En resumen, se ha encontrado que Sepia obra bien en los hombres o más frecuentemente en las mujeres abotagadas y laxas y con menos frecuencia en las extenuadas; en las que tienen la piel de color amarillo sucio o café; en las de piel manchada o con erupciones y

propensas a sudar, especialmente en los genitales, las axilas y en la espalda; las que sufren bochornos de calor, como de relámpago y cefalalgias matutinas, que despiertan embotadas y cansadas y que están sujetas a enfermedades de los órganos genitales. El hombre padece eretismo sexual, pero sin energía y el coito le produce gran agotamiento. (Neurastenia). La mujer tiene eretismo con histeria o útero prolapsado, palpitaciones, bochornos, desmayos, etc. En ambos casos puede haber estasis portal, hipofunción hepática; dispepsia atónica, movimientos intestinales muy lentos; ácido úrico en exceso en la orina, con los signos que acompañan a los desórdenes de la digestión y la asimilación. La actitud en lo general nunca es de vigor o de buena salud, sino más bien de flacidez, de postración y propensión a la paresia.

Recordaremos mas adelante que los síntomas de Sepia son notablemente peores en la mañana y en la tarde, entre estas dos horas hay una mejoría general, siendo numerosas las confirmaciones de este hecho.

Ahora estamos ya preparados para revisar los síntomas en detalle y para determinar si coinciden con las aserciones hechas anteriormente.

Para comprender la sintomalogía de un medicamento, tan extensa como la de la Sepia, que tiene en su patogenesia como dos mil síntomas más o menos importantes, necesitamos considerar su acción sobre los diversos tejidos que afecta. Estudiaremos primeramente el tejido sanguíneo: Sepia produce un gran desarreglo en la circulación, muchos de sus síntomas parecen depender de la congestión venosa y ésta se nota con especialidad en el sistema porta. Revisando algunos de sus síntomas basados en esta condición patológica, encontramos bochornos que parecen originarse en el tórax y remontarse a la cabeza con ansiedad y naturalmente una sensación de opresión, que termina con sudor. Batimientos en todo el cuerpo, particularmente en el epigastrio, región hepática, uterina y renal. Este síntoma es muy común en la histeria y en la clorosis. Epistaxis, ya sea de causa mecánica, como un golpe o una caída, o por estar en una pieza muy caliente o bien por supresión de las reglas. Dolor pulsativo en el útero. Al ser éste examinado, se encuentra inflamado, lleno de sangre, sensible al tacto y desplazado, como lo veremos al hablar de los síntomas locales. Las manos están calientes y los pies fríos; otras veces las manos están frías y los pies calientes. Esta es una excelente indicación para Sepia.

Vamos a considerar ahora los síntomas de la piel. Encontraremos de nuevo que su acción es acción es debida a una circulación venosa defectuosa. Sabemos que cuando los nervios vaso-motores están inactivos la piel es más susceptible a los efectos de la irritación y particularmente al desarrollo de las erupciones herpéticas que caen bajo la es acción de Sepia, especialmente en torno del codo y de la rodilla. Las úlceras se pueden formar en las articulaciones y de un modo especial en las de los dedos de las manos. Bajo la acción de

Sepia son generalmente indoloras. Hay solamente otros dos medicamentos que conozco que tienen los mismos síntomas, y son Borax y Mezereum. Sepia se ha revelado muchas veces como un buen medicamento para el herpes circinatus.

Sepia produce también manchas de amarillo café, comezón, rubicundez, humedad, úlceras y pústulas escamosas. La urticaria se mejora cuando el enfermo permanece en una pieza caliente, pero el moderado calor de la cama agrava la comezón. Dunham, guiado por la tendencia del medicamento a producir escamas, lo recomienda como antídoto en el envenenamiento por el Rhus.

Sepia presta buenos servicios en el tratamiento de la psoriasis, aunque es inferior a Arsenicum y a Arsenicum iodatum.

Las manchas amarillo-cafés, han sido también curadas por Lycopodium, Nux vóm. y Sulphur. El Curare ha sido empleado por el Doctor Baruch, de New York, en estos casos.

Además, Sepia, Calcarea ostrearum, Baryta carbonica y Tellerium, has sido recomendadas para la tiña; yo jamás he tenido éxito usando Baryta carbonica. Tellerium es de utilidad cuando la tiña afecta gran parte del cuerpo en forma de círculos entrecruzados.

En la sarna, Sepia se indica después de Sulphur, cuando las pústulas están diseminadas en medio de vesículas.

Sepia tiene una acción muy marcada sobre el tejido conjuntivo debilitándolo, dando origen así, a una gran variedad de síntomas. De este modo hay debilidad en las articulaciones que se "cansan" pronto al andar. Debilidad en el epigastrio que no se mejora por comer y que es evidentemente el resultado de una ptósis visceral. Este efecto de Sepia puede utilizarse cuando las articulaciones son fácilmente dislocadas.

Ahora, ya estudiados los órganos sucesivamente, encontramos que Sepia tiene una acción muy marcada sobre la mente. Produce un estado mental que es bien característico y debe estar presente cuando Sepia sea el medicamento. El paciente, generalmente mujer, está acobardado, triste y llora fácilmente. Esta tristeza va acompañada de irritabilidad; esto no faltará en la mujer sujeta a la acción de Sepia. Otras veces manifiesta un estado de perfecta indiferencia; no le importan sus asuntos ni aun su propia familia.

Este estado mental de Sepia, debe ser distinguido del de Pulsatilla, Natrum mur., y Causticum.

Pulsatilla es sin duda su análogo más cercano; como Sepia, éste produce llanto, ansiedad con inquietud, la enferma es rencillosa, hay mal humor y afán por la salud, etc. Solamente que en Pulsatilla es dócil, condescendiente y desea ser consolada, y no hay irritabilidad, cólera y fría ni diferencia como en sepia.

Natrum mur., es complementario de Sepia; concuerdan en la predisposición al llanto, en la depresión del espíritu; en el persistente recuerdo de las ofensas pasadas, en la irritabilidad, indiferencia, pérdida de la memoria y alternación de los estados mentales. Natrum mur., tiene como síntoma prominente : "se empeora cuando es

consolado". Clínicamente podemos decir lo mismo de Sepia. Ambos tienen también achaques agravados por la vejación o el enojo. Los dos son evidentemente semejantes al producir debilidad e irritabilidad nerviosa, pero su relación complementaria consiste en el hecho de que Sepia produce más eretismo vascular; que en Sepia, los desarreglos de la sensibilidad producen congestión del tórax y la cabeza, una animada conversación producen calor a la cara y los sudores siguen a toda excitación. En Natrum mur., los síntomas señalan más la excitación o la debilidad nerviosa solamente; de aquí se sigue que las emociones producen cefalalgia con tensión hacia el raquis; una palabra animada, un enderezamiento de la columna vertebral, los pensamientos desagradables, causan tristeza, debilidad paralítica o irritabilidad sin inquietud. Si el enfermo es hipocondríaco, hay un estado de melancolía por depresión mental causada por la inercia de los intestinos; mientras que en Sepia, el mismo estado depende de la estasis portal y por lo tanto es más persistente y va asociado de un temperamento mas irritable. A Natrum mur., puede recurrirse cuando este estado mental es resultado de afecciones uterinas o irregularidad menstrual. Pero esto será solamente en un prolapso y jamás una ingurgitación uterina como en Sepia. La indiferencia de Natrum mur., proviene de la falta de esperanza y del desfallecimiento mental; mientras que la de Sepia tiene una franca aversión a las personas más cercanas y por consiguiente más queridas.

Causticum produce tristeza, especialmente antes de la menstruación. La cara es amarilla, pero la ansiedad es más bien un estado de timidez, un estado medroso. La enferma está llena de presentimientos, teme los accidentes propios y los de los demás.

Lilium tigrinum se coloca muy de cerca a Sepia; afecta la circulación, particularmente la venosa, y como reflejo uterino y ovárico producido por la irritación de estos órganos, hay irritabilidad nerviosa, necesidad de estar ocupada a pesar de no poder hacer gran cosa; modales precipitados; abatida, llena de recelos, creyendo que su enfermedad es incurable, temiendo accidentes, etc. Cree que perderá la razón y por esto llora con tristeza.

Ambos medicamentos se acomodan a organismos debilitados, especialmente de la mujer; se preocupa por la salud de alguna persona, es apresurada, nerviosa, inquieta; es tan nerviosa, que la más ligera excitación le produce frío, sudor de las manos, palpitaciones, etc.

En ambas drogas, la causa de la debilidad parece ser una relajación del tejido conjunctivo, del sistema venoso y de las serosas, explicando todo esto los fenómenos nerviosos, la debilidad de las articulaciones, (aún agrietadas en el caso de Lilium por la escasez de fluído sinovial) el prolapso, etc. La relajación del sistema venoso, explica el estancamiento del sistema porta (Sepia), la plenitud del tórax y de las venas de las extremidades.

Hay sin embargo, una diferencia esencial en esto : el enfermo de

Lilium, encuentra mejória distrayendo su mente con las ocupaciones; en tanto que la de Sepia, tiene muchos síntomas nerviosos que se alivian por los ejercicios violentos. En el primer caso hay eretismo sexual que es de ese modo mejorado; en el último, la mejoría es general a medida que se modifica la circulación venosa, siendo el eretismo nervioso muy ligero y asociado a una disminución de la pasión venérea y aversión al coito.

Además, Lilium tiene un marcado alivio de sus síntomas en la mañana. mientras que los de Sepia mejoran por la tarde.

Hepar produce un grupo de síntomas que es oportuno recordar; hay tristeza. recuerdo de acontecimientos desagradables; la tristeza es más acentuada por la tarde y aun pueden existir ideas de suicidio; hay mal humor, los más ligeros motivos la violentan; no desea ver ni aun a los miembros de su propia familia; pero esto último, no se parece a la indiferencia de Sepia: más bien es un estado de contradicción. Además, solamente Hepar produce violentas explosiones pasionales.

Platina se le parece en la depresión mental : "Indiferencia, parece no importarle la ausencia de su esposa y le es indiferente que viva o muera." Pero se diferencia por su arrogancia; hay ansiedad con temor de una muerte inminente. En este estado mental de ensimismamiento, le es característico un sentimiento de superioridad personal, en el cual "todo le parece mezquino y su ánimo es propenso al llanto". Además, como veremos pronto, difiere notoriamente en sus síntomas uterinos.

Veamos ahora los síntomas que en la cabeza produce Sepia. Hay un padecimiento llamado hemicránea, para el que Sepia es uno de nuestros principales remedios; los síntomas que lo indican son los siguientes : dolores sobre un ojo (generalmente el izquierdo) de carácter vibratorio; profundos dolores aguijoneantes que parecen proceder de las meninges y estallar hacia la parte superior o de adentro afuera; son tan intensos, que arrancan gritos y frecuentemente terminan con vomito. Los paroxismos reaparecen o se agravan por el movimiento, por la luz o por el ruido, por el trueno de una tormenta y se mejoran por el sueño o por el descanso en una pieza obscura. Generalmente en las mujeres hay sensibilidad en la cara y posición anormal del útero o dismenorrea. Encontramos también que la enferma puede tener sacudidas de la cabeza hacia atrás y hacia adelante, que empeoran por las mañans y mientras la enferma está sentada. Se ha utilizado este medicamento en las mujeres nerviosas (de consiguiente en las histéricas) y también en los niños cuyas fontanales están abiertas. En estos casos no sería necesario dar Sulphur, Calcarea o algunos remedios de este tipo. Estudie los síntomas y encontrará que Sepia está indicado. (Sepia también será útil en las cefalalgias artríticas, especialmente cuando, como las de Nux vom., empeoran por la mañana, con náuseas y vómito). El hígado naturalmente está afectado y la orina tiene ácido úrico en exceso.

En la cefalalgia originada por fatiga cerebral, Sepia estará indicado por su condición general caquéctica. Se dice que es particularmenté eficaz cuando la atención de un solo asunto ha conducido al agotamiento cerebral. Compárese con Natrum mur., Sulphur, Nux vom., y Picricum acid.

En la hemicránea, puede ser comparada Sepia con Belladonna, Sanguinaria, Iris, Pulsatilla, Nux vom., Arsenicum, Theridion, Silicea y Thuja.

Belladonna debe ser escogido en la hemicránea, cuando hay una violenta hiperemia, con latidos carotídeos, cara roja, intolerancia al menor sacudimiento, luz o ruido. Está indicado, como se verá, en pacientes pletóricos y no en caquécticos, como sucede en Sepia.

Sanguinaria produce cefalalgia del lado derecho, que irradia al occipucio, aumenta y disminuye con el curso del sol, alcanzando su maximum al medio día. El paroxismo termina con una micción profusa (como sucede en Silicea, Gelsemium y Veratrum alb.) Se repiten cada siete días. Sanguinaria también produce cefalalgia menstrual acompañada de flujo profuso. En Sepia la menstruación es escasa. En Sanguinaria los dolores se localizan del lado derecho; en Sepia pueden presentarse en uno u otro lado.

Se hará uso de Iris versicolor en la hemicránea, cuando el ataque comienza con obscurecimiento de la vista y los paroxismos van acompañados de vómitos agrios y acuosos. Los dolores invaden los nervios suborbitarios y dentarios, con una cefalalgia estupefaciente y aturdimiento.

Pulsatilla es muy semejante a Sepia; ambos están muy indicados cuando la menstruación es escasa, desatándose un dolor pulsativo y aguijoneante en un lado de la cabeza, obscurecimiento de la vista, lengua blanca, náusea y vómitos, Pulsatilla tiene más marcado el vómito y la lengua cubierta de una gruesa capa de sarro; la boca está pastosa y el paciente mejora por el aire frío. Los dolores son de carácter variable y asociados de frialdad. Empeoran por la tarde.

En Sepia los dolores se repiten por conmociones nerviosas que cruzan como relámpago, con acrescentamiento relativo del calor de la cabeza. La nublazón de la vista va asociada de pesantez de los párpados; dolor de cabeza, y aun cuando la cara está roja en uno y otro medicamento, ordinariamente es amarilla en Sepia y pálida en Pulsatilla.

Nux vom., se adapta más a los hombres que Sepia. Cura la sensación dolorosa de como si un clavo taladrase la cabeza o como si estuviera hecha añicos. La cara está pálida, amarillenta o de un color cetrino con fondo rojizo. Los ataques comienzan en la madrugada y generalmente aumentan hasta un grado frenético. Como bajo la acción de Sepia, las causas excitantes pueden ser las hemorroides, la plétora abdominal o la fatiga cerebral. Aun cuando en lo general, los dos medicamentos son muy diferentes.

Arsenicum producirá una cefalagia estupefaciente y vibratoria, más acentuada sobre el ojo izquierdo. En este detalle se asemeja a Sepia,

pero la postración y la agitación de los dos medicamentos son muy diferentes; así como también la intensidad de la irritabilidad colérica, hasta renegar, que produce Arsenicum. El dolor de cabeza en Arsenicum, experimenta excepcionalmente un alivio temporal por las aplicaciones de agua fría.

Theridion tiene, para hablar más exactamente, destellos delante de los ojos y después empañamiento. La náusea se recrudece al cerrar los ojos y también por el ruido. El efecto del ruido es más marcado que en Sepia; parece intensificar los dolores y como si fuera penetrando por los dientes; a tal grado están sensibles los nervios a esta clase de vibraciones.

Silicea puede ser necesario después de algún ejercicio no acostumbrado, moderado. Los dolores producen náuseas y desmayo y son seguidos por obscurecimiento de la vista.

Sepia es muy útil en las enfermedades de los ojos; se encontrará indicado en la astenopía, acompañada de padecimientos uterinos. Se puede diferenciar Sepia de los otros medicamentos, por la hora de su agravación, empeorándose el paciente en la tarde; en la mañana y hasta después del medio día, está generalmente libre de sus síntomas.

En la conjunctivitis se encontrará indicada Sepia, cuando la inflamación es de un tipo tardío, generalmente ocurriendo a menudo en los niños escrofulososo. Los síntomas son subagudos. Hay escurrimiento muco-purulento por la mañana; los ojos, relativamente se sienten aliviados durante el día, en tanto que por la tarde hay una molesta resequedad en la conjuntiva.

El resto de los síntomas oculares en Sepia, podemos resumirlo en la forma siguiente: catarata, tracoma, párpados escamosos o pustulosos con o sin erupciones de la cara, los ojos son irritables a la luz, los párpados se cierran solos; ptósis palpebral con dolores aguijoneantes que empeoran por el frote. Causas : afecciones uterinas o del hígado, escrófula, hábito del té. Agravación en la mañana y en la tarde, durante el tiempo caluroso, con el agua caliente. Mejoría después de medio día y lavándose con agua fría.

Por algunos años he empleado Sepia en los empañamientos de la vista, etc., con prolapso uterino. Lo he encontrado así mismo eficiente en la astenopía, asociada de agotamiento producido por las pérdidas seminales, que ocurren de un modo voluntario o involuntario. En estos casos el medicamento es semejante a Natrum mur., Lilium tig., Jaborandi, Kali carb.; al primero se sobreañade la debilidad muscular; sensación de tiesura en los músculos de los ojos al moverlos, etc.; hay confusión de las letras, pero no existe el desvanecimiento repentino de la vista, tan notable en Sepia.

Lilium tigrinum produce escozor de los ojos; nublazón con sensación de calor en los párpados y en los ojos; agudos dolores sobre el ojo izquierdo, semejándose por este síntoma a Sepia; tiene también ardor y comezón en los ojos después de leer, que mejora al aire libre, como en Pulsatilla, espasmo de la acomodación. (Véase Jaborandi).

Cyclamen y Pulsatilla, pueden también ser examinados juntamente con Sepia en la repentina y transitoria pérdida de la vista; Cyclamen va acompañado de flujo menstrual obscuro y profuso; Pulsatilla, de flujo escaso y obscuro. Pero la ceguera de Cyclamen va asociada a un dolor de cabeza unilateral de la sien izquierda, cara pálida, náuseas originadas en la garganta y digestión débil.

Bajo la acción de Pulsatilla, que también puede ser empleada en la conjuntivitis, hay un escurrimiento muco-purulento, no irritante y más notable por la noche; hay aglutinación de los párpados en la mañana; finas granulaciones en los mismos y el paciente está sujeto a la repetición de orzuelos muy inflamados.

Puede emplearse Graphites, cuando las comisuras palpebrales están agrietadas y sangran en sus bordes; los párpados están pálidos, hinchados y como escamosos.

Thuja está indicada en las afecciones de los ojos de los bebedores de té. Hay escamas de color café, furfuráceas, que se acumulan en las pestañas y hay también paqueños tumores tarsianos, como verrugas.

Nux vómica estará indicado en los padecimientos de los ojos, asociados a afecciones hepáticas; los síntomas empeeoran por la mañana, y algunos mejoran por aplicaciones de agua fría.

Natrum mur., como Sepia, está indicado en las afecciones de los ojos, cuando son reflejas de padecimientos uterinos; hay ptósis palperal. Pero bajo la acción de Natrum mur., hay más oclusión espasmódica de los párpados en la conjuntivitis; el escurrimiento es delgado e irritante; hay grietas en las comisuras de los ojos y también en las de la boca; hay dolores sobre los ojos que empeoran por mirar hacia abajo.

Alúmina tiene también blefaroptosis, sequedad, ardor, disminución de la vista; pero en este medicamento se agravan los padecimientos por la tarde y la noche; las comisuras internas están inflamadas.

Vamos a considerar en seguida la acción de Sepia sobre los órganos abdominales : los encontramos indicado en la forma de dispepsia antes mencionada y también en la dispepsia consecutiva a los padecimientos uterinos, cuando va asociada a una sensación de vació en el epigastrio y abdomen en general, con desfallecimiento; sabor amargo o acre y un deseo vehemente por los ácidos y pepinos, que parecen mejorar los síntomas. La lengua está cubierta de una capa blanca; hay constipación generalmente. Las evacuaciones son duras, secas e insuficientes; y a pesar de ser blandas, son expulsadas con dificultad. El abdomen está hinchado, distendido por los gases y hay casi siempre, dolor en la región hepática. Al hacer una exploración clínica, se encontrará el hígado aumentado de volumen, no por una degeneración grasosa o amiloidea, sino por congestión.

En las hemorroides, también está indicado Sepia cuando sangran al evacuar o hay una sensación de plenitud en el recto como si estuviera distendido por algún cuerpo extraño que parece avivar la urgencia de defecar. La orina tiene un olor fétido particular y es muy turbia. Por el reposo deposita un sedimento de ácido úrico, que se

adhiere con tenacidad a las paredes del vaso.

Lycopodium es un valioso competidor de Sepia en el estado que acabamos de describir. La distinción entre ambos medicamentos puede concretarse en pocas palabras: la sensación de vacío en el epigastrio es más característica en Sepia; la plenitud después de comer, en Lycopodium. Sin duda, en Lycopodium la plenitud opaca a los otros síntomas, existiendo frecuentemente sin ninguna alteración en el aspecto de la lengua. Hay sabor agrio y los eructos agrios y quemantes son muy comunes. En el abdomen hay un estado de fermentación. Después de comer, la circulación está desarreglada y hay irresistible somnolencia. La orina contiene un sedimento como de arena roja. Hay constipación con deseo de defecar y constricción del ano. Sin embargo, la orina no es tan fétida como en Sepia.

Sulphur se asemeja a Sepia en muchos aspectos. Ambos están indicados en los casos tórpidos con falta de reacción. Hay plétora abdominal, congestión hepática, hemorroides, constipación, hambre a las once de la mañana; sabor amargo o acre; eructos agrios o sabor como de huevos podridos; plenitud por cualquiera pequeña cantidad de alimento ingerida, etc. En Sulphur, la cara está roja, cubierta de erupciones y a veces manchada. La salivación produce náusea; hay vómitos alimenticios; pide tomar aguardiente o cerveza y dulces, pero estos últimos le empeoran. Experimenta hambre a las once de la mañana, mientras que en Sepia hay una sensación de desmayo y desfallecimiento. La constipación va acompañada de deseos ineficaces como en Nux vom.

Para la sensación de desfallecimiento y vacío en el epigastrio compárese Sepia con: Calcarea ostrearum, Cocculus, Kali carb., Stannum, Ignatia, Carbo an., Zarzaparrilla, Niccolum, Oleander, Ipecacuanha, Thea, Staphisagria, Actea rac., e Hidrastis.

Cocculus tiene debilidad que se extiende a todo el abdomen y pecho. Le fatiga el hablar. La sensación se renueva por un excesivo ejercicio, especialmente por la falta de sueño.

Kali carb., produce sensación de vacío antes de las comidas, en desproporción con la sensación de vacuidad causada por el hambre, con abultamiento anormal después de haber comido; especialmente después de tomar una pequeña cantidad de sopa.

Bajo la acción de Stannum, la sensación continúa después de comer y se extienede a todo el pecho.

En Ignatia es acompañada de suspiros.

En Carbo animalis, proviene de la pérdida de flúidos vitales.

En Zarzaparrilla esta sensación va asociada de ruidos en el abdomen. (Borbórigmos).

En Niccolum, no hay deseo de comer.

En Oleander hay sensación de distensión abdominal. El pecho se siente vacío y frío.

Actea rac., es un medicamento excelente, cuando además del desmayo y sensación de vacío en el epigastrio, hay temblor y una sensación ondulante que parte del estómago y se extiende a todo el

cuerpo.

Hydrastis curará, cuando haya sensación de debilitamiento, taquicardia y evacuaciones intestinales envueltas en mucosidad.

Thea produce una sensación de desmayo y desfallecimiento; cefalalagias con náuseas que irradian de un punto y dolores en el ovario izquierdo.

Continuaremos nuestro estudio, examinanado los efectos que produce en la parte más baja del abdomen; veremos que produce una acción muy marcada sobre los órganos uterinos, ocasionando, como antes se ha dicho, una repleción del útero con desplazamiento del mismo. En los casos avanzados el útero está aumentado de volumen y el cuello endurecido. El órgano está prolapsado o retrovertido. La leucorrea es un síntoma muy prominente, siendo de un color verde-amarillento y algo fétida. Con estos síntomas objetivos, encontramos dolores de pesantez en el abdomen y por debajo de la región renal; es tan extenso algunas veces, que parece impedir la respiración. En otras ocasiones la enferma siente como si sus órganos fueran a salir forzadamente a través de la vulva; sensación que se alivia por sentarse cruzando las piernas. Asociado a estas molestias hay un dolor localizado en las regiones sacra y lumbar, que empeora cuando la paciente está de pie o camina. Hay dolores quemantes en el útero, algunas veces, de carácter agudo, que irradian hacia arriba o pueden dar la sensación de como si el útero estuviera comprimido por una mano, síntoma que también se encuentra en Cactus y Lilium tigrinum. La menstruación es generalmente tardía y escasa, aunque excepcionalmente puede ser anticipada y profusa.

El medicamento mas semejante a Sepia es Lilium tigrinum, cuyas experimentaciones las debemos al doctor William Payne, de Bath, Maine; se resolvió a hacer dichas pruebas después de haber tenido noticia de que los flores de esta planta habían causado convulsiones a un niño. Pensó que podría ser un medicamento de valor en las convulsiones de la infancia; en estos trabajos fué auxiliado por el doctor Dunham y cierto número de damas. Observó convulsiones en el transcurso de los experimentos, pero en casi todas ellas notó alteración de las funciones del útero y de los ovarios.

Los síntomas uterinos de Lilium tigrinum, acompañan frecuentemente al embarazo y a los dolores del parto. Está indicado en los casos de subinvolución. El útero no recupera su tamaño normal después del parto y los loquios duran mucho tiempo. Cuando la paciente se levanta de la cama e intenta caminar, el útero desciende por su propio peso. La enferma se queja de una sensación de pesantez y tirón, principalmente en la región hipogástrica. Siente la necesidad de una faja para mantener en su posición los órganos abdominales.

En esto es muy semejante a Sepia, que, como ya se dijo, la mujer se sienta con las piernas cruzadas, proporcionando de este modo un soporte artificial al útero. la leucorrea es también muy semejante;

bajo la acción de Sepia es verde amarillenta o de color de leche, algo fétida y frecuentemente escoriante. Bajo la acción de Lilium, creo que, la leucorrea más característica, es acuosa, amarillenta o amarillo café y escoriante, siendo este último muy característico de Lilium.

Las experimentadoras de Lilium tuvieron dos casos de prolapso y uno de retroversión uterina; hay urgencia de orinar; al ser expulsada la orina produce ardor y escozor; esta misma sensación que se experimenta en la uretra y el meato, la leucorrea la produce en la vulva. Habrá también deseo urgente de evacuar; diarrea en la mañana que obliga a la paciente a levantarse apresuradamente de la cama; siendo las evacuaciones amarillentas, pulposas, produciendo una sensación de escoriación en el ano. Aquí Lilium es semejante a Sulphur, que de un modo característico produce diarrea en la madrugada. Los síntomas de Lilium generalmente empeoran en a tarde, en tanto que los de Sepia en la mañana.

Lilium produce algunos síntomas en el pecho que vale la pena mencionar. Las enfermas experimentan una sensación de plenitud, de opresión en el pecho, como si se acumulara demasiada sangre; desea tener las ventanas abiertas, el aire fresco le proporciona mejoría. Esta opresión es causada por la estasis venosa. Hay un sabor como de sangre en la boca, recordando esto a Pulsatilla y Hamamelis que tienen esta mísma sensación; el enfermo tiene la sensación de ser oprimido como por una punta roma o una bala en la región mamaria; también hay una sensación de frialdad en la región precordial. Natrum mur., cura este último síntomas cuando aparece durante el trabajo mental; Lilium, cuando se presenta como resultado de un pedecimiento uterino. Kali bich, Kali chlorat. y Carbo animalis, también lo tienen y el dr. Richard Huges refiere un caso que fué curado con Petroleum.

Helonias, según Dunham, produce profunda melancolía e indefinida depresión, con una sensación de dolorimiento y pesantez en el útero, "la conciencia de un utero".

Lilium ofusca la inteligencia y produce una sensación de precipitación con debilidad y zozobra, que tiene por origen la aprehensión de una enfermedad fatal. Y además, Helonias es un excelente medicamento cuando hay una sensación de fatiga dolorsa, ardor en la espalda y piernas. Esto es bastante común entre las mujeres y ningún remedio, a excepción de Picricum acidum, lo cura tan rápidamente. La debilidad de Helonias es resultado de la nutrición alterada. Los experimentos han demostrado la disminución de los glóbulos rojos y el empobrecimiento general de la sangre que resulta de su uso.

Sulphur frecuentemente es necesario para ayudar a Sepia, en tratándose de un caso crónico. La relación complementaria se apoya en el poder común de ambos medicamentos para corregir la congestión abdominal y algunas otras irregularidades vasculares. Algunas veces, cuando es necesario Sepia, hay desfallecimiento muy marcado por la mañana, que produce una sensación como de hambre y debilidad, que sobreviene a las once horas; hay bochornos tenaces.

Además, aparece una cefalalgia unilateral persistente que debilita al enfermo. Las hemorroides empeoran. La pesantez llega a ser continua y hay una sensación de debilidad en los órganos genitales; entonces se substituye por Sulphur y la mejoría aparece inmediatamente. Después de un tiempo, sin embargo, los síntomas cambian de dirección hacia Sepia y así pueden alternar. Se han observado muchos casos semejantes. Una enferma del Oeste fué curada con estos dos medicamentos completamente bien, habiendo estado impedida por muchos años.

Murex, también molusco, tiene semejanza de familia con Sepia. Las experimentaciones son escasas, pero la experiencia clínica ha confirmado muchos de sus síntomas. El Dr. Dunham y después el Dr. B. F. Betts, han hecho comparaciones entre Murex y Sepia que nos sirven de guías para diferenciarlos.

Murex, como su análogo, produce excitación uterina; hay desfallecimiento epigástrico e irritación de la vejiga, debilidad muscular y depresión mental.

Difiere sin embargo, en que produce excitación sexual. "Deseo violento hasta fatigar la razón". "Deseo venéreo, removido por el más ligero tacto".

Las secreciones son más abundantes que las que produce ordinariamente Sepia y por esto la menstruación es más bien profusa que escasa; hay micción copiosa en la noche; orina clara; la paciente despierta con sobresalto y violentos deseos de orinar. Esto no es tan marcado en Sepia; aún cuando ambos tienen reglas intermitentes.

Los dos medicamentos son útiles en las afecciones del cuello uterino; Murex cuando hay sensibilidad o "una sensación de como si algun objeto estuviera haciendo presión en algún punto doloroso de la pelvis". (Betts). Dolores como de lanceta extendiéndose al abdomen o al tórax. Leucorrea espesa, verde o sanguinolenta. Murex concuerda de modo notable con Lilium y Platina en el eretismo sexual y con Kreosotum en los síntomas urinarios.

Clínicamente se ha usado para la poliuría, con frecuente deseo por la noche; Kreosotum tiene repentina urgencia; el paciente no puede salir de la cama con la suficiente rapidez; orina apresuradamente y en abundancia; la orina es fétida.

Además, Kreosotum tiene alguna relación con Sepia: los dos producen flujo menstrual intermitente; tirones en la región renal; una presión hacia afuera a nivel de los órganos genitales; coito doloroso; vómitos en el embarazo; la orina es turbia y fétida y por el reposo deposita un sedimento rojo. Pero las menstruaciones son generalmente copiosas, acompañadas de algunos síntomas reflejos que difieren un poco de los producidos por Sepia. Lo que más difiere es la dureza de óido con zumbidos y rugidos en la cabeza. Los tirones en la espalda son mejorados por el movimiento y no agravados, como sucede en Sepia, y la leucorrea es más irritante y acre; produce escoriación en las partes que cubre y tiene un olor a maíz fresco, verde.

Esta acritud de la leucorrea, claramente marca la diferencia entre la que produce Kreosotum y Sepia, así como Murex. Estos detalles inducen al empleo del medicamento en ulceraciones cancerosas o de cualquiera otra naturaleza en el cuello de la matriz. Lo eligiremos cuando haya ardor, sensibilidad y tumefacción del cuello, con flujo icoroso y sanguinolento. Sensibilidad al tacto o al coito y una putridez que es extraña a los otros remedios ya citados.

Stannum se asemeja a Sepia en el prolapso simple del útero y de la vagina, con desfallecimiento, pesantez y melancolía; pero su característica es la caída del útero y la vagina, durante la expulsión penosa de excrementos duros. El Dr. Hughes, escribe que es partidario de su empleo para aliviar la sensación de pesantez tan común en las mujeres, y agrega: "me he quedado asombrado de su poder en el prolapso": "Parece tonificar los ligamentos uterinos". (Farmacodinamias, 4a. edición).

Nux vom., concuerda con Sepia al producir estasis del sistema porta, congestión uterina; hemorroides; urgencia de evacuar; dolores de espalda que empeoran por el movimiento, despertando el enfermo a las tres de la mañana. Pero Nux vom., produce una peculiar irritabilidad en los tejidos, volviendo al paciente muy susceptible; en tanto que las funciones se realizan de una manera caprichosa, espasmódica e inarmónica. Los síntomas gástricos predominan y son justamente el resultado del abuso de estimulantes, comidas muy condimentadas, etc., en las personas nerviosas. Así, después de una comida se siente incomodidad por la ropa. Predomina el arqueo sobre el vómito. Hay náusea, debilidad y desmayo después de las comidas, como producida por un fuerte purgante, pero nunca la sensación de desfallecimiento de Sepia o de Murex. Hay deseo frecuente pero ineficaz de evacuar y no inercia del recto. La menstruación viene demasiado anticipada, aunque no es muy profusa y viene acompañada de dolores y movimientos espasmódicos del abdomen más notables de lo que sucede en Sepia, pero con menos sensación de pesantez constante y tirones. Nux vom., tiene un síntoma común después del desgarro del periné: inflamación interior y ardor en la vagina como sucede en el prolapso.

Aloes obra sobre el hígado, aumentando la producción biliar y produciendo retortijones y diarrea. Su acción sobre los intestinos y útero, nos recuerda la de Sepia, pues produce un aflujo de sangre hacia estas partes con repleción de las venas y la consecuente irritación. Pero el relajamiento que se expresa en Sepia por los tirones y la sensación de desfallecimiento, con debilidad de los esfínteres, bajo la acción de Aloes, es más bien una completa atonía o paresia. Se traduce con abatimiento o pesantez con tirones hacia abajo. Esta pesantez se localiza en la pelvis, útero, perine, recto, región sacra y las asas intestinales más bajas. De hecho es casi general, caracterizando aun el dolor de cabeza; es una cefalea que cruza el frontal con pesantez en los ojos y náusea; el dolor le obliga a entrecerrar los ojos; hay sensación de un peso sobre el vértice. Que

este dolor de cabeza dependa de las afecciones del intestino o del utero, está demostrado por la alteración de estos síntomas. (Como en Podophillum).

Asociada a la pesantez y a la congestión, hay debilidad de los esfínteres. La enferma tiene inseguridad de los esfínteres; teme que los excrementos se le escapen con los gases. (Materias fecales y orina, son expulsados al mismo tiempo). Cada vez que la orina es expulsada, hay una sensación de como si alguna evacuación pequeña se escapara; hay repentina urgencia por la mañana.

Aloes pues, está indicado cuando con la congestión y el prolapso uterinos, hay pesantez en el abdomen y espalda e inseguridad en el control del recto.

La mujer sufre con frecuencia de soltura intestinal. Sin síntomas premonitores, se siente desmayada, con una sensación de como si fuera a tener diarrea. Si los intestinos funcionan hay más gases que materias fecales, llegando a postrarse y a cubrirse de un sudor viscoso. Si tiene hemorroides procedentes mejoran por las aplicaciones frías.

Podophyllum puede estar indicado en estos casos; también obra sobre el hígado, produciendo diarrea y prolapso del útero y el recto; una sensación de vacío en el epigastrio; dolores en los ovarios (principalmente el derecho) que se propagan siguiendo el trayecto del nervio crural anterior; hay una sensación de ardor en el epigastrio y en la región sacra, la menstruación es retardada.

Su prolapso uterino es, sin embargo, más parecido al de Stannum; pesantez, como si los órganos genitales salieran durante la evacuación. Pero Stannum está indicado cuando esta sensación se produce por la expulsión de materias fecales duras; así que Podophyllum produce más relajación a nivel de la pelvis.

Podophyllum parece afectar primero el estómago e hígado y después el útero y el recto. Es por lo tanto, mas efectivo, cuando los síntomas gástricos coinciden con los uterinos. En tanto que se parece a Sepia en la pesantez de las regiones epigástrica y sacra, mejorada por acostarse; dolencia en los ovarios, etc.; difiere en sus síntomas gastro-hepáticos, plenitud, pesantez y tirones hacia el hígado y dolores que mejoran por el frote. La diarrea sólo se presenta en la madrugada o durante el día; algunas veces las evacuaciones son completamente formadas, pero demasiado frecuentes. Diarrea en extremo acuosa desde las tres de la mañana hasta medio día. Prolapso del ano antes de las evacuaciones. Después de evacuar, debilidad, sensación de desfallecimiento en el abdomen; ano débil, prolapso rectal. Esta debilidad se parece a la que produce Aloes. Es la paresia que ocasiona un violento purgante y no la relajación general de Sepia.

Pulsatilla nigricans se relaciona muy de cerca con Sepia. Mejora las menstruaciones escasas, tardías, la pesantez, los cólicos uterinos, los dolores de espalda, el desfallecimiento, la hemicránea y el calvus. Es útil especialmente en las mujeres irresolutas, condescendientes y

lacrimosas, silenciosas, displicentes y difíciles de agradar. Hay ansiedad que parece provenir del epigastrio o del corazón, acompañada de náusea. Ansiedad como si estuviera en una atmósfera muy caliente; también en la noche, como ocasionada por el calor. La paciente está desmayada, tiene necesidad de aire. El escalofrío, sin embargo, mejora al aire libre; frialdad con los dolores, anemia y clorosis.

Los dolores uterinos que produce Pulsatilla, son cortantes y presivos, con sensación de pesantez que converge a los órganos genitales. Esta pesantez es comparada a la de una piedra y se observa en las regiones hipogástrica y sacra. Los dolores constrictivos de cólico predominan y la pesantez no es tan marcada. Es por lo que lo empleamos tan frecuentemente en las reglas tardías y en el trabajo del parto. Obra de un modo caprichoso; por tanto los dolores uterinos sobrevienen por accesos y por sacudidas, al igual que el flujo menstrual; los dolores del parto sun espasmódicos e irregulares y finalmente se detienen con inercia completa. Hay falta de fuerza expulsiva desde que se inicia el trabajo, lo que se demuestra por el carácter incierto de las contracciones y finalmente por la ausencia absoluta de los dolores. Sepia produce más pesantez con calambres. Está indicado en el parto cuando el cuello está indurado y no cede, retardando de este modo la progresión. Entonces puede haber contracciones espasmódicas del cuello y dolores que se extienden hacia arriba. Aquí favorece la acción de Gelsemium y Calcarea, en tanto que Pulsatilla se parece a Caulophyllum y Secale.

El temperamento de Pulsatilla es lacrimoso, apacible, enojadizo, caprichoso. En Sepia es lacrimoso, deprimido, pero fácilmente irritable y excitable o indiferente.

Como queda dicho, Sepia está indicado en la congestión o induración del cuello uterino, con sensibilidad y ardor. Aurum metall, Aurum mur. y Aurum mur. Natronat., son semejantes. Pero aunque el oro produce hiperemia, obra de una manera completamente diferente a Sepia. Al estudiar sus efectos, se impresiona uno por la predominancia de dos grupos de síntomas asociados, que son: excitación nerviosa e irritabilidad vascular y no obstante, ni lo primero produce un gran influjo nervioso, ni lo segundo una verdadera plétora. Indican una debilidad irritable. La congestión hepática, renal y uterina, parecen desarrollarse secundariamente a una irritación cardíaca con hiperemia.

La acción prolongada del oro produce una fiebre que no es diferente de la de mercurio, con sudorá profuso, salivación y orina abundante. Hay también tendencia a la hipertrofia del tejido fibroso, de donde resulta la cirrosis. En un principio, las glándulas, estimuladas llegan a aumentar de volumen y a endurecerse; el perióstio está enfermo y finalmente los huesos se carían. De conformidad con estas modificaciones, se encontrarán sus síntomas característicos. Bajo su influencia, el estado emotivo es notablemente afectado. El paciente con facilidad monta en cólera por la más fútil contradicción; puede

haber alegría, pero el estado más persistente es melancólico y de disgusto por la vida, con tendencia al suicidio. Se imagina que ha perdido los afectos de sus amistades y que la suerte le es adversa; no desea permanecer más en este mundo y anhela la muerte. Se apodera de él una ansiedad precordial y un miedo con temblor. Hay aflujo de sangre al pecho cuando camina aceleradamente o por largo tiempo, con llenura a reventar; hay sensación de magulladura en la región uterina. Es muy sensible al dolor, nerviosa, temblorosa y agitada. El útero está congestionado y prolapsado por su propio peso. Hay aumento del deseo sexual.

Así pues, en tanto que hay congestiones, prolapsos y melancolía, como en Sepia y Murex, la evolución de los síntomas es diferente, con especialidad, los síntomas mentales. En Aurum hay melancolía con depresión, por la supuesta pérdida de las amistades. En Sepia hay indiferencia por los amigos. La ansiedad en el primero, es precordial, necesitándose mover de un lugar para otro (como en Arsenicum). Un simple ruido la vuelve ansiosa. La ansiedad del segundo, viene efectivamente con trastornos circulatorios, pero no necesariamente cardíacos y va acompañado de bochornos. Los dos producen hastío por la vida, con deseo de morir y aun con tendencia al suicidio. Aurum, por la pérdida del afecto de sus amistades. (Talcott) Sepia por su mera aversión a la vida.

Platina favorece por una parte a Aurum, y por la otra a Sepia; las tres tienen aburrimiento de la vida. Platina, sin embargo, al mismo tiempo siente un gran temor a la muerte que cree muy próxima. Como en Aurum, la enferma de Platina siente como si estuviera sola, pero tiene un estado mental peculiar, encuentra un paralelo físico en su poder visual. Una especie de indisposición para con el mundo, porque todo le parece in insignificante. Las cosas de su propia casa le son extrañas a su regreso después de una corta ausencia. Las personas le parecen despreciables, como insignificantes y muy inferiores a ella. Lo mismo los objetos que le rodean, le parecen más pequeños que lo natural.

Ni Aurum ni Sepia se comparan con Platina en la pronunciada ninfomanía y voluptuosa irritación de los genitales. El flujo menstrual en Platina es con coágulos y profuso, en vez de escaso. Platina y Sepia producen cólicos uterinos, pero en Sepia es como de compresión, como si repentinamente fuera comprimido el útero y después relajado; en Platina es un cólico bien pronunciado, seguido de adormecimiento; síntoma que es general en este medicamento.

Carbo animalis es igual, si no superior, a Sepia en las induraciones del cuello, con dolores quemantes y desgarrantes sobre el pubis. Hay en los coxales y el sacro, dolores parecidos a los de parto, leucorrea amarilla; las reglas van seguidas de una gran debilidad; la enferma no puede hablar más que difícilmente; sensación de desfallecimiento que no mejora por comer. Deseo de estar sola; horror a la conversación; ansiedad y orgasmo. El Carbón obra sobre las venas, alivia los gases fétidos; las excreciones fétidas y las excoriaciones

superficiales y de contorno irregular. Las inflamaciones son tórpidas, pero tienden a la supuración o a la necrosis, con dolores quemantes, gran debilidad y colapso.

Carbo animalis produce violenta opresión en la espalda, regiones inguinales y muslos durante la menstruación; hay urgencia de eructar sin conseguirlo; se distingue de Sepia por una cefalalgia vibratoria, que sigue a la menstruación. Tiene un tinte barroso y cobrizo de la cara.

Carbo vegetabilis ha causado molestias que descienden al recto y a la vagina. El cuello está extraordinariamente abierto; hay una sensación de peso en el útero y ovario derecho; la sangre de los menstruos tiene, un fuerte olor; la leucorrea es escoriante; los órganos genitales están dolorosos en partes; hay viva comezón, ardor y aftas. Hay ansiedad con distensión de las venas; sensación dolorosa en el útero que culmina en las ingles; inquietud, nerviosidad, depresión mental antes de la menstruación.

Por lo tanto el Carbán es de utilidad cuando hay endurecimientos a ulceración con estasis venoso, secreciones fétidas y escoriantes, y trastornos gástricos caracterizados por la acumulación y desalojamiento de gases fétidos.

Carbo vegetabilis puede curar las venas varicosas de los genitales, con color azul; tumores también azulosos. (Debe preferirse Carbo animalis si están indurados), hay úlceras, fístulas. Las descargas vaginales son escoriantes, delgadas; en tanto que en Sepia son menos escoriantes y más espesas; hay ardor que cruza el sacro, irradiando del abdomen hacia la parte baja de la región renal. Ardor profundamente situado en la pelvis, aumentando y disminuyendo. (Leadam).

Graphites es un carbón impuro que contiene vestigios de hierro; combina las secreciones fétidas, la flatulencia y los síntomas que en la piel producen los carbones, con la anemia.

Según Dumham, la aparición de las reglas es acompañada, de una variedad de síntomas accesorios como en Sepia.

Graphites no es requerido frecuentemente para el prolapso uterino, pero sí está claramente indicado cuando hay una sensación de como si la matriz saliera por la vagina. La paciente se queja de una pesantez en el abdomen y lancetazos, como choques eléctricos que bajan a los muslos. (Leadam).

La leucorrea es profusa, viene por violentos golpes y es escoriante. Graphites afecta a los ovarios, con más intensidad que Sepia. El ovario izquierdo esta endurecido e hinchado y los dolores se acentúan por el tacto.

Como Sepia, produce inflamación y grietas en los pezones. Es útil para suavizar y remover los tejidos cicatriciales de la mama. (Como Phytolacca).

Pero Graphites se adapta mejor a las mujeres anémicas, aunque sean obesas, que están constantemente frías, estreñidas y sujetas a manifestaciones herpéticas y ásperas de la piel. Las erupciones son

húmedas y hay un sudor de mal olor como en Sepia, pero la glutinosidad de las excreciones, es solamente bien marcada en Graphites. La piel se pone dura, se agrieta y sangra. Hay menos descamación que en Sepia. Graphites, en virtud de su acción sobre los tejidos cicatriciales y las induraciones, deberá ser útil para el reblandecimiento del cuello, cuando, como sucede con frecuencia, una desgarradura ha sido desatendida, constituyendo un punto de irritación.

Natrum carbónicum y otros derivados del sodio, son complementarios de Sepia.

El carbonato es útil cuando hay una pesantez, como si las vísceras todas quisieran salir. la paciente está tímida, intranquila y completamente insensible a la música. Hay marcado dolor de espalda como en Sepia; pesantez que empeora por estar sentada y mejora por el movimiento; sensación de magulladura en la espalda durante la noche; sensación también de tensión y horadación en el vértice de la escápula izquierda irradiando hacia el pecho. La piel está seca y áspera.

Clínicamente ha sido útil, cuando el cuello está agrandado y el hocico de tenca deformado. El Dr. Betts lo ha empleado con éxito en los padecimientos de origen congénito de la pared anterior de la vagina y en la deformación del orificio del cuello.

Natrum mur., se adapta a las mujeres anémicas, agotadas, con cara delgada y emaciación general. Son melancólicas, fácilmente se enojan; sufren debilidad nerviosa, con taquicardia, temblor, ansiedad, predominando la frialdad; de fácil transpiración; sudor de las axilas con escalofrío en toda la espalda; prolapso uterino, cólicos; menstruaciones escasas; la orina deja un sedimento rojo; el coito es doloroso. Se parece por lo tanto, a Pulsatilla y a Sepia. Pero el consuelo agrava (en Pulsatilla, la enferma fácilmente se tranquiliza y solicita el consuelo); los dolores de cabeza son congestivos, pseudo-pletóricos; sensación de magulladura que empeora al menor movimiento, aun de los globos oculares; comezón en las membranas mucosas como en Sepia, pero hay una sequedad anormal; así la lengua se siente reseca, como los párpados y el recto, y con escozor, etc. Con esta resequedad hay tendencia a las erosiones con vivo ardor; la lengua está dolorida y ulcerada; las encías doloridas y sangrantes. La piel reseca fuera de lo natural. El prolapso uterino empeora en las mañanas; necesita sentarse para evitarlo; hay dolores en la espalda que mejoran acostándose en decúbito dorsal; se queja de una tensión en las regiones inguinal e hipogástrica, como si la piel estuviera restirada. (Apis). Hay leucorrea con escozor y sensación de sequedad; dolor cortante en la uretra después de orinar, que es muy característico. Las reglas son escasas, o escasas un día o dos y después profusas.

Natrum hipochlorosum difiere algo de sus congéneres; según el experimentador, Dr. R. T. Cooper, es útil en personas debilitadas de fibra laxa y más bien indolentes mental y físicamente; va

acompañada de emaciación, agotamiento nervioso y otros datos que acusan cambios profundos en el organismo. Hay vértigo con caída; dolores en la frente y sensación de pesantez uterina; sensación vertiginosa, como si el vértice del cráneo estuviera flotando.

Dolores en la frente, ojos o vértice de la cabeza, acompañados de síntomas uterinos. El cerebro se siente paralizado así como las extremidades, especialmente las inferiores; los dedos de las manos se sienten entumecidos; hay lipotimia; la lengua es flácida y tiene la impresión de los dientes; flatulencia, estreñimiento, abotagamiento después de comer; asma flatulento; acusando todo esto la plétora abdominal.

Estos síntomas se encuentran relacionados a padecimientos uterinos. La menstruación es obscura y con coágulos; hay somnolencia; círculos obscuros al rededor de los ojos. Pesantez en el utero, que puede estar congestionado, agrandado y sensible; la sangre constantemente fluye y empeora por el menor ejercicio. Sensación en el útero de como si se abriera y cerrara; que no es precisamente la compresión y relajación que se produce en Sepia. La enferma experimenta como si el útero fuera empujado hacia arriba cuando se sienta. (Síntoma también de Ferrum Iod.) La hinchazón de la parte inferior del abdomen remonta hasta el pecho produciendo disnea que empeora después de comer. Un peso parece caer de la parte superior del pecho al abdomen, con dolor en el vértice de la cabeza. Hinchazón en la región ovárica izquierda durante las reglas. Parece producir el retorno a su sitio del útero prolapsado, recordando uno de los experimentos del Dr. Jackson con Sepia. Encontramos: prurito, sensación de desfallecimiento en el pecho; fácilmente se rinde por el calor; esto último es también un síntoma de Sepia, así como de Natrum mur. y de Natrum carb.

Actea racemosa es de inestimable valor en el tratamiento de las mujeres; especialmente se adapta a aquellas que estan propensas a sufrir reumatismo muscular y mialgias. Produce hiperemia del cerebro y médula cervical y dorsal. De esto proviene la molestia occipital y los dolores de relámpago, delirio, etc., (Véase más abajo). Se parece en esto a Absinthium, Abrotanum y Gelsemium. Este último produce más amodorramiento, paresias musculares y menos excitación.

Sepia también produce repleción de los vasos de la médula, pero es menos marcada que en Actea; más pasivo, mas tórpido. Los nervios sensitivos son excitados en Actea y al igual que los nervios motores y los músculos, están debilitados. El corazón trabaja débil y nerviosamente; el pulso es tan pronto rápido y débil, como lento e intermitente. Juntamente con esto hay orina escasa que deposita por el reposo un sedimiento rojo amarillo. Hay general desasosiego, inquietud y agitación; o estremecimiento y frialdad nerviosa. Los músculos se sienten doloridos, magullados y tiesos. Hay mialgias intensas, con entumecimiento. Los dolores son violentos como de relámpago. Phillips lo recomienda aún para la anasarca, con el estado del corazón arriba indicado y la secreción urinaria, cuando Digitalis

haya fallado.

Actea racemosa es pues, un medicamento importantísmo para la debilidad irritable. Como en Sepia, hay nerviosidad, melancolía, inquietud, menstruación escasa, con pesantez, etc. Pero Actea produce una excitación nerviosa más marcada, llegando hasta el delirio con alucinaciones de ratas; produce una aprehensión abrumadora, sin causa aparente, pero que la paciente no puede dominar y la lleva a la desesperación. En su estado de excitación siente como si le volara la tapa del cráneo o como si fuera a perder la razón. Se vuelve suspicaz, irritable y es vertiginosa, como si estuviera intoxicada.

Todos estos síntomas forman parte del estado general nervioso que depende de una irritación uterina u ovárica, o por lo menos de ese origen. El desarreglo del útero, parece estar basado en una diátesis reumática.

Sufre más neuralgias que la paciente de Sepia; pesantez dolorosa del occipucio al vértice; dolencias en los globos oculares; agudos dolores que desde ahí se propagan al vértice; conjuntiva roja; todo esto asociado a una flexión e irritabilidad del útero. Muy importantes son también los dolores neurálgicos en el útero, que está muy sensible al tacto; los dolores cruzan de un lado a otro; molestias que descienden a las piernas, acompañadas de una sensación de como si la cadera fuera comprimida exteriormente; menstruaciones escasas con dolor continuo después de su comienzo. El desfallecimiento del epigastrio nos da sin embargo, la sensación del desfallecimiento de Sepia. Va acompañado de nerviosidad, estremecimientos; irradiaciones que, partiendo del epigastrio se extienden a todo el cuerpo, con sensación de como si estuviera espantada. Sepia puede ser necesario en la astenopía refleja del útero; Actea, en la hiperestesia de la retina o en la neuralgia ciliar, también como reflejo uterino. Los dos son muy utiles en la menopausia; Sepia, para los bochornos; Actea, según Hughes, para la irritabilidad, dolor en el vértice y sensación de vacío en el epigastrio.

Kali ferrocyan., ha aliviado la pesantez; la leucorrea de apariencia purulenta, profusa pero no irritante; tristeza hasta el llanto. Sensación de hueco en el epigastrio; hemorragias uterinas pasivas, con la consiguiente debilidad. (Mac Clatchey).

Pero estos efectos no deben confundirse con los de Sepia, porque el medicamento es un intenso veneno que obra sobre los músculos y el corazón, etc. La sensación epigástrica está asociada a la debilidad cardiaca, cuyos latidos disminuyen en número e intensidad, con la consecuente frialdad, debilitamiento, vértigo, entumecimiento y temblores. Así pues, el medicamento se adapta a casos debilitados cuando el corazón falla. Se asocia bien a Kali carb. para la debilidad cardiaca.

Calcarea ostrearum produce una presión en la parte más baja del abdomen por el ejercicio físico, que empeora por estar de pie; dolores en los muslos; molesto dolor y tensión que empeora cuando se

yergue o se dobla hacia atrás; dolores punzantes en la nuca. Pero las menstruaciones son profusas y muy anticipadas y los síntomas generales son, como bien se sabe, muy diferentes a los de Sepia.

Calcarea phosphorica, (como Phosphorus), produce una sensación de desfallecimiento o de vacío en el hipogastrio. Prolapso que empeora durante la defecación o la micción, acompañado de debilidad y angustia; dolor en el útero, que irradia hasta el sacro.

Leucorrea con aspecto como de crema, que produce ardor en la vagina y dolores a los lados de la vejiga y útero; ardor como de fuego que asciende hasta el pecho; bochornos, ansiedad, desmayos; debilidad; fácilmente suda.

Pero las reglas son profusas y hay excitación sexual; está débil y extenuada; tal vez tísica; sufre de sudores parciales profusos, pero no de mal olor como en Sepia; toda exposición al frío, aumenta sus dolores reumáticos y con ellos, las molestias uterinas.

Entre los medicamentos restantes, puede, en resumen, hacerse mención de los siguientes:

Mitchella produce cuello ingurgitado, rojo obscuro e hinchado. Asociado a una irritación del cuello de la vejiga, hay necesidad urgente de orinar. Sin embargo, no hay ninguna semejanza general con Sepia. El medicamento más bien puede ser catalogado con Eupatorium purpureum, en la irritabilidad vesical de las mujeres (Hughes); con Hidrocotyle por la irritación del cuello vesical acompañada de calor y comezón en la vegina y el cuello uterino enrojecido (datos confirmados por el Dr. Mitchell); con Vespa, por las úlceras alrededor del orificio del cuello y con Apis por la disuria.

Sepia no debe ser confundida con Secale cornutum y Ustilago, porque aunque todos producen pesantez, congestión, dolor angustioso y prolapso uterino, las condiciones son completamente diferentes.

Las dos últimas obran sobre la túnica muscular de los vasos sanguíneos y sobre las fibras musculares lisas en general; secundariamente la relajación extraordinaria favorece la tumefacción y las hemorragias pasivas. Su pesantez es prolongada e intensa (como en Caulophyllum). Ustilago ha curado las hemorragias uterinas; también el vómito de sangre en una señora, con padecimientos uterinos; flujo de sangre obscura; por la exploración, el dedo ha descubierto un cuello blando, pastoso y sale manchado de sangre. (Woodbury).

Vivurnum opulus ha producido y curado dolores parecidos a los de Sepia; al rededor de la pelvis y en la región uterina; también sensación de desfallecimiento, de vacuidad en el estómago, pesantez, nerviosidad. Pero la pesantez es mucho más violenta y culmina en el útero con intenso calambre, pareciéndose en esto a Caulophyllum, Actea rac., Secale, etc., más bien que a Sepia.

Inula y Hedeoma, han sido probados pero su experimentación clínica es deficiente. Como Sepia, producen dolores uterinos y la pesantez tantas veces mencionada; la primera irradiando con molestias a los

genitales, con dolor de espalda y urgencia para evacuar y orinar; el segundo, produciendo una pesantez, con gran debilidad en las piernas.

Sepia, en algunos casos, ha mejorado los síntomas coreiformes; movimientos repentinos de la cabeza hacia atrás y adelante; sensación de torsión en el estómago que se eleva a la garganta. Entre los medicamentos similares no olvidaremos a Zizia; produce congestión uterina, dolor en el dorso, ardor intenso en la misma región; movimientos espasmódicos de la cara y miembros, especialmente los inferiores. El estado mental es al principio alborozado, después deprimido y por último, indiferente. Lo que es más característico, sin embargo, es la agitación y los movimientos conreicos que empeoran durante el sueño.

Cuando el prolapso es manifestación de una nutrición general defectuosa, con poca o ninguna congestión local, Sepia cede el lugar a Aletris, Caulophyllum, Abies canadensis, Lac defloratum, Calcarea phosph., Natrum mur., Helonias, Natrum hipocholor.

En los conatos de aborto, Sepia está indicado no tanto por los dolores, sino por la evidencia del desarreglo circulatorio. Esto, unido a la irritabilidad nerviosa y a la flacidez del tejido, es la causa de la inminente catástrofe. Se notará que hay a ha habido plenitud o fluxión de sangre a la cabeza y al pecho, sensación de pesantez en el abdomen, hemorroides, bochornos, desmayos, ataques momentánecos de ceguera, que se han observado especialmente cuando la paciente está en una habitación caliente, cerrada o arrodillada en la iglesia, o cuando sus ojos trabajan de una manera forzada. Un síntoma común concomitante, que expresa claramente la indicación de Sepia, es el dato excelente proporcionado por el Dr. H.N. Guernsey : sensación de peso en el ano, como de una bola.

Este último síntoma es único, completamente diferente de la urgencia de Nux vom. y Sulphur, de la presión de Lilium y de la plenitud y pesantez de Aloes. Este produce una sensación como de un tapón metido entre la sínfisis del pubis y el coxis.

Dd nosodes

Esta clase de medicamentos, como ya he dicho en mi conferencia de introducción, está constituída por productos de las enfermedades. Muchos de ellos han demostrado propiedades medicinales y por esta razón son útiles en el tratamiento de las enfermedades del cuerpo humano. El campo aquí es ciertamente enorme. En la epoca presenta apenas conocemos el comienzo de los trabajos en esta materia. Creo que tiempo vendrá en que los medicamentos que componen este grupo, probarán ser un inmenso recurso en el tratamiento de las enfermedades crónicas. Algunos Nosodes han sido obtenidos de las enfermedades de los animales, otros, de las enfermedades de las plantas.

Grandes objeciones se han hecho al empleo de los Nosodes como

remedios en la práctica homeopática. Bueno es que se entiendan los prejuicios que se encontrarán tanto en el público como en el cuerpo médico. Se han hecho objeciones a Psorinum, que como se sabe, es obtenido de la sarna y también a Syphilinum, el virus sifilítico, por el hecho de considerarlos sucios y asquerosos. Esta objeción es enteramente absurda, porque nadie, ni por un momento, tendrá la idea de administrar estas substancias a baja potencia; nadie podrá sostener que sea desagradable o asqueroso, administrar a un enfermo Psorinum a la 200a atenuacion.

Otra objeción que ha sido promovida contra los Nosodes, y que puede ser de algún peso, es que el uso de estas substancias no curan y sí se oponen al progreso de la Homopatía, confundiéndola con la Isopatía.

Así se expresan algunos médicos eminentes de nuestra escuela : si en un caso de escrófula damos Psorium, no hacemos Homeopatía, sino Isopatía. Yo sostengo que hay aquí un terreno propicio para la discusión y es pero que ustedes tomen participación en estas investigaciones. Si embargo, debemos recurrir al tribunal, ante el que todas nuestras prescripciones deben someterse, al tribunal de la experiencia.

La Homeopatía no es una ciencia inductiva. porque no nació de una evolución natural del pensamiento. Hahnemann comenzó por experimentar. Nosotros podemos razonar tanto cuanto queramos, pero debemos siempre mirar los hechos del caso. Yo no sé hasta qué punto deberé llegar con estos Nosodes. Correctamente empleados no son remedios isopáticos, pues a lo que yo llamo Isopatía es la práctica propuesta por el Dr. S. Swan de N.Y. Por ejemplo: si un sujeto tiene una constitución de tal naturaleza que no puede comer fresas sin enfermarse, el Dr. Swan dinamiza las fresas y las administra al paciente, sosteniendo que en esta forma es destruida la idiosincrasia. La Isopatía descansa en la atrevida aseveración de que lo que produce la enfermedad, lo cura cuando es administrado en alta potencia. El uso de los Nosodes en la práctica homeopática es diferente, porque en nuestro caso nos apoyamos en una base experimental. Hemos tomado estas substancias, las hemos experimentado en el hombre sano y las hemos administrado en el lecho de los enfermos. Los hemos encontrado eficaces y por lo tanto tenemos las mismas razones para proclamarlos como medicamentos, como cualquier substancia molecular. Veamos su sintomatología comenzando por Psorinum.

Psorinum

Psorinum ha sido experimentado lo suficiente para permitirnos su empleo con exito en el tratamiento de las enfermedades. Lo encontramos indicado especialmente en las constituciones psóricas, (empleando las palabras de Hahnemann) en los pacientes propensos a afecciones cutáneas y glandulares y que no reaccionan al

medicamento, aparentemente bien elegido. Pongamos por ejemplo, el medicamento que se acomoda al caso es Pulsatilla. Los síntomas parecen indicarlo. La prescripción se hace de acuerdo con las reglas instituídas y sin embargo, la mejoría es solamente transitoria. En tales casos se tendrá una discracia oculta bajo la enfermedad, que necesita ser removida o modificada, antes de poder combatirla con éxito. Por otra parte, en ciertos casos de escarlatina, las prescripciones en nada aprovechan y los niños mueren. Muchos de estos casos podrían ser curados si fuera estudiada más concienzudamente esta rama de nuestra Materia Médica. Las variadas constituciones o discrasias que son la base de ciertas enfermedades cronicas y agudas, son sin duda alguna muy numerosas; aun no las conocemos todas bien. Sabemos que una de ellas se debe a la gonorrea; enfermedad terriblemente común cuyas discrasias aumentan rápidamente. Quiero decir ahora la causa de esto. Muchos médicos alópatas y aun también homeópatas, propiamente no la curan.

La gonorrea no es una enfermedad local. Si no es completamente curada, una discrasia constitucional puede ser trasmitida a los descendientes. Yo sé, por años de experiencia y de observación, que la gonorrea es un problema difícil y que también complica frecuentemente los casos que tratamos. Lo mismo es cierto en grado modificado, en lo que se refiere a la sífilis. La gonorrea parece atacar a los tejidos más nobles; pulmones, corazón, sistema nervioso, los que también son afectados por la sífilis con el transcurso de los años.

Volviendo de esta digresión, se debe pensar en Psorinum en los casos parecidos a los de Sulphur, cuando hay una tara psórica bien marcada y el medicamento indicado no responde. Consideremos algunos de sus síntomas y veamos en qué forma afecta los tejidos. Produce una erupción sobre la piel, generalmente de carácter herpético, acompañada de gran comezón. Esta comezón es incomparablemente peor tan pronto como el enfermo siente el calor de la cama. Después se verá que el paciente, tiene un aspecto sucio, empanado, como si nunca se hubiera lavado (lo cual puede no ser cierto). En algunos lugares, la piel tiene una apariencia relumbrosa, cual hubiera sido bañada con aceite. Las glándulas sebáceas funcionan en exceso. La erupción en los niños se encuentra especialmente sobre el cuero cabellubo. Puede invadir todo el perieraneo, pero se encuentra de una manera característica descendiendo a uno u otro lado de la cara invadiendo las mejillas y las orejas, como la tiña de la cabeza, lo que es en efecto. Esta erupción es a veces húmeda y produce una secreción de muy mal olor. Otras veces es seca, furfurácea, como propiamente se le llama. Ordinariamente hay asociado a estos síntomas, una otorrea, con pus poco espeso, icoroso y horriblemente fétido, como de carne descompuesta; puede desaparecer en el verano y reaparecer cuando se establece el invierno. Aparecen úlceras en las piernas, ordinariamente la tibia, al rededor de los maleolos o de otras

articulaciones. Estas ulceras cuando son características, son lentas para sanar e indolentes. Debo hacer observar aquí que las erupciones herpticas y sarnosas, hace un momento referidas, tienen tendencia a aparecer en el pliegue de las articulaciones : pliegues de los codos o huecos poplíteos. El niño es pálido, enclenque y muy extenuado. Toda la superficie del cuerpo despide un olor repugnante que persiste a pesar del mas escrupuloso aseo. Esto proviene del estado de la piel, por la falta de acción de las glándulas cutáneas. No eliminan con propiedad y en consecuencias las secreciones se estancan, entran en descomposición y producen este olor, que no desaparecerá hasta que la piel del niño sea curada.

En el verano estos niños son muy propensos a ser atacados de cólera infantil; no hay medicamento que reemplace a Psorinum en esta categoría de síntomas de esta enfermedad. Los niños están propensos a la nerviosidad e inquietud nocturnas, como síntomas precursores del cólera infantil. Despiertan asustados o gritan durante el sueño; después de dos o tres noches comienza la diarrea; las evacuaciones intestinales son abundantes y sueltas, de color café-obscuro o negro; muy fétidas y casi de olor pútrido; empeoran en la noche u obligan al paciente a salir de la cama muy temprano.

Psorinum cura una forma de cefalalgia crónica con dolores vibratorios resultantes de un esfuerzo, precedidos de una sensación de ligeros latigazos, disminución del poder visual y manchas delante de los ojos; sensación de hambre. Algunas veces el paciente está desmedidamente hambriento el día anterior al acceso; este síntoma concomitente es muy frecuente en Psorinum; el enfermo se queja de hambre canina antes de sufrir el ataque de diarrea; por la noche necesita levantarse a comer algo, como en Phosphorus y China; sucediendo esto frecuentemente durante el embarazo.

También se encuentra a Psorinum indicado en los malos efectos de la supresión de la sarna. Esta enfermedad es producida, como se sabe, por el acarus. Se estará justificado al emplear en aplicaciones locales todo aquello que mate al insecto pero que no suprime el mal; tal aplicación se puede tener con el aceite de lavanda, que mata a la vez al insecto y a sus huevos. Cuando la sarna ha sido suprimida, Psorinum es un excelente medicamento para desarrollarla; en la práctica, también curará la enfermedad después de desarrollada.

Psorinum es también útil cuando las pústulas y los diviesos persisten después de la curación de la sarna por cualquier otro medicamento.

Hay otro uso que puede hacerse de Psorium y que no he mencionado, pero que es tan importante como cualquier otro. Algunas veces, después de violentas y agudas enfermedades, el paciente queda muy postrado; por ejemplo, después de una fiebre tifoidea, hay una depresión mental y debilidad corporal, sin esperanza de alivio. Sin embargo, se sabe que no hay una absoluta certidumbre de que el paciente no pueda aliviarse. Pues no hay lesiones orgánicas persistentes. El enfermo se debilita con el sudor de la noche; quizá Sulphur se ha dado sin resultados. En tales casos Psorinum es el

medicamento indicado.
También aqui puede pensarse en China o Cinchona, que es un excelente remedio en el rápido agotamiento que sigue a las enfermedades agudas, especialmente cuando ha habido pérdida de sangre o prolongada y profusa diarrea, o en fin, abundante transpiración.
Es semejante a Psorinum en el sudor nocturno; pero este será el medicamento, cuando existe el estado mental antes descrito: la desesperación del alivio.
Se debe pensar en Laurocerasus, cuando falta la reacción, particularmente en las enfermedades del pecho.
Capsicum está indicado en la falta de reacción, cuando ocurre en personas de fibra laxa.
Opium es el medicamento por excelencia, cuando el paciente está amodorrado y estúpido.
Valeriana, Moschus y Ambra grisea, deben ser empleados en las afecciones nerviosas, cuando el medicamento mejor elegido falla.
Carbo veg., está indicado en los casos de padecimientos abdominales, cuando hay gran frialdad del cuerpo. La respiración es también fría y el pulso rápido.
Psorinum es muy semejante, como se ve, a Sulphur; es complementario de este remedio; es antagónico de Lachesis y antidotizado pro Coffea.

Ambra grisea

Se supone que Ambra grisea es un producto morboso que proviene de la ballena. Tiene una acción medicamentosa bien marcada. Como todas las substancias que tienen un fuerte olor, obra prominentemente sobre el sistema nervioso. Cuando no hay síntomas nerviosos en un caso, apenas puede esperarse un buen servicio de este medicamento. Ambra grisea afecta al sistema nervioso cerebro-espinal, produciendo síntomas espasmódicos en distintas partes del cuerpo; los músculos faciales se contraen. Puede usarse también en el insomnio que proviene por inquietud mental, como por los malos negocios. El paciente puede, en estos casos, irse a la cama sintiéndose relativamente cansado y no obstante, tan pronto como coloca la cabeza en la almohada, vuelve nuevamente a preocuparse. Tal caso es el que frecuentemente cura Ambra grisea. Este medicamento está indicado particularmente en los hombres delgados y demacrados, que tienen un marcado temperamento nervioso y en los cuales la nerviosidad predomina con detrimento de la nutrición. Está indicado particularmente en las afecciones nerviosas de los ancianos, especialmente cuando pierden la memoria y no pueden acordarse de los más simples hechos. El vértigo sobreviene cuando el paciente se pone en movimiento; las piernas se sienten inseguras y vacila cuando camina; tiene adormecimiento de los pies y hormigueo en los miembros, especialmente en los inferiores; las piernas se le

duermen fácilmente. Estos síntomas demuestran que hay una debilidad funcional u orgánica del sistema nervioso cerebro-espinal. Podemos usar de esta droga en los casos de reblandecimiento cerebral o medular, sea o no de origen senil.

Hay otro uso que nosotros podemos hacer de Ambra grisea. Es un medicamento que obra rápidamente. Por consiguiente podemos darlo en las enfermedades nerviosas, cuya reacción es deficiente. Ya hemos hablado de un uso semejante de Psorinum; es éste, la falta de reacción proviene de un vicio constitucional. Pero en el caso de Ambra grisea, proviene de la debilidad nerviosa. Encontraremos muchos casos parecidos, particularmente entre los hombres.

Podemos emplear Ambra grisea en la tos, que empeora cuando hay personas extrañas en la habitación o con algunas otras circunstancias que tiendan a excitar el sistema nervioso; puede haber tos refleja por preocupaciones mentales. En estos casos es muy parecido a Phosphorus.

Ambra está también indicado en la tos, seca o no coqueluche, cuando es seguida de eructos. No hay muchos medicamentos que curen este síntoma. Ambra grisea es uno de los mejores; los demás son : Sulphuric. acid., Arnica, Sanguinaria y Veratrum alb. Algunas veces los eructos vienen durante la tos, la que generalmente es un síntoma molesto y muy penoso. En esto, Ambra coincide con Arsenicum, Cimex, Lachesis y Angustura. Podemos hacer uso de Ambra en el asma, cuando va acompañado de síntomas cardiacos y opresión respiratoria; de una sensación de peso como si una masa comprimiese el lado izquierdo del pecho y agitación en la región precordial. Esto proviene problablemente de una sensación constrictiva a este nivel; no como si una mano cogiera el corazón, sino como si el lado izquierdo del pecho estuviera siendo comprimido. Generalmente va acompañado de palpitaciones cardíacas.

Ambra grisea obra marcadamente sobre los órganos genitales de la mujer, siendo en esto su acción única e importante. Produce atonía uterina. Las menstruaciones son regulares; otras veces se presentan con algunos días de anticipación y son muy profusas, acompañadas de epistaxis y dilatación de las varicosas de los piernas (si la paciente tiene este estado de las venas.) Hay un flujo de sangre entre dos épocas de la menstruación. Todo excitación ligera o esfuerzo suplementario, como el esfuerzo para defecar, produce un escurrimiento veginal sanguíneo, que nos demuestra cuán congestionado está el útero y relajados y débiles los tejidos. La leucorrea principalmente es mucosa y de tinte azuloso o gris azul.

Puede usarse Ambra grisea durante el período del parto, especialmente cuando la constipación es muy intensa. Se adapta bien a las mujeres nerviosas, delgadas, huesosas y que tienen gran ansiedad e inquietud asociada a la constipación; la paciente está imposibilitada para llevar a cabo la evacuación, mientras la ve alguna persona.

Secale cornutum

Secale cornutum es comúnmente llamado "centeno atizonado". Ergot, término copiado del francés, es el nombre de la droga en la farmacopea de la vieja escuela. La droga no es obtenida del centeno mismo, sino de un desarrollo fungoso que ataca al grano, probablemente cuando éste está muy tierno.

Secale cornutum o Ergot, se ha empleado por mucho tiempo en la escuela dominante, debido a su bien conocida propiedad de producir contracción de las fibras musculares lisas, cuando se da en dosis apreciables. Ejerce especialmente esta acción sobre las fibras musculares no sujetas a la voluntad y que tienen una disposición circular o transversal. Creo que el fenómeno se debe a una influencia ejercida sobre los nervios vaso-motores y que esto debe explicar todos sus síntomas. En primer lugar, los efectos de Secale pueden dividirse en dos grupos : aquellos que se refieren a la circulación y los que se refieren directamente al sistema nervioso. Consideraremos primero estos últimos. Encontramos a Ergot produciendo un tipo especial de convulsiones, que constituyen el síntoma principal del ergotismo; un estado de envenenamiento crónico producido por el Ergot. El ergotismo no es de ninguna manera poco común en el continente europeo, especialmente en algunas provincias de Alemania, donde los labradores cultivan una gran cantidad de centeno.

El centeno es el principal grano que ahí se consume, siendo esto el envenenamiento por el Ergot tan frecuente. Durante estos últimos años, gracias a la mayor atención, el número de casos de ergotismo ha disminuido. Terminando esta pequeña digresión, vamos a describir el carácter de las convulsiones.

A veces el cuerpo está rígido y otras esta rigidez alterna con la relajación; siendo particularmente notables en los dedos de las manos. Estos se cierran o bien se extienden separándose ampliamente. Los músculos faciales se contraen. Las convulsiones principian en la cara y de ahí se extienden a todo el cuerpo. El abdomen está retraído por la contracción de los músculos rectos. Hay retención de la orina, (recuérdese que no digo supresión) por la contracción espasmódica del esfínter del cuello de la vejiga. Por el empleo de la sonda puede obtenerse una pequeña cantidad de orina que tiene el aspecto de jugo de ciruela. Hay muy frecuentes arqueadas espasmódicas y muy escasos vómitos efectivos. El estómago se contrae violentamente.

Veamos ahora la acción de Secale sobre la circulación y encontraremos que los síntomas que se refieren al aparato circulatorio, se deben a su acción sobre las fibras musculares lisas de los vasos sanguíneos. Su primer efecto es de contracción en tanto que el efecto secundario es la dilatación. Los dedos tienen aspecto azulino o negruzco, como si la sangre estuviera estancada. La piel está arrugada y seca. Poco después sobreviene la gangrena de todo o

una parte del miembro; la explicación de estos trastornos es la siguiente : ha habido una prolongada, contracción de los capilares, estorbando la circulación y ocasionando un estasis sanguíneo; de este modo la nutrición local queda compromentida y la parte afectada muere. Esta acción de Secale, ha justificado su empleo en la gangrena seca, especialmente de los dedos de los pies, en los ancianos.

Pasando después a la acción que esta droga ejerce sobre el utero, como órgano muscular de fibras lisas, encontramos que Ergot produce marcada contracción de esta víscera, obrando más intensamente sobre el utero gravido que sobre el no grávido; más sobre el útero de las multíparas que sobre el de las nulíparas. Cuanto más multiplicadas están las fibras musculares uterinas, tanto más enérgica es la acción de Ergot. ¿Qué síntomas produce? Se sabe que ha sido empleado para producir las contracciones del útero; para causar el aborto; para apresurar la expulsión del feto, cuando el aborto es inevitable; para aumentar las contracciones en el trabajo del parto; para expulsar la placenta y en una palabra, para todos aquellos casos en los que se desea producir contracciones uterinas.

Sus síntomas característicos son los siguientes : dolores uterinos prolongados, pero ineficaces; además se encontrará indicado a veces en la retención placentaria por la contracción uterina en forma de reloj de arena. Esta peculiar contracción impide la expulsión de la placenta. Puede removerse dicha placenta con auxilio de la mano, pero una manera de corregir este estado es dando pequeñas dosis de Secale.

Secale puede también ser usado en las mujeres delgadas y huesosas, con piel áspera y arrugada y rostro cetrino y que son muy débiles durante el trabajo del parto; los dolores parecen faltar completamente; el útero está flojo, como si se tratara de una mucosa simplemente y no de un órgano muscular; otras veces la mujer se quejará de sensación de pesantez en la región sacra y una especie de sensación de necesidad prolongada en el abdomen.

Ergot afecta a la misma sangre; parece disminuir su coagulabilidad; por esto producirá hemorragias obscuras, delgadas y persistentes, que pueden proceder del útero o de cualquiera otra cavidad natural del cuerpo. Puede darse en las hemorragias uterinas cuando el flujo es de carácter pasivo, de color obscuro, pudiendo ser de olor repugnante. La mujer puede estar agotada a tal grado, que casi queda exangüe, yaciendo fría y en estado de inconsciencia. Antes de perder el conocimiento, se queja de hormigueo en todo el cuerpo y suplica a los que le rodean, le froten los miembros, especialmente las piernas. Hormigueo es la mejor palabra para describir esta sensación característica, que produce Secale. La enferma tiene los dedos completamente separados; este síntoma parece molestarle más que la hemorragia misma. En tales casos, Secale es el remedio indicado, especialmente si el temperamento de la enferma lo reclama.

No sólo podemos hacer uso de Secale en la retención placentaria,

cuando es ocasionada por contracción del útero en forma de reloj de arena, sino después de un aborto, especialmente cuando ocurre en los primeros meses del embarazo. La correspondiente descarga de loquios es de olor repugnante; la enferma está fría y a menudo casi sin pulso, debido a la pérdida de sangre; las contracciones uterinas son muy irregulares o de otro modo puede haber contracción tónica prolongada. (Contracturas). En tales casos, Secale está todavía más indicado por sus síntomas mentales. La paciente tiene manía, durante la cual se ríe y palmotea sus manos sobre la cabeza, pareciendo estar fuera de sí.

Secale obra muy particularmente sobre los órganos gastro-intestinales. Produce un cuadro mucho muy parecido al del cólera. Es útil en el cólera infantil, cólera morbus y el cólera asiático. Está indicado cuando el paciente está frío y casi sin pulso, con calambres espasmódicos en los músculos de varias partes del cuerpo; es muy notable en estos casos la separación de los dedos de que ya hemos hablado. Los ojos hundidos, las facciones descompuestas; aun cuando hay frecuentes arqueadas espasmódicas, los vómitos son pocos. La superficie del cuerpo está áspera, fruncida y seca, como si no hubiera humedad en el sistema sudoral. La orina está suprimida; hay hormigueo y picazón en todo el cuerpo; las evacuaciones intestinales son abundantes y aguadas, siendo expulsadas con gran violencia. El paciente, aunque frío, no consiente que se le abrigue.

En el cólera infantil Secale se indica particularmente en las evacuaciones profusas, mal digeridas, acuosas y muy fétidas, siendo emitidas por accesos o golpes, y seguidas de una postración intensa. Ahora Secale debe ser distinguido de los medicamentos que le son semejantes o de lo contrario no podrá ser usado con mayores ventajas.

Se ha observado en una fábrica, en la que se utilizaban substancias que contenían arsénico, que las emanaciones arsenicales habían destruido toda la vegetación de las cercanías, con excepción de los cultivos de centeno, que se desarrollaban más frondosos, bajo las emanaciones de esta fábrica. Cuando lleguemos a estudiar los efectos medicamentosos de Secale y Arsenicum, encontraremos que tienen muchos síntomas comunes. Ambos producen retraimiento de los tejidos y gangrena; los dos producen síntomas coleriformes y es siguen bien el uno al otro; podemos hacer algunas distinciones que serán suficientes para individualizarlos. Desde luego la gangrena de Arsenicum y casi todos sus síntomas, empeoran por el frío y mejoran por el calor. El paciente experimenta necesidad de ser abrigado.

El enfermo de Secale encuentra mejoría por el frío. Resultando cierto el mismo detalle para las ulceraciones. Si se tiene una úlcera indolente que deja escurrir un pus icoroso y fétido, casi siempre se piensa en Arsenicum; sin embargo, Secale puede ser el remedio; la distinción entre ellos, es la siguiente: Arsenicum mejora por el calor, Secale por el frío.

En el cólera, los dos medicamentos tienen evacuaciones profusas,

fétidas y acuosas, que agotan demasiado : Arsenicum carece de hormigueo, que es característico cuando Secale es el medicamento. Arsenicum tienen más inquietud y ansiedad; agitación ansiosa e irritabilidad. El paciente desea ser arropado, en tanto que el paciente de Secale desea estar fresco.

Durante el estado de colapso, Secale está indicado por los síntomas que ya se han mencionado. En esto es muy semejante a Carbo veg. Este último medicamento está indicado cuando la postración es tan grande, que el paciente esta completamente tendido, demasiado débil, sin poder moverse, con hemorragia nasal pasiva y quizá también intestinal. El cuero está frío, especialmente los pies y las rodillas. El pulso es rápido y casi filiforme; el aliento frío. En tales casos alarmantes, Carbo veget., puede salvar algunas veces la vida del enfermo.

Otro medicamento parecido es Camphora, que debe emplearse de preferencia a Secale, Arsenicum o a Carbo verg., en el cólera, cuando la economía es abrumada repentinamente por la virulencia de las toxinas; antes que haya vómito o diarrea y cuando la postración es intensa. El cuerpo está frío como el hielo; la voz es chillona o ronca. Camphora es empleado en estos casos en tintura madre; algunas gotas en el agua y una dosis cada quince minutos, hasta que la reacción se presente y otro medicamento podrá estar indicado después.

Veratrum album se parece a Secale en la frialdad y la coloración azul de la superficie del cuerpo, con las evacuaciones profusas y acuosas, pero difiere en un síntoma especial : el sudor frío sobre la frente. Ninguno de los medicamentos antes mencionados tiene este síntomas, excepto arsenicum, pero en éste la inquietud es mayor que en Verat., que en cambio tiene el sudor frío de la frente, mas marcado.

En los síntomas uterinos, hemorragias, etc., tenemos que recordar algunos medicamentos que guardan estrecha relación con Secale; puedo incidentalmente mencionar a Carbo veg., que es muy semejante a Secale en la epistaxis; el sangramiento continuo, día tras día, aparentemente sin disminuir en lo más mínimo, siendo de sangre obscura no coagulable; pueden distinguirse estos medicamentos, por sus demás síntomas característicos.

Debemos recordar a Ustilago como un compañero de Secale; es un hongo que se desarrolla en el maíz y su acción es semejante a la de Ergot. Un cuidadoso análisis quimíco, ha demostrado que contiene ergotina, lo mismo que Secale.

Ustilago puede ser usado en las hemorragias que presentan ciertas diferencia características de las de Secale. las hemorragias uterinas en las que es más eficaz, son aquéllas en que el flujo es rojo brillante, en parte líquido, en parte coagulado. Cuando este estado existe, se puede emplear Ustilago, sea que la hemorragia se presente en la menopausia, durante el parto, el aborto o en la menstruación. Este medicamento no obra sobre el útero exactamente lo mismo que

Secale. Produce congestión pasiva en este órgano y está indicado especialmente en los casos en que el más ligero tacto necesario en el examen, produce sangre. Otro caso en el que puede estar indicado este remedio, es en la menorragia por retroflexión del útero. Yo lo he usado generalmente a la sexta potencia. Parece tonificar el útero, de tal manera que este órgano pierde para el dedo que explora, la sensación esponjosa y blanduja. La circulación a través del útero se mejora y la hemorragia se produce menos fácilmente.

Tenemos otros dos o tres medicamentos útiles en estos casos de estancamiento uterino, y como estado es tan difícil de curar, voy a mencionarlos.

Uno de ellos es Bovista, hongo del lobo; cuando esta planta está madura, su envoltura se revienta y proyecta fuera de su cavidad un polvo que tira al color moreno y que constituye los esporos de la planta. Cuando éste es aplicado a la piel, produce una erupción muy semejante al herpes, que sangra fácilmente. Bovista afecta la circulación de una manera muy particular; parece producir una relajación de todo el sistema capilar; sea que obra sobre la sangre o sobre el sistema nervioso. El relajamiento de los capilares favorece la diátesis hemorrágica. Debido a esta acción única de Bovista, lo encontramos útil en la epistaxis, sea asociada a una irregularidad menstrual o provocada por un traumatismo.

Bovista está indicado en la hemorragia uterina, cuando este órgano está ingurgitado (en esto es parecido a Ustilago y a Secale), particularmente cuando hay un flujo de sangre entre los períodos menstruales, por el más leve ejercicio. En esto es axactamente como Ambra grisea, pero el flujo menstrual de Bovista se presenta principamente o en la noche, o en la mañana muy temprano. Tal vez el ejercicio durante el día favorece la circulación disminuyendo de este modo la congestión uterina.

Secale y Ustilago, también producen hemorragia estando el útero ingurgitado.

Otra particularidad de Bovista que podría también ser mencionada aquí, es un estado edematoso de la superficie del cuerpo. Una señora, por ejemplo, después de utilizar unas tijeras, nota que en sus dedos pulgar e índice han quedado unas profundas canaladuras, demostrando esto que hay una condición edematosa, producida por la circulación lenta de la sangre en las venas.

Bovista también produce algunos síntomas de sofocación. Se usa en algunos países para causar estupor a las abejas, con el fin de facilitar la recolección de la miel; los síntomas de asfixia se parecen muchísimo a los que produce el humo de carbón carbon de leña y Bovista ha probado ser útil como antídoto de los efectos de dichos gases.

Arnica y Opium, también son antídotos para el humo de carbón de leña.

Además de estos síntomas de Bovista, deben recordarse también otros que dependen igualmente de la circulación. El corazón se siente

enormemente grande, con opresión del pecho y palpitaciones después de una comida o durante la menstruación. Asociado al padecimiento del corazón y a las menstruaciones desordenadas, hay un intenso y profundo dolor de cabeza, en el cerebro, con una sensación de como si estuviera enormemente agrandada o hinchada.

Puede hacerse uso de Mitchella en los casos de ingurgitación del útero, cuando el flujo no es tan pasivo como en los medicamentos ya indicados; la sangre es de un color más encendido y la hemorragia va asociada de disuria. Otro medicamento que deseo mencionar como semejante a Secale en las hemorragia, es Trillium pendulum. Este remedio es útil en un tipo de hemorragia enteramente diferente al que demandan los medicamentos antes mencionados. Está indicado cuando el flujo sanguíneo es rojo encendido y profuso acompañado de sensación de desmayo en el epigastrio, de frío en las extremidades, postración y pulso rápido y débil. Se asocia más estrechamente a China que a ninguno de los remedios ya mencionados. Está indicado más en la hemorragia aguda activa, que en el crónico y lento escurrimiento que exige Secale.

Hay salida de sangre de un rojo encendido, por el menor movimiento. La enferma siente como si el sacro y los huesos ilíacos fueran desprendidos, sintiendo necesidad de tener fuertemente atada la cintura.

Hamamelis igualmente está indicado en la hemorragia. Obra principalmente, como ya se sabe, sobre las venas. A él se recurre cuando hay dolor de cabeza como de martilleo especialmente en las regiones temporales. La paciente no muestra alarma ni ansiedad con motivo du se hemorragia. El flujo es obscuro, más bien pasivo; hay dolencias en la parte afectada. La enferma está agotada por el escurrimiento sanguíneo.

Erigeron canadensis está indicado en las hemorragias del útero, asociadas de micción dolorosa. ¿Cómo, pues, distinguirlo de Mitchella? La hemorragia de Erigeron viene por accesos o por golpe. Se produce repentinamente e igualmente se detiene. A veces después de la extracción de una pieza dentaria, el alveolo queda sangrando persistentemente. Se puede asear esta cavidad quitando el coágulo y aplicar un pedazo de gasa empapada en tintura de Trillium; a menudo se detendrá la hemorragia, aún cuando los otros astringentes hayan fallado. Jamás he empleado Erigeron con este objeto, no pudiendo por lo tanto, decir cuáles serían sus resultados. He empleado Trillium en la misma forma para la hemorragia nasal.

Desearía también mencionar aquí a Ferrum phosphoricum. Obra sobre la circulación tanto como Hamamelis. Es un excelente medicamento para el estado de inflamación que hemos descrito como "dilatación de los vasos sanguíneos". Dado entonces, evita una extensión mayor de la enfermedad. Así cuando se trate de los pulmones, evitará la aparición de la neumonía. El pecho se siente dolorido y magullado; el pulso lleno y rápido, pero no tanto como el de Aconitum. La expectoración es escasa y veteada de sangre.

Cuando contiene sangre y no habiendo la fiebre esténica que produce Aconitum, se puede confiar en Ferrum phosphoricum. Algunas veces en la enfermedad del estío, de los niños, los vasos sanguíneos del abdomen se vuelven muy distendidos. La diarrea que aparece con este medicamento, es a veces acuosa y contiene moco y sangre; puede haber urgencia de evacuar, que no llega a tenesmo. Si el tenesmo aparece, Ferrum deja de ser el remedio indicado. Si el caso llega hasta la producción de pus o de moco-pus. Ferrum phosph. no podrá producir ningún alivio.

Puede también usarse Ferrum phosph. en el principio de la hidrocefalia, cuando en un violento ataque de la enfermedad de verano, el niño queda somnoliento y pesado, sus ojos están inyectados y hay pulso lleno y suave y no el pulso lleno y rebotante de Aconitum o de Belladonna.

Dd reino vegetal

Ya hemos revisado la mayor parte de los medicamentos del reino animal y también los nosodes más importantes. Vamos ahora a estudiar la segunda gran división de la historia el reino vegetal.

El reino vegetal nos ofrece muchas variedades de substancias medicinales, algunas de gran utilidad práctica y otras que sólo tienen una esfera de acción limitada.

Las drogas obtenidas de este reino, deben sus efectos medicinales a los jugos que contienen o a ciertas propiedades que residen en las raíces, en las flores o en las semillas. Se pueden obtener las substancias medicinales de las diversas partes de una planta y sus cualidades pueden variar según la parte empleada. Hablando de Belladonna, por ejemplo, se dice que una parte de la planta nos da la totalidad de las cualidades acres de la droga, en tanto que la otra nos proporcionas las cualidades narcóticas. Debemos, pues, tener cuidado al hacer los experimentos de las drogas vegetales y tener la seguridad de la parte de la planta que vamos a emplear; al concretar los datos de nuestro experimento, debemos manifestar si ha sido usada toda la planta o solamente una parte de ella. Si ha sido solo una parte la utilizada, deberá decirse con claridad qué parte es : la raíz, las flores, las semillas, etc.

El estudio del reino vegetal envuelve en cierta forma al reino mineral, porque muchas de las propiedades medicinales de los remedios vegetales, deben su existencia a las substancias derivadas del reino mineral, tomadas del suelo en que se desarrollan. El principal efecto de ciertas hierbas es debido a la gran cantidad de sílice que contienen. El noventa y nueve por ciento de los efectos de Laurocerasus, proviene del ácido prúsico, comúnmente clasificado entre los compuestos inorgánicos. Lo mismo puede decirse de Amygdala pérsica. Ahora bien, estas substancias derivadas del reino

mineral y contenidas en los vegetales, llegan a ser más activas en su nuevo ambiente; o lo que es lo mismo, dada una substancia química que hubiera sido elaborada sintéticamente en el laboratorio, tendría propiedades medicinales menos marcadas, que si se hubiera obtenido de una planta. Estas observaciones pueden ser aplicadas tanto al reino vegetal como al reino animal. Las substancias que existen en el reino animal y se encuentran también en el reino vegetal, son con mucho, más activas en el primero. Así la chinche de la papa, de Colorado, que se ha alimentado sobre la misma planta, puede proporcionarnos la Solanina, presentado síntomas más poderosos que los que produciría la Solanina contenida en la planta.

Estudiaremos los medicamentos derivados del reino vegetal conforme a la clasificación de los botánicos; hay algunas discordancias en la botánica actual. Por ejemplo, en el orden de las plantas leguminosas, de las que obtenemos los chícharos y frijoles que son muy nutritivos, se coloca también a Lathyrus, que tiene propiedades muy venenosas, porque hay una apariencia exterior entre Lathyrus y el chícharo dulce; parece incongruente colocarlos juntos, cuando sus efectos son tan diferentes.

Las cinco relaciones de los medicamentos ya mencionados, se aplican aquí como en el reino animal. Es necesario recordar que las substancias que tienen el mismo origen, generalmente no se siguen bien la una a la otra. Por ejemplo: si se ha dado Ignatia, no será correcto seguir dando Nux vom., o viceversa; porque los dos contienen estricnina, los dos tienen muchos síntomas comunes, su acción es demasiado parecida. Otro ejemplo puede ser observado entre Glonoinum y el vino; cuando Glonoinum fué experimentado, se encontró que tenía una acción muy marcada sobre el pulso; todos los síntomas fueron agravados cuando los experimentadores ingirieron el vino. El vino produce una excitación muy semejante a la del Glonoinum y su acción parece ser en el mismo sentido, intensificando por consecuencia los efectos de este último.

Pero los diferentes órdenes, sub-órdenes y clases en que los botánicos dividen las plantas son tan extensos y cubren tan vagas semejanzas, que no podemos limitarnos estrictamente a las reglas anteriores y, tomando los medicamentos en un amplísimo orden de plantas, decir cuáles no pueden sucederse unos a otros. Tomemos por ejemplo las ranunculáceas, de las que obtenemos la Pulsatilla, el Acónitum, el Helleborus y la Staphysagria. Ahora bien, las semejanzas entre estas cuatro drogas, no son tan notables para impedir que se sucedan sin perjuicio. Si nos encontramos, pues, en nuestro estudio de la sintomatología de los medicamentos, que no hay marcadas semejanzas entre ellos, la regla no es aplicable. En las anacardiáceas la regla no se aplica en tratándose de Anacardium y Rhus tox.; estas drogas tienen semejanza familiar, pero sus puntos de divergencia son tan grandes, que una puede obrar como anntídoto de la otra. La regla se aplicaría a Ignatia y Nux vom., a Pulsatilla nuttaliana y Pulsatilla pratensis. Ahora deseo intentar individualmente

las consideraciones sobre los medicamentos derivados del reino vegetal.

Apocynum cannabinum

En el orden de las Apocynáceas hay numerosas plantas que empleamos en medicina; entre éstas pueden ser mencionadas Apocynun cannabinum a Androsæmifolium, Gelsemium sempervirens, Vinca minor, Oleander, Nux vómica, Ignatia, Curare, Alstonia scholaris y Spigelia. Este orden de plantas es muy venenoso produciendo postración y aun la narcosis y parálisis; algunos de ellos producen la muerte.

Dd apocynaceas

Plinio decía que Apocynum era fatal para los perros y de esta circunstancia se derivó su nombre. Tiene una fibra resistente, como el cáñamo y se ha usado para hacer cordeles.

Apocynum cannabinum tiene un efecto muy marcado aumentando la secreción urinaria. No es suficiente, sin embargo, por el momento, estudiar este medicamento simplemente como un diurético, porque tiene una acción tan marcada sobre las fuerzas vitales, que exige un estudio extenso. Deprime grandemente las energías vitales, como lo demuestra la relajación de los esfínteres, la pérdida de las fuerzas musculares, etc. Esta pérdida de fuerzas es un importante síntoma general, puesto que califica, como lo veremos más adelante, los síntomas cardiacos, renales e intestinales.

En estos últimos años se ha empleado Apocynum muy ampliamente en el tratamiento de muchas formas de hidropesía. Cuando dé un resumen fiel de sus síntomas, se verá que su uso impreciso en los estados hidrópicos, de ninguna manera debe considerarse como estrictamente homeopático. Cuando no está precisamente indicado por sus síntomas, es necesario emplear fuertes dosis, con el fin de producir algún efecto. Scoparius (retama) y también las vainas de algunas leguminosas, producen aumento en la actividad funcional de los riñones y de este modo ayudan a la eliminación del derrame hidrópico. Pero tenemos que conformar nuestros actos a un arte, que no admite tales prescripciones.

Esta se propone la individualización y no la generalización. Investiga la selección del Similimum y no de paliativo temporal.

Cuando está indicado Apocynum, es necesario que los síntomas siguientes estén presentes : aturdimiento y pesantez de la cabeza; somnolencia y debilidad o sueño perturbado e inquieto. Las funciones son lentas, el pulso también lento y los intestinos están constipados, aunque las materias fecales sean semiduras; los riñones están tórpidos, o bien la orina es copiosa y la micción casi involuntaria debido al relajamiento de los esfínteres. Al despertar, la nariz y la garganta están llenas de un moco espeso y amarillento. El paciente experimenta una sensación de opresión en el epigastrio y pecho. Difícilmente puede tomar respiración para hablar aun después de las

más ligeras comidas ordinarias; tiene necesidad frecuentemente de hacer inspiraciones profundas. Hay batimientos desordenados del corazón y sensación de cansancio en la región precordial. El pulso es irregular, intermitente y por momentos débil o lento, laborioso y de vez en cuando se pierde un latido. Lo anterior constituye el grupo de síntomas característicos de la hidropesía cardiaca e indica la afinidad que el medicamento tiene por el corazón. Frecuentemente será un buen paliativo en la degeneración grasosa del mismo con hidropesía, en los ancianos.

En esto puede ser comparado con varios remedios: primero Arsenicum; éste tiene la misma sed y la misma sensación de hundimiento en el epigastrio, como la tiene Apocynum, nada más que está indicado en los casos más avanzados y el enfermo presenta siempre más irritabilidad de sus tejidos.

Ya he hablado de la distinción entre Apis, Aceticum ac., y Apocynum en la conferencia que sustenté acerca de Apis.

Helleborus y Digitalis son semejantes a Apocynum, produciendo entorpecimiento, pulso lento, etc., pero creo que Apocynum debe preferirse a Digitalis, ya que la acción de éste es inconstante.

Apocynum tiene también alguna acción sobre las articulaciones, produciendo un estado reumático; las articulaciones se sienten rígidas por la mañana, al efectuar cualquier movimiento.

Se recordará que he mencionado a Apocynum como un medicamento útil en la hidrocefalia; la cabeza está agrandada; los huesos frontales están combados; las fontanelas muy abiertas; hay extrabismo y en casos extremados el paciente no ve; un lado esta paralizado. El caso es muy parecido al de Apis, pero carece del grito cefálico; está indicado en los estados más avazados que Apis. Uno o dos casos han sido curados por el continuo uso del medicamento.

Hay una diarrea que puede exigir el uso de Apocynum; las evacuaciones son copiosas, amarillentas o tirando a café; acuosas y algunas veces contienen alimentos no digeridos; son arrojadas con una fuerza explosiva, como un tapón de botella. El esfínter del ano está débil y las evacuaciones escapan involuntariamente cuando el paciente expulsa los gases. Después de la evacuación se siente debilitado; tiene una sensación general de vacío en el abdomen; la cara está pálida y cubierta de un sudor frío.

Aloes tiene un efecto parecido en el debilitamiento del esfínter del ano y en la gran postración después de defecar; pero las evacuaciones de este medicamento contienen un moco gelatinoso, generalmente se empeoran por la mañana; hay cólico que se mejora por encorvarse.

Gambogia tiene la evacuación precedida de un dolor excesivo y cortante en el ombligo; la evacuación es expulsada "de un solo golpe", después de un deseo urgente considerable, siguiéndose una sensación de gran mejoría.

Apocynum está indicado también en las hemorrodies que van asociadas a una sensación de como si un ángulo saliente fuera

introducido en el ano.

Oleander

Oleander nerium es nativo de la Palestina, pero también se le encuentra en estado silvestre en el Sur de Europa y se le cultiva mucho en jardines e invernaderos en distintas partes; prospera muy especialmente en los lugares húmedos. Como planta, es de mucho ornamento, haciéndola particularmente atractiva sus grandes flores rosadas. Es, sin embargo, muy venenosa; ocasiona una postración muy marcada del sistema nervioso, con síntomas de narcosis. No se debe olvidar el carácter deprimente de este medicamento. Produce debilidad de memoria y olvido. No solamente tiene este efecto, sino que también produce lentitud en la percepción. El paciente tiene gran dificultad en encontrar el significado de las observaciones. Acompañado a estos síntomas mentales, hay vértigo como resultado de la debilidad. Todo esto se refiere a la depresión del sensorio. Oleander es un medicamento muy importante, cuando los síntomas antes indicados se encuentran como precursores de una parálisis.

Hace algunos años tuve éxito al tratar un caso de cefalalgia con Oleander. Se trataba de una señorita. El dolor era mejorado por cruzar la vista forzadamente. Estudiando este síntoma en la Materia Médica, encontré que Oleander producía dolores de cabeza que se mejoraban por mirar de lado; por este motivo prescribí el remedio.

Estudiando la acción de Oleander sobre los órganos abdominales, encontramos sensación de vacío y desfallecimiento en el hueco epigástrico aun después de comer y que mejora por tomar aguardiente. Se encontrará este síntoma indicando a Oleander, en las mujeres muy débiles que están lactando. Inmediatamente después de la tetada, un temblor se apodera de la enferma y se siente tan débil, que difícilmente puede dar pasos para cruzar la habitación.

Carbo animalis puede también estar indicado en estas circunstancias.

Oleander es útil en la diarrea, las evacuaciones son delgadas y contienen alimentos mal digeridos; siendo el síntoma característico el que el paciente expulse sin digerir los alimentos tomados el día anterior. Este síntoma puede ser notado en los niños, en el cólera infantil y en el marasmo. Otro síntoma que reclama a Oleander en los bebés y en los niños, es "que cada vez que expulsa los gases, mancha las ropas".

Aquí necesita ser estudiado Oleander en relación con Ferrum, Arsenicum, Argentum nitricum y Cinchona. Ferrum produce diarreas lientéricas; estas evacuaciones son indoloras y tienden a presentarse durante las comidas.

Arsenicum está indicado en las diarreas producidas por enfriamiento del estómago, ocasionado por la ingestión de alimentos fríos. Las evacuaciones son de color amarillo y van acompañadas de dolores quemantes; el enfermo empeora después de la media noche y hay la sed peculiar de Arsenicum.

Argentum nitricum está indicado en la diarrea cuando los intestinos se mueven tan pronto como el enfermo bebe.

China es útil en la diarrea debilitante con evacuaciones acuosas y lientéricas, empeorando por comer frutas. Las evacuaciones pueden escapar involuntariamente después de las comidas.

Apis mellifica es un buen medicamento en el cólera infantil, cuando el ano está ampliamente abierto y las materias fecales salen involuntariamente.

Phosphorus y Aloes tienen también escape involuntario de las materias fecales: el síntoma puede ser expresado mejor, como una inseguridad en el esfínter del ano. En Phosphorus los excrementos escapan tan pronto como llegan al recto, como si el ano permaneciera abierto.

En la parálisis, Oleander está indicado cuando la enfermedad invade uno u otro miembro; es indolora y generalmente va precedida desde largo tiempo por el vértigo. Creo que Oleander, como Gelsemium, está indicado solamente en la parálisis funcional; entiendo que no curará una parálisis de origen central. Oleander va más lejos que Gelsemium, sin embargo, invade los nervios sensitivos lo mismo que los nervios motores.

Oleander tiene también acción sobre la piel. Produce marcada sensibilidad de manera que la más ligera fricción ocasiona dolores e irritación, especialmente en el cuello y entre el escroto y los muslos; hay violenta picazón de la piel al desvestirse. También produce una erupción en el cuero cabelludo y detrás de los oídos parecida a las costras de leche, dando salida a un líquido que se endurece sobre las contras, siendo propicio a la formación de piojos.

En esta enfermedad es tan importante el remedio, como Sulphur, Mezereum, Viola tricolor, etc. La distinción que se puede hacer radica en los otros síntomas; por ejemplo, si se encuentran los síntomas gastro-entéricos característicos, Oleander será el remedio de elección.

Para los síntomas producidos por el envenenamiento agudo por este medicamento, Camphora es el mejor antídoto. Para los síntomas crónicos, particularmente si hay algún desorden cutáneo, Sulphur con toda probabilidad será el mejor remedio porque es el más semejante. No estoy muy seguro del valor de esta última sugestión; simplemente ofrezco este dato por lo que pueda tener de valor.

Vinca minor

Vinca minor es una variedad de la margarita; contiene un principio amargo y astringente en grado máximo, haciéndolo útil como tónico, para emplear el lenguaje de la vieja escuela; es también un estíptico con propiedades para detener la hemorragia, conservando estas propiedades aun en sus diluciones. Por ejemplo, puede ser usado para la menstruación profusa o en la menorragia, cuando la sangre fluye continuamente, asociada naturalmente de gran debilidad. El Dr.

Richard Hughes es su Manual de Farmacodinamia, habla de tres casos de hemorragia post-menopáusica, que fueron curadas con Vinca Minor. En un caso, hubo curación permanente; en los otros dos reapareció la hemorragia, debiéndose en uno de ellos a un carcinoma.

Vinca minor, como su relativo Oleander, produce una erupción pestilente en el cuero cabelludo, en la cara y por detrás de los oídos, que favorece la procreación de piojos; desarrolla una costra que permite al escurrimiento permanecer por debajo, y su descomposición proporciona alimento o sirve de pasto a los parásitos ya referidos; el pelo se cae y es reemplazado por pelo de color gris.

Vinca minor es también útil en la plica polónica, estado en el que el pelo se enreda.

En estos síntomas de la piel puede ser comparado Vinca minor con varios medicamentos; desde luego con Viola tricolor que es útil en el tratamiento de las costras de leche cuando la exudación es copiosa. Al igual que Vinca, enmaraña el pelo, pero hay una particularidad que en todo tiempo permitira distinguirlos entre sí : Viola produce orina con un peculiar olor picante que con toda propiedad ha sido comparado al de la orina de gato; tal es de fuerte su olor. Podemos pensar en esta droga cuando el eczema persistente va acompañado por trastornos de la función urinaria, ya sea que haya una micción copiosa o una supresión repentina de la orina.

Otro medicamento es Arctium lappa, que es útil para el tratamiento de las erupciones húmedas y fétidas que forman costras de un color blanco grisáceo, especialmente cuando los ganglios correspondientes están infartados; los ganglios auxiliares pueden supurar también; hay poliuria con dolores en la vejiga después de la micción.

Tenemos además otro medicamento para las costras de leche o para la tiña favosa, y es Nux juglans, que produce escoriaciones es los oídos y por detrás de ellos como Graphites; el cuero cabelludo está rojo con violenta comezón; las costras aparecen sobre los brazos y en las axilas. (También Arsenicum Iodatum).

Staphysagria es un buen medicamento para las erupciones que tengan escurrimiento fétido, peor en el occipucio; el pelo cae. Al rascarse parece que la comezón cambia de lugar. Está indicado particularmente en los niños enfermizos con cara pálida y círculos obscuros alrededor de los ojos. Fácilmente se enfadan y rehusan los obsequios que se les hacen, justamente como bajo la acción de Chamomilla. Está indicado especialmente después del abuso del mercurio.

Ustilago ha producido, sin embargo, hasta ahora no se sabe que haya curado, una erupción asquerosa del cuero cabelludo en la que parte del pelo se cae, dejando el resto enmarañado; una serosidad acuosa mana continuamente de la erupción.

Alstonia scholaris

Alstonia, según se ha experimentado, produce debilidad, fiebre asténica frecuentemente acompañada de diarrea y cuando su uso continúa, hay sudores, diarrea, calambres y vértigo. Clínicamente se ha usado en los escalofríos y la fiebre; en la diarrea de origen malárico, compitiendo en esto con China y para las fiebres intermitentes crónicas suprimidas por la quinina.

Contiene Ditaina, la que como Curare paraliza los filamentos nerviosos motores periféricos. Pero no va precedido de excitación refleja como sucede en Cinchona. La Ditaina envidentemente paraliza los nervios vasomotores. Parece semejarse a China en la diarrea, escalofrío, etc., pero no tiene la irritabilidad de este último medicamento.

Gelsemium sempervirens

Gelsemium sempervirens es una planta indígena de flor amarilla, que crece en los países del Sur. Siempre está verde y abre sus perfumadas flores en los primeros días de la primavera; es eminentemente venenosa y a este respecto son especialmente activas su corteza raíces. Durante la guerra civil de Estados Unidos, esta planta fué ampliamente usado como sucedáneo del opio, en calidad de narcótico.

En un miembro de la familia de las Loganiáceas, todas las cuales son más o menos venenosas; de este orden obtenemos también Nux vom., Ignatia y Spigelia.

Su alcaloide es la Gelsemina, midriático al igual que Atropina y la Divoisina, Aplicado localmente o usado en grandes dosis, dilata la pupila; sin embargo, dada al interior en pequeñas dosis, la contrae.

Para tener un completo conocimiento de Gelsemium no será necesario esforzarse mucho; su esfera de acción está perfectamente definida. En casos de envenenamiento encontramos que el síntoma general y prominente es la parálisis de los nervios motores. Tenga siempre presente este detalle y los síntomas del medicamento serán comprendidos, especialmente sabiendo que su acción parética se extiende a los músculos, estén o no sometidos a la voluntad. La mente es al principio clara o puede habe run ligero estado estupefaciente, como en el caso de la intoxicación alcohólica; lentitud en el pensamiento y en la emotividad. Después, se notará que los esfínteres llegan a relajarse. El ano permanece abierto, permitiendo el escape de las materias fecales. La orina escpa también involuntariamente. Después la respiración llega a ser fatigosa, como si los músculos no tuvieran la fuerza suficiente para levantar el pecho. Finalmente el músculo cardiaco pierde su fuerza y el paciente muere. Concretando en pocas palabras la acción del medicamento, encontramos que es debilitante. Obra sobre el sistema cerebro-espinal, particularmente sobre los cuernos anteriores de la médula. También vemos que al producir lentitud del pensamiento y estupidez

mental, debe tener alguna acción sobre el sistema vescular. Es por intermedio de los vaso-motores que se produce la congestión y ésta puede ser arterial o venosa. Bajo la acción de Gelsemium, la congestión se refiere tanto a la arterial como a la venosa. Además de esta acción nerviosa, el medicamento tiene afinidad por las mucosas, dando lugar a inflamaciones catarrales. Con esta descripción no será difícil retener a inflamaciones catarrales. Con esta descripcion no será dificil retener sus características.

Nos encontramos que, por su acción paralítica, produce diplopia; esta doble visión cuando Gelsemium es el medicamento, proviene de la paresia de los músculos de los ojos.

La blefaroptosis reclama el uso de Gelsemium, cuando con ésta hay voz embarazosa, rubicundez, sufusión de la cara. Los globos oculares se sienten lastimados, siendo peor la irritac ión al moverlos. En este ultimo síntoma es semejante a Bryonia.

En la ptosis podemos comparar a Gelsemium con Causticum, Rhus tóx., Sepia, Kalmia y Alúmina. Rhus tox., es util en la ptosis, o de hecho en la parálisis de cualquiera de los músculos oculars, cuando la enfermedad se presenta en los reumáticos como resultado de la humedad.

Sepia está indicado en la ptosis, cuando va asociada a irregularidades menstruales.

Kalmia es útil también en la ptosis de origen reumático, cuando va acompañada de una sensación de rigidez en los párpados.

Causticum está indicado en la ptosis de los sujetos reumáticos.

Alúmina está indicado en la ptosis asociada a la inercia rectal consecutiva al estreñimiento.

Volviendo nuevamente a Gelsemium nos encontramos que hay dificultad para deglutir, (disfagia). Este síntoma es debido al defecto de los músculos de la deglución.

Gelsemium también obra sobre la laringe produciendo afonía o carencia de voz. El paciente sólo puede murmurar con dificultad los sonidos completos, debido al estado parético de los músculos de la laringe. Este síntoma se observa frecuentemente en las mujeres histéricas, especialmente después de las emociones de carácter deprimente. La parálisis después de una emoción, se encuentra en otras drogas. Por ejemplo, bajo la acción de Natrum mur., que tiene : "casi perdida la fuerza del brazo después de un acceso de cólera"; Stannum paraliza principalmente el lado izquierdo, produciendo ardor en la parte afectada; Staphysagria produce parálisis de un lado, con motivo de una cólera.

El corazón es afectado por Gelsemium; el paciente en el momento de dormir es bruscamente despertado por una sensación de como si dejara de latir. El enfermo cree que su corazón dejará de latir si no hace por moverse. El músculo cardíaco está fatigado y una especie de instinto de parte del enfermo, le obliga a moverse para estimular de este modo su acción.

Digitalis tiene un síntoma completamente opuesto al que acabamos

de mencionar en Gelsemium; el paciente teme que su corazón deje de latir si verifica cualquier movimiento.

Grindelia robusta produce gran debilidad en el corazón y los pulmones. Cuando el paciente se queda dormido, despierta repentinamente, con una sensación de como si la respiración se hubiera acabado.

En la parálisis post-difterica, Gelsemium es uno de nuestros más valiosos medicamentos. En un caso muy grave de esta afección que yo atendi, Gelsemium obtuve una curación perfecta. El niño carecía de fuerzas suficientes para levantarse. El raquis, en la región cervical superior, estaba flexionado hacia atrás. Un lado del cuerpo estaba paralizado. Al intentar la marcha, el niño titubeaba como si no tuviera ningún control sobre sus músculos; si trataba de girar, caía; la palabra era embarazosa y torpe como si la lengua fuera demasiado grande para su boca; había un extravismo notable; la sensibilidad era casi perfecta. Ordené desnudar al enfermo dos veces por día, extenderlo sobre su cama y friccionarlo energicamente; di Gelsemium al interior y bajo la acción de este medicamento se obtuvo una curacion perfecta.

Dudo que Gelsemium cure la parálisis de origen orgánico, cuando existen lesiones del cerebro, de la médula, o de los nervios periféricos.

Gelsemium es de utilidad en ciertos casos de cefalalgia. He dicho hace poco, que produce una congestión pasiva, y con esto no quiero significar que se trata de un violento y repentino aflujo de sangre a una región, sino de un estado de los vasos sanguíneos en el que están dilatados en forma análoga a la que recientemente mencioné a propósito de Ferrum phosph. La cefalalgia se inicia en la nuca, irradia hacia adelante y se fija encima de los ojos. Ordinariamente empeora por la mañana y va acompañada de rigidez del cuello, o empieza entre dos y tres de la mañana y llega a su apogeo después de medio día. El enfermo no puede razonar eficazmente o fijar su atención; se vuelve indiferente y estúpido; hay vértigo con mirada confusa y pesantez de la cabeza. Estos síntomas son mejorados por la emisión de una orina parecida a el agua (Oleum animale ha curado una hemicranea con poliuria, siendo la orina perfectamente clara). La cara tiene una rubicundez difusa; los ojos se sienten pesados e inyectados; hay una gran dificultad para levantar los párpados superiores; con frecuencia también la palabra es embarazosa, como si la lengua fuera demasiado pesada. Igualmente la cara tiene el aspecto de como si estuviera bajo la influencia del alcohol; el raciocinio es lento, de tal manera que el enfermo responde a las preguntas con lentitud e imperfección. Este estado va acompañado de un pulso lleno y ondulante, dando la impresión al dedo que palpa, de como si pasara bajo él una corriente de agua.

Sucede exactamente como en el pulso de Aconitum, sólo que falta el tóno, es decir, esa dureza y tensión característica del pulso de Aconitum.

Aqui tenemos pues, los síntomás que sugieren a Gelsemium en diversas enfermedades. Cuán útil deberá ser en el estado congestivo de la meningitis cerebroespinal !

Este medicamento tiene, además de los síntomas ya mencionados, uno que es característico de dicha afección : la depresión. La economía parece luchar contra un virus que no puede vencer; de este modo tenemos aquí todas las indicaciones para el empleo de este medicamento en esta terrible enfermedad. Cuando el caso ha llegado a una inflamación activa, cuando hay efusión, Gelsemium deja de estar indicado y cede su sitio a otros medicamentos.

Además de la forma de cefalalgia antes descrita, hay otra que va asociada a una sensación de como si se tuviera una banda rodeando la cabeza o por delante de la frente.

Hablemos ahora de la fiebre que produce Gelsemium. Esta es de tipo remitente o intermitente. Encontraremos que es un remedio de valor en los tipos de fiebre remitente en los niños; veremos al paciente asoporado y moviéndose en su cama, en agonía. (No podremos dar Aconitum en este caso a menos que los síntomas mentales del medicamento esten presentes). La cara esta roja; con una rubicundez difusa de la que ya hable hace un momento. Cuando el niño es despertado de este asoporamiento, está caprichoso, irritable, nervioso, o excitable, pero jamás tendrá la violenta agitación que produce Aconitum. En los casos extremos, el asoporamiento puede ceder su sitio a movimientos convulsivos. Los músculos de la cara se contraen súbitamente; el paciente se pone rígido, como si estuviera a punto de sufrir una convulsión. Ordinariamente no hay mucha sed, pero existe una postración tan grande, que el niño parece demasiado débil para moverse; todo el cuerpo parece estar tan dolorido, que grita si se le mueve. Estos síntomas tenderán a una remisión y puede ser que a la mañana siguiente se note una ligera transpiración; por la tarde los síntomas vuelven a aparecer como antes.

En los tipos de fiebre intermitente, podemos inclinarnos a Gelsemium en su principio. El escalofrío sube por el dorso o parte de los pies y se extiende hacia arriba. Algunas veces va asociado a una micción profusa con sensación dolorosa de quebranto en todo el cuerpo. El paciente tiene necesidad de ser sostenido para no temblar tanto; después se presenta la fiebre con los síntomas ya mencionados. Algunas veces hay irritabilidad; el paciente no puede soportar el ruido ni la luz. La transpiración es poco abundante o parcial, pero mejora todos los dolores. La lengua tiene un revestimiento blanco o amarillo, la palabra es torpe; los intestinos están constipados y las evacuaciones son amarilas. Con especialidad está indicado en la fiebre intermitente que no es de origen malarico.

En los adultos, encontraremos que Gelsemium es el medicamento en la fiebre biliosa, con particulariadad en la biliosa remitente. La razón por la cual es útil en la fiebre biliosa es porque produce una congestión pasiva del hígado; la sangre circula lentamente a través de este órgano.

Esta no es la congestión portal que se encuentra en Nux vomica, sino más bien una circulación lenta de la sangre; de este modo el hígado se sobrecarga de sangre, la bilis, no puede ser secretada correctamente y hay un tipo de fiebre biliosa.

En la fiebre tifoidea, Gelsemium está indicado particularmente en los primeros estadios; cuando durante la primera semana el enfermo se siente dolorido y magullado por todas partes como si hubiera sido golpeado; teme moverse; hay cefalalgia; y más que esto ha perdido la fuerza muscular. Está asoporado y tiene el mismo aspecto rojo difuso de la cara. En este caso, Gelsemium modificará el curso de la fiebre de tal manera que el enfermo la pasará con síntomas relativamente benignos.

Puede estar indicado Gelsemium en los catarros producidos por el tiempo caliente que relaja, con un escurrimiento nasal escoriante que lastima las fosas nasales y las alas de la nariz. Hay estornudos frecuentes y dolor de garganta; las amígdalas están rojas y un poco tumefactas, con dificultad para deglutir.

De paso diré que esta dificultad para deglutir no es la que produce Belladonna. En esta última droga, la dificultad proviene de la inflamación extensa y también de la contracción espasmódica de la garganta, debidas a la hiperestesia de los nervios; apenas el agua toca la garganta, es expulsado por la nariz. En Gelsemium la disfagia en la consecuencia del estado parético de los músculos o el paciente sufría una debilidad muscular cuando tuvo el resfrío. Con este catarro hay una tos seca que atormenta, con cosquilleo y muy poca expectoración. La fosa nasal derecha está seca y dolorosa, como si agua caliente pasara por la mucosa; hay mejoría cuando se está cerca del fuego. Encontraremos una postración general y con frecuencia también neuralgia facial.

En la prosopalgia, Gelsemium puede ser de utilidad, cuando la afección ataca un lado y es de tipo intermitente. El séptimo par nervioso es atacado y el enfermo hace toda clase de gestos.

Gelsemium tiene también cierta acción sobre la piel. Produce comezón y rubicundez de este tejido; el escozor es tan violento que impide al paciente dormir. Puede aparecer una pequeña erupción consistente en botoncillos parecidos al sarampión más o menos.

Por esta razón, Gelsemium puede emplearse en el principio del sarampión cuando la fiebre es el síntoma dominante y está presente el coriza de la droga: escurrimiento nasal acuoso, que escoría las alas de la nariz y el labio superior; va frecuentemente asociado a una tos dura semejante al ladrido, crupal, con ronquera.

Aconitum, en igualdad de circunstancias, es el mejor medicamento que poseemos para el principio del sarampión. Si nos encontramos un caso en el que presumimos que se trata de sarampión, con fiebre, agitación, fotofobia, coriza, estornudos, tos dura y crupal, estará justificado el uso de Aconitum.

Pulsatilla no será el medicamento indicado si hay fiebre. Cuando hay sudor con la fiebre, Belladonna probablemente, será el medicamento

de elección. Si hay un estado de sopor con cara congestionada podemos hacer uso de Gelsemium al principio de las enfermedades eruptivas aún habiendo convulsiones.

Deseo hablar en seguida acerca de la acción de Gelsemium sobre los órganos genitales. En los masculinos, produce un estado muy próximo a la impotencia, frecuentes poluciones nocturnas involuntarias con relajamiento de los órganos, sin sueños lascivos, presentándose con frecuencia un sudor frío en el escroto. Los órganos están relajados. Está indicado con especialidad en los casos que provienen de la masturbación.

Quisiera recordar para estos casos, otro remedio, Dioscorea. Esta es un excelente medicamento para lo que pudiéramos llamar emisiones seminales atónicas, cuando hay un estado pasivo; dos o tres veces despierta el enfermo por la noche con emisión de esperma. Al día siguiente de las poluciones el enfermo se siente débil, más particularmente de las rodillas. En estos casos, no conozco otro medicamento tan eficaz como Dioscorea. Lo empleo ordinariamente a 12a. y después a la 30a.

Caladium seguinum está indicado en los malos efectos de los excesos sexuales, el enfermo despierta con poluciones que sobrevienen sin ninguna lascivia o excitación sexual.

Agnus castus es el remedio para la espermatorrea cuando se trata de viejos libertinos.

Otros medicamentos que pueden ser comparados con Gelsemium por su acción sobre los órganos masculinos, son : Digitalis, Phosphorus, Nux vomica, Calcarea ostrearum, Lycopodium y Camphora.

Sepia, selenium y Conium, produce una debilidad seminal semejante con eretismo y emisiones fáciles.

En la gonorrea Gelsemium está indicado al principio, cuando hay un dolor uretral marcado; hay también sensación de quemadura en el meato y a lo largo del trayecto uretral; el escurrimiento es aun poco abundante y no es francamente purulento. La enfermedad puede haber sido suprimida y como resultado, haberse complicado con una epididimitis. En el reumatismo gonocócico puede ser un remedio de utilidad.

En las afecciones de los órganos femeninos, Gelsemium resulta ser un medicamento excelente. Ante todo, está indicado en la rigidez del cuello uterino; es necesario no confundir este estado con el espasmo del mismo cuello, que exige el uso de Belladona. Con frecuencia nos encontramos en el trabajo del parto, después de que ha durado varias horas, que hay un retardo en la dilatación del orificio; el dedo explorador encuentra el cuello resistente, duro y grueso; la enferma es histérica y presenta demasiada excitación nerviosa; los dolores, irradiando del útero, se extienden a todo el cuerpo. Este estado exige el uso de Gelsemium.

Hay otro estado enteramente opuesto al anterior que indica el uso de Gelsemium y que consiste en la atonía completa del útero. El cuello

uterino es tan blando como el mastique; absolutamente fláccido; el cuerpo uterino no se contrae en absoluto; la bolsa de las aguas asoma ampliamente através del cuello; no hay tendencia a la expulsión; en tales casos, daremos algunas dosis de Gelsemium. En las estados premonitores de las convulsiones puerperales, Gelsemium resulta ser un medicamento admirable; puede existir albuminuria; la enferma está ordinariamente asoporada y hay estremecimiento en distintas partes del cuerpo; el cuello está o rígido, como se ha mencionado en un principio, o bien el útero está absolutamente inactivo; el pulso es lleno y amplio pero blando; dolores abdominales violentos, agudos y cortantes, irradian de adelante hacia atrás y remontan hacia arriba; acompañando a estos dolores, hay fluxión sanguínea a la cara.

Gelsemium puede también ser empleado fuera de la época del embarazo; el útero está desviado en anteflexión notable y se siente como si estuviera atado por una ligadura. Estos síntomas uterinos van asociados a una cafalalgia frontal con obscurecimientos de la vista. La cabeza se siente enormemente grande, con una sensación de confusión rara, Estos síntomas alternan con un dolor agudo, como si el útero estuviera en trabajo de parto, irradiando a las caderas y al dorso y aún descendiendo a los muslos. Gelsemium es con mucha frecuencia útil en la dismenorrea neurálgica y congestiva, cuando también hay pesantez.

Caulophyllum se asemeja a Gelsemium en la dismenorrea y le sigue bien.

Actoea racemosa y Sepia producen cefalalgia refleja por irritación uteina.

Gelsemium es de utilidad en los efectos producidos por las emociones, con particularidad después de un susto o terror. Una diarrea súbita, que se presenta como efecto de una emoción, exige el uso de Gelsemium. Las evacuaciones son copiosas, amarillas y pulposas; la lengua está cubierta de una capa blanca o amarillenta. Otros medicamentos que pueden ser empleados en la diarrea que se presenta por influencias emotivas son : Opium, Veratrum album, Argentum nitricum y Pulsatilla.

Opium en los casos que resultan del miedo.

Veratrum album en la diarrea que se presenta por un miedo cerval, asociada de sudor frío en la frente.

Argentum nitricum cuando la diarrea sucede a una gran excitación. especialmente cuando la imaginación ha sido puesta en juego.

Pulsatilla en la diarrea por un susto, cuando las evacuaciones son verdosas, amarillas y glerosas, o muy variables.

Gelsemium puede también impedir un aborto inminente por emociones deprimentes.

Conium, Physostigma y Tabacum refuerzan la acción de Gelsemium.

Gelsemium tiene como antídoto a los estimulantes : Belladonna, Digitalis, etc.

Nux vomica

Nux vómica, de la familia de la Loganiáceas, es una droga conocida desde el año de 1540 en que Valerius Cordius escribió una muy notable descripción acerca de ella. La fruta del árbol es como del tamaño de una naranja y contiene una pulpa amarga y gelatinosa; se dice que la comen algunos pájaros de la India, aunque es bien sabido que contiene estricnina. La Nuez es la semilla despojada de la pulpa y la cáscara; tiene la forma de un disco agrietado, de un diámetro aproximado de una pulgada por un cuarto de espesor; su superficie está satinada por una gruesa cubierta de vellosidades radiadas estrechamente.

Se recordará que ya he mencionado que Ignatia y Nux vómica, contienen como principio activo dos alcaloides : la Estricnina y la Brucina. La Brucina se encuentra en mucho más pequeñas cantidades que la Estricnina y en mayor cantidad en la corteza del árbol que en la Nuez misma; sus propiedades son algo semejantes a las de la Estricnina; ambos alcaloides están combinados con un ácido conocido con el nombre de igasúrico, idéntico al ácido málico que se encuentra en las manzanas y peras.

La Estricnina, principal alcaloide de Ignatia y Nux vómica, tiene una sintomatología bien descrita, siendo un veneno muy comunmente empleado en los suicidios, homicidios y en la exterminación de algunos animales como gatos, ratas, etc. La Estricnina produce agitación y tamblor de los miembros, especialmente los inferiores, rigidez del cuello y mandíbulas, constricción de la garganta y convulsiones tetánicas con opistótonos. Estas convulsiones difieren de las del verdadero tétanos, solamente en que los músculos se relajan en medio de los paroxismos, la temperatura del cuerpo no es tan elevada y el trismus sobreviene tardíamente en el envenenamiento por la Estricnina. Las convulsiones provocadas por la Estricnina son renovadas por las impresiones de los sentidos, particularmente por el tacto ligero; en tanto que las fricciones mejoran al enfermo. En grandes dosis o repetidas con frecuencia, produce la parálisis de los nervios aferentes. Finalmente se presenta el colapso, como resultado del agotamiento de los centros motores. He dado los síntomas de las Estricnina, con dos propósitos : primero, para que se pueda familiarizar con ellos a fin de reconocerlos en el caso de que algún paciente, tuviera la desgracia de ser envenenado con esta droga; y segundo, para que se pueda entender mejor la acción de Nux vómica, porque siendo la Estricnina su principal ingrediente, se encontrará esta exagerada impresionabilidad deslizándose en toda su sintomatología. Por esto hago hincapié en que todo impresiona al paciente con exceso. Las impresiones externas, tales como los sonidos, olores y ruidos, lo excitan y he asentado que este síntoma es característico de la droga. La dosis mortal mínima de Nux vómica, se dice que son tres granos y de Estricnina, medio grano.

La Estricnina se parece a la Picrotoxina, Veratrina, Cicuta virosa,

Thebaina, Hydrocyanic. acid., Belladonna, Stramonium, Acónitum, Physostigma, Passiflora, Curare, Camphora y Phytolacca, pero especialmente sus efectos son semejantes a los del tétanos traumático.

La Picrotoxina, según Bartholow, es sinérgica de la Estricnina; pero la respiración es acelerada no tanto por el espasmo de los músculos respiratorios, sino por el espasmo de la glotis y hay menos susceptibilidad al tacto ligero. Gubler asegura que la Picrotoxina produce más síntomas coreicos.

La Veratrina causa incoordinación al producir la relajación de algunas fibbras y la contracción de otras; es decir, que después de la contracción prolongada de los músculos, se produce una estado de relajación parcial con contracciones fibrilares. En esto se parece a la Estricnina; pero difiere notablemente por la producción diarréica, por los vómitos y por la parálisis general que sobreviene, no por agotamiento, sino por la pérdida de la vitalidad muscular.

La Thebaina produce el tétanos, pero puede distinguirse por su síntomas hipnóticos. Se asegura que es el más venenoso de los principios activos del Opio.

Physostigma, que contiene su alcaloide, la Escerina, puede ser confundido con la Estricnina solamente en un grupo limitado de síntomas. Aumenta la irritabilidad de los nervios sensitivos y también produce espasmo tetánico de los músculos lisos. Pero en lo más importante difiere completamente de Estricnina, produciendo parálisis espinal y disminuyendo los reflejos. Sin embargo, cuando tales síntomas, como la constrición de la garganta, los calambres en el estómago y en los intestinos, el tenesmo rectal, la rigidez de la espina y miembros inferiores, la sensación de opresión en los globos oculares, sugieren una semejanza con Estricnina, las evidencias mencionadas de parálisis espinal, asi como los siguientes síntomas, servirán para diferenciarlos : temblor, una debilidad tal, que difícilmente permite al enfermo caminar; falta de control sobre los músculos; (Como en Gelsemium y Conium) falta de firmeza al caminar con los ojos cerrados. En la Estricnina, la muerte es el resultado de la asfixia producida por el espasmo tetánico de los músculos respiratorios; en Physostigma, es por la parálisis. Las pupilas también difieren; en el primero, hay dilatación durante las convulsiones y contracción en el intervalo de los accesos convulsivos; en la segunda, hay contracción con defecto de acomodación y tremulación de los párpados.

Si ahora se consideran los efectos remotos de la Estricnina, como los que siguen a un envenenamiento grave, pero no mortal, o como los que frecuentemente son producidos por las diluciones, podemos todavía distinguirlos por la irritabilidad característica, más marcada en Estricnina; todo le produce muy fuerte impresión; los olores le ocasionan vahído; hay temblor muscular con excitación; deseo del coito, pero durante este acto el pene se vuelve fláccido.

Curare, aunque contiene Estricnina, obra completamente en forma

distinta del último, debido a la presencia del alcaloide Curarina; esta substancia destruye la excitabilidad de las terminaciones nerviosas motoras, respetando los músculos. La acción refleja es menguada o destruida y la respiración paralizada; la sensibilidad no está completamente alterada. Debido a la parálisis de las terminaciones del vago, la acción del corazón se acelera, pero la presión sanguínea no es aumentada. De hecho, por la parálisis de las terminaciones de los vaso-motores, los vasos sanguíneos se dilatan, disminuyendo su resistencia a la corriente sanguínea. El aumento del peristaltismo no es debido al espasmo sino a la parálisis de las fibras esplénicas inhibidoras.

No tenemos experimentaciones dignas de crédito acerca de Curare. Baruch lo ha usado para las llamadas "manchas hepáticas" y el Dr. Paul Pitet, menciona varias curaciones notables de debilidad muscular, dificultad de la respiración por falta de fuerza, inmovilidad con mirada fija al despertar y eczema infantil, más acentuado en la cara y detrás de las orejas, especialmente en los niños escrofulosos.

También Baruch la ha usado, entiendo que para la catalepsia, con espasmos del maxilar inferior y en la debilidad paralítica de las manos de los pianistas.

Phytolacca difiere esencialmente de la Estricnina en sus propiedades narcótico-acres, así como en su irritación tardía gastro-intestinal y en el colapso. Sin embargo, los síntomas convulsivos son semejantes; los miembros, especialmente los inferiores, están rígidos; las manos fuertemente cerradas; los pies extendidos y los dedos flexionados; los maxilares apretados y separados los labios mostrando los dientes; hay opistótonos; la barba se pega al esternón y alternan la relajación y el espasmo de los músculos faciales.

Passiflora incarnata ha curado casos de tétanos en los países cálidos, donde desgraciadamente son muy comunes. El Dr. Archibald Bayne, de Barbadoes, refiere dos curaciones con la tintura madre y la la. decimal. (Hahnemann Monthly, mayo de 1881).

Angustura se coloca entre los amargos aromáticos y es considerado como tónico. Pero es más que esto; produce tensión y rigidez de los músculos y articulaciones, con sensación de magulladura, como producidas por golpes. Esta tensión es bastante marcada en los músculos temporales y maseteros para producir el trismus. La droga tiene también acción sobre los huesos. Hay puntos de semejanza entre Angustura y una de las rutáceas, Ruta graveolens. Las lesiones del periostio sugieren frecuentemente a este último y es muy probable que si existen con un principio de contracciones musculares, pueda necesitarse del primero.

El Dr. Hering que hizo hincapié en la confusión de Angustura con Estricnina, sin embargó informó acerca de una curación de tetanos con el primero y consignó sus síntomas en su Guiding Symptoms.

El Dr. Hubbard reporta una curación hecha con Angustura (Medical investigator, abril de 1870).

Que Angustura vera tiene acción sobre los huesos, ha sido

plenamente confirmado. Aegidi lo usó cuando los huesos largos estaban afectados. (Véase : Rau's pathology). El Dr. C.G. Raue, me informó que la preparación con la que él habia curado las artritis, fué, sin duda, con Angustura vera. Era de Jenichen y este preparador, cuidadosamente estableció las diferencias entre la Angustura vera y la Angustura falsa, o Nucis vomicoe cortex o Brucea antidisentérica.

El Dr. Aug. Korndorfer, Sr., usó el producto de Jenichen a la doscientas para la necrosis del maxilar inferior : Un lado del maxilar había sido resecado sin éxito, haciendo su aparición en el lado opuesto; la curación fué completa.

Entre los característicos generales de Angustura, podemos referirnos a la irritación por un ligero traumatismo (con caries). Deseo vehemente por el café (clínico, pero confirmado por Dunham-Boenninghausen). Tenesmo rectal con evacuaciones blandas; urgencia para orinar, con flujo copioso (Véase el caso del Dr. Echmudson, Hahnemannian Montly. octurbre 1876). No puedo estar completamente de acuerdo con el Dr. Hughes, cuando afirma que Angustura no ocupa un lugar definido en la terapéutica.

Aconitum en una de sus manifestaciones, produce una tensión general de los nervios y los vasos, caracterizada por la ensiedad bien conocida, el calor, etc. (Vea Hughe's Pharmacodynamics). Produce también trismus y rigidez de los miembros, y aún opistótonos. Ahora vemos por qué Reynol pudo usarlo con éxito en el trismus de los caballos (Trousseau's Therapeutics, T. 11) y también por qué es recomendado en el principio del tétanos traumático.

Sin embargo, no produce como la Estricnina, un aumento de la excitación refleja. Existe más bien una disminución o perversión de la sensibilidad manifiesta por el adormecimiento con escozor.

En la amenaza del tétanos, tenemos efectivamente preventivos eficaces para impedir el desarrollo completo de la enfermedad. Aconitum, cuando hay fiebre, ansiedad y tensión de los músculos, hormigueo y adormecimiento; Veratrum viride e Hypericum, cuando hay dolor atormentador en la herida; Belladonna, Cicuta, Silicea y probablemente Angustura, si la herida ha estado supurando o repentinamente ha dejado de producir pus.

Hydrocyanic. acid, ha sido recomendado por Begin en el tétanos y por el Dr. Hughes en su artículo, sobre este ácido, leído en el Congreso mundial en 1876, cita casos de envenenamiento que prueban su homeopaticidad en la epilepsia y el tétanos. La relación de este ácido a la última enfermedad está más ampliamente representada en la Farmacodinamia del Dr, Hughes en donde se lee lo siguiente: "El ácido Hidrociánico produce el tétanos, no hay como en la Estricnina, un aumento evidente de la excitación refleja, pero como en Aconitum y Cicuta, hay espasmo tónico persistente, producido por su acción directa sobre la médula".

Parece ser útil especialmente cuando los síntomas tetánicos se manifiestan principalmente en los músculos faciales, mandíbulas y dorso; hay trismus, risa sardónica, con respiración difícil, lividez y

espuma en la boca - El Dr. Charles A. Bernard refíere dos casos de tétanos traumático mejorados con este ácido. En ambos casos solamente el espasmo de la cara, mandibulas y pecho, tuvieron mejoría, siendo necesarios otros medicamentos por los síntomas restantes. (Vea la Gaceta Médica Inglesa, Octubre de 1882).

Esta afinidad del Hidrocyanic. acid por la parte superior del cuerpo, no lo contraindica en el opistótonos y rigidez tetánica general, porque bajo su perniciosa influencia el tronco y las extremidades entran de un modo completo en espasmo. En un caso, éste comenzó en los dedos de los pies y se extendió a todo el cuerpo. Pero el ácido afecta, sin género de duda, más poderosamente a la médula oblonga y en consecuencia, los pulmones, corazón y laringe, sufren por intermedio del vago. Tiene poca semejanza con Estricnina pero es analogo a Cicuta, Lachesis y Nicotina.

Lachesis ha mejorado, cuando con el trismus y el aspasmo de la laringe, hay lividez por asfixia y el paciente duerme en el paroxismo.

Cicuta virosa contiene un alcaloide volátil llamado Cicutina, que químicamente es idéntico a Conína. Según Boehn, esta planta produce vomito, diarrea y convulsiones tetanoides y también síncope y estrabismo. Cicutoxina es otro alcaloide derivado de la Cicuta; el más poderoso de todos, produciendo en las ranas espasmos tónicos y clónicos alternantes. La respiración es apresurada; la inspiración sobrepasa de tal manera a la expiración, que el animal parece distendido por el aire. En los mamíferos el primer efecto es la salivación profusa, temblor de los músculos y después el espasmo. La respiración aumenta rápidamente y de una manera súbita se desarrollan las convulsiones. Lo mismo que en Estricnina, la respiración es suspendida por la contracción de los músculos respiratorios. Una irritación hace reaparecer los espasmos; después que los paroxismos cesan, el animal yace completamente agotado.

Ahora estas consideraciones sobre la acción de Cicuta, constituyen características que por muchos años han guiado al homeópata en la elección de este poderoso rémedio : rigidez repentina; después, sacudimiento y violentas contorsiones, seguidas de postración absoluta; el espasmo tónico se renueva por el tacto; gran opresión respiratoria; maxilares contraídos; cara de un color rojo-obscuro; espuma en la boca; pérdida del conocimiento; opistótonos.

La crisis, en el caso de Cicuta, es más epileptiforme que en Estricnina y hay generalmente pérdida de la conciencia; la excitabilidad refleja es menos marcada en el primero. El agotamiento de Cicuta es igualado solamente por el de Chininum arsenicosum.

Tabacum y su alcaloide Nicotina, también están íntimamente relacionados a Coniina; producen caída hacia atrás de la cabeza con rigidez de los músculos del cuello y el dorso; contracción de los párpados y de los músculos maseteros; la respiración es silbante debido al espasmo de los músculos laríngeos y bronquiales; espasmos tónicos y clónicos que alternan, seguidos de relajación general y temblor; retracción de las fibras musculares lisas, como

intestinos, ureteres, etc.; estas contracciones van acompañadas de intenso dolor, náusea y sudor frío, colapso rápido con asfixia.

El Tabaco, pues, obra sobre la médula, especialmente sobre la médula oblonga, lo mismo que sobre los ganglios abdominales. Los síntomas tetánicos con asfixia se asemejan a los de Hydrocyanic. acid., más bien que a los de Estricnina. Una diferencia característica entre Tabacum y Nux vomica, está bien representada en sus respectivas aplicaciones en el cólico nefrítico. En Nux vom. hay dolor que desciende por el uréter derecho, irradiando a los genitales y la pierna derecha, náusea y vómito; en Tabacum los dolores descienden por el ureter con náusea mortal y sudor frío.

Veratrum album produce trismus con espasmo de la glotis y constricción del pecho, llegando hasta la sofocación; las pupilas contraídas; las manos y pies contraídos hacia adentro. Puede distinguirse de Estricnina por el hecho de que bajo la acción de Veratrum album las contracciones son secundarias a las enfermedades agotantes y nunca son primitivas como sucede en Estricnina.

Stramonium, como Estricnina, produce convulsiones tetánicas, que empeoran por el tacto o por la luz. La principal distinción consiste en que en Stramonium casi siempre hay manía, en tanto que en Estricnina, la mente es lúcida aún en las ultimas horas de la vida.

Camphora y Phytolacca son semejantes a Estricnina en los espasmos tetánicos; ambos tienen la exhibición de los dientes por el levantamiento de las comisuras de la boca. Pero cuando Camphora está indicado en los espasmos tetánicos, encontramos siempre presente la frialdad de muerte.

Al estudiar la Nux vomica, se recordarán estas observaciones preliminares.

Permítaseme ahora decir que Nux vom. es complementario de Sulphur; por eso deseo hacer notar que muy frecuentemente despúes de que Nux vomica ha hecho tanto como sus síntomas le permiten, los restantes encontrarán en Sulphur el remedio que completará la curación.

Quiero hablar ahora acerca del temperamento de Nux vomica; de esto no se sigue necesariamente que no se debe dar Nux vomica si la constitución no es la que voy a describir; sino que en resumen, obra mejor en la constitución mencionada. Nux vom. se adapta mejor a los pacientes demacrados, delgados; parece que no obra tan bien en los pacientes gordos; está especialmente indicado si el enfermo es muy irascible, rápido y activo en sus movimientos. Es de temperamento nervioso; extremadamente susceptible a las impresiones externas; no puede tolerar el ruido, los olores y la luz; la cara es más bien pálida o amarillenta; hay una especie de plétora falsa que da por momentos al paciente, mejillas rosadas sobre fondo amarillo. Generalmente se

encontrará que sufre por cualquier esfuerzo mental. particularmente si esta sobrecarga produce mayores trastornos por el hábito sedentario. De esta manera se encontrará que el medicamento es de gran valía, para los que se privan del sueño empeñados en sus estudios. Se encontrará frecuentemente indicado en los sacerdotes que hacen muy poco ejercicio y llegan a ser dispépticos; sufren cefalalgias y por las mañanas despiertan cansados. El enfermo de Nux frecuentemente permanece despierto en la noche, está su mente tan excitada que no puede dormir. Los pensamientos le vienen en forma confusa; no se duerme hasta pasada la media noche y despierta muy temprano, entre las cuatro o cinco. Duerme otra vez y despierta sintiéndose terriblemente fatigado como después de una fiesta y como si el sueño no le hubiera reportado ningún beneficio. Tiene un sabor de boca amargo; la lengua está sucia y se queja de un profundo dolor obtuso de cabeza; de hecho, cada uno de estos síntomas indica un agotamiento del sistema por exceso de trabajo. Estos, pues, son la variedad de pacientes, en los cuales Nux vomica será más efectivo.

La Nux vom. puede impedir el reblandecimiento cerebral inminente, especialmente cuando el hábito sedentario y el intenso esfuerzo mental le han precedido, así como en los casos en que la intemperancia precede a la enfermedad. El paciente se queja de un dolor de cabeza cuando hace un esfuerzo mental; la memoria es infiel, hay vértigos y el paso es inseguro. Puede ser seguido de Phosphorus, Picricum acid, o Sulphur.

En los enfermos de Nux vom. se encontrará frecuentemente desórdenes en el aparato digestivo. Hay dolor de cabeza situado ya en el occipucio, ya sobre un ojo, generalmente el izquierdo. Cuando el dolor se sitúa en el ojo, principia generalmente en la mañana, aumenta todo el día hasta llegar la noche, va acompañado regularmente de sabor agrio, (menos frecuentemente por sabor amargo) y eructos desagradables. Pueden ir asociados de vómitos de alimentos y de substancias agrias, pero el rasgo prominente del vómito, es la violenta arqueada, más o menos ineficaz que demuestra el grado de irritación gástrica. El enfermo tiene la peculiaridad característica de despertar muy temprano, volviendo a dormir nuevamente para despertar más molesto que la primera vez. Hay constipación, consistiendo en la urgencia frecuente e ineficaz de evacuar; por esto se verá que no es debido a una atonía rectal, sino a una acción irrgular e inconstante. El paciente sufre también gastralgia, ordinariamente agravada por comer. En algunas ocasiones empeora a pesar de que el estómago esté vacío. Los dolores se inician en el epigastrio e irradian en distintas direcciones, al dorso, etc. Los paroxismos propenden a repetirse periódicamente todas las mañanas y frecuentemente van asociados a vómitos de una substancia agria, con urgencia frecuente e ineficaz de evacuar. Los dolores son angustiosos, como producidos por un garfio, como si algo estuviera raspando el interior del estómago; mejoran frecuentemente

por tomar bebidas calientes. Haré hincapié en que los síntomas mencionados para Nux vomica, traducidos al lenguaje patologico serían catalogados bajo la designación de irritabilidad gástrica. Los nervios están en tal estado de hiperexcitabilidad, que la ingestión de alimentos produce un estado espasmódico del estómago y la expulsión de su contenido; se notará por esto, que es patológicamente semejante al estado del recto.

En esta irritabilidad gástrica extremada, encontramos en Nux vom. un medicamento del cual no podemos prescindir. Se trata de un paciente que ha sido debilitado por una enfermedad y que tan pronto como deglute el alimento lo devuelve. Nux vom. es aquí uno de los medicamentos en los que se debe pensar, particularmente en los niños muy excitables y en los gastronomos que han dado rienda suelta a sus apetitos.

En otros casos en que hay intenso ardor en el estómago con expulsión violenta de los alimentos, Bismuthum es el remedio. El Subnitrato de Bismuto es el medicamento para la gastralgia pura, es decir, que no va asociada a un estado catarral o cualquiera de los otros síntomas de la indigestión. Los dolores en el epigastrio pueden ser quemantes, constrictivos o lancinantes e ir asociados a un violento dolor en el dorso y arqueo espasmódico. El paciente vomita a intervalos cuando el estómago llega a estar lleno, siendo enorme la cantidad de materias vomitadas. El agua es vomitada tan pronto como llega al estómago. Los dolores se distinguen de los de Nux vom. en que generalmente son mejorados por tomar agua fría y aún cuando el enfermo está muy postrado, la superficie del cuerpo es caliente.

En estos casos también encontramos en Arsenicum un magnífico remedio, cuando además de los dolores quemantes tenemos la intolerable inquietud, ansiedad, sed, etc., produciendo un cuadro perfecto de la gastritis subaguda. Un remedio más valioso que los ya mencionados es Kreosotum, que es útil para la debilidad irritable del estómago. Los alimentos no pueden ser digeridos; pero su carácter distintivo consiste en el hecho de que el estómago retiene el alimento por más horas que lo normal, siendo vomitado después.

Otras formas de desarreglos gástricos en los que Nux vomica es aplicable, es en la dispepsia en la que hay marcada agravación más o menos una hora después de comer. El paciente se queja de una hambre fenomenal, aproximadamente veinticuatro horas antes de que se presente el ataque; desea comer carnes, salsas, alimentos grasosos, sintiendo repugnancia por el café; tiene una sed violenta, pero el agua le molesta y produce distensión gástrica; aún después de una ligera comida se ve obligado a aflojarse las ropas; es importunado con eructos agrios, amargos e hipo. En estos síntomas gástricos, cuando Nux vom. falla, Carbo veg. es un magnífico remedio, aún cuando también Sulphur puede ser necesario.

Pulsatilla es superior a Nux vom. cuando estos trastornos sobrevienen como resultado de un régimen alimenticio de carnes,

pasteles, nueces, cremas, helados, etc., especialmente si concuerda el temperamento.

En la constipación, Nux vom. es parecido a diversos medicamentos. En Lycopodium hay urgencia ineficaz para evacuar; pero esta urgencia es producida por la constricción del recto y del ano. Carbo veget. tiene urgencia para evacuar semejante a la de Nux vom., pero es mejorada por escape de gases, explicando esto la causa de la urgencia.

Bajo la acción de Opium, Bryonia y Alumina, la constipación no es acompañada de necesidad urgente; Opium produce estreñimiento por paresia intestinal; las evacuaciones consisten en escíbalos de color obscuro.

La constipación de Bryonia resulta de la sequedad del tubo digestivo; las evacuaciones son grandes, secas y duras.

Alumina se caracteriza por la marcada inactividad del recto; aún la expulsión de excrementos blandos requiere gran esfuerzo.

Nux vom. tiene marcada acción sobre el hígado; está indicado especialmente en las afecciones hepáticas, en personas que han abusado de las bebidas alcohólicas y de los alimentos demasiado condimentados, así como de los purgantes drásticos. Nux vom. es uno de nuestros mejores remedios para contrarrestar los efectos de las dósis alopáticas. Al hacerse cargo de un caso que ha estado bajo un tratamiento de la vieja escuela, será frecuentemente necesaria la administración de Nux vom. para poder obtener un cuadro sintomático bien definido. En estos casos se encontrará con frecuencia aumentado de volumen el hígado, duro y sensible a la presión de las ropas. A menudo hay cólicos que acompañan a los desarreglos gástricos y biliosos; puede venir por la acumulación de gases que comprimen el pecho, haciendo difícil la respiración y comprimiendo el recto y la vejiga, dando origen a la urgencia para evacuar y al deseo de orinar; o bien puede tratarse de un cólico hemorroidario. Quizá el paciente por muchos años ha sido víctima de las hemorroides; por eso hago hincapié en los dolores abdominales que sobrevienen después de la detención brusca del flujo hemorroidal. Si por algún motivo este flujo ha sido suprimido repentinamente, aparecen la cefalalgia o el cólico, en este caso, Nux vom. aliviará. Si el hígado está aumentado de volumen se dará este medicamento en dosis repetidas y se tendrá la satisfacción de ver que este órgano recobra sus dimensiones fisiológicas. Si no sucede así, Sulphur, Lachesis, Fluoricum acid., Arsenicum y Amonium mur., serán útiles.

También puede indicarse Nux vom. en el aumento del volumen del hígado de los bebedores; en estas circunstancias debe ser comparado con Sulphur, Fluoricum acid, Arsenicum y Amonium mur.

Nux vom. es útil también en la ictericia producida por un violento arrebato de cólera o por el abuso de la quinina o también por los placeres de la mesa; el paciente sufre ataques de desmayo, después de los cuales se siente muy débil.

Chamomilla puede ser empleada en la ictericia que proviene de una crisis de enojo, pudiendo recurrirse también a Bryonia, Natrum sulph. y Aconitum.

Bryonia es útil especialmente cuando la ictericia ha sido provocada por el abuso del calomel.

Cardus marianus está indicado en la ictericia con fuerte dolor de cabeza, gusto amargo, lengua blanca, especialmente en su parte media, con la punta y bordes rojos. Hay náuseas con vómito de un líquido verde, ácido. Las evacuaciones son biliosas y la orina de color amarillo oro. Hay una plenitud molesta en la región hepática.

En las hemorroides, Nux vom. puede ser útil cuando hay prurito que impide al enfermo dormir por la noche y frecuentemente es tan molesto, que le obliga a levantarse y tomar un baño de asiento frío, para encontrar alivio. Hay frecuentes e ineficaces deseos de evacuar y las hemorroides son propensas a sangrar. A menos que Nux vom. esté perfectamente indicado en estos casos, no se prescribirá porque aunque puede curar las hemorroídes, despertará alguna otra molestia menos soportable que la que ha curado.

Son diversos los medicamentos análogos a Nux vom. en las hemorroides. Aesculus hipocastanum es un maravilloso remedio en la plétora abdominal. Se le encontrara indicado cuando hay pulsaciones profundas en el abdomen, particularmente en la región hipogástrica. Las hemorroides que pueden o no sangrar, van acompañadas de una sensación de resequedad en el recto, como si pequeñas astillas estuvieran pínchando los pliegues de la mucosa. Esta es la característica de Aesculus; también hay sensación de debilidad en la sínfisis sacro-ilíaca, como si el dorso estuviera a punto de ceder en este sitio.

Otro medicamento que deseo mencionar a este respecto, es Aloes; produce plétora abdominal y flatulencia, como Nux vom. y Sulphur, y hemorroides, como Nux vom., Sulphur, y Aesculus. pero difiere de éstos en que obra casi enteramente sobre el recto produciendo un catarro en la mucosa. Las evacuaciones intestinales van acompañadas de expulsión de gases; las hemorroides sobresalen como racimos de uvas y se mejoran mucho por aplicaciones de agua fría. Hay también una especie de inseguridad en el recto que se traduce por una sensación de como si los intestinos estuvieran a punto de evacuar. Aloes también cura una cefalalgia, que como la de Nux vomica, se sitúa sobre los ojos, va acompañada de una sensación de como si un peso obligara a bajar los párpados; y mejora por cerrar los ojos.

Collinsonia está indicado en las hemorroides cuando hay sensación de astillas en el recto. El estreñimiento es habitual; las molestias intestinales empeoran por la tarde y en la noche. Collinsonia es también útil en el prolapso uterino con hemorroides; está tan frecuentemente indicado en esta afección, como lo está Podophillum en el prolapso uterino con diarrea y prolapso rectal. Collinsonia tiene un síntoma parecido a otro característico de Opium; los escíbalos son

secos, pero difieren en que son de color claro.

Se recurre a Hamamelis para las hemorroides, cuando hay considerable hemorragia con visibles desolladuras en la parte afectada. El dorso se siente como si se quebrara.

Nux vomica puede ser empleado en la diarrea que sobreviene después de una borrachera. El enfermo se agrava generalmente por las mañanas; las evacuaciones son pulposas o aguadas y escasas, acompañadas de deseo urgente, lo que precisa el carácter de Nux vom. Tiene arqueos el enfermo por la mañana y tal vez vomite un poco de espuma o líquido agrio. Desea licor pero, naturalmente su estómago está tan irritable, que vomita el estimulante tan pronto como es tomado; tales enfermos parecen en una forma particular no aceptar la leche.

Podemos dar Nux vom. en la disentería, cuando hay frecuente e ineficaz urgencia de evacuar, cesando tan pronto como los intestinos funcionan. Las evacuaciones son sanguinolentas, viscosas, sueltas y escasas; el paciente empeora por la mañana. Nux vom. se indica para estos síntomas, sea que la enfermedad resulte del frío o que provenga de la suspensión de una secreción, como el sudor.

Mercurius difiere de Nux vom. en la disentería, en que en el primero, la necesidad urgente de evacuar no cesa con la evacuación, cualquiera que haya sido la facilidad para lograrla.

Otro medicamento análogo en la disentería es Aloes, que resulta útil cuando hay un dolor constrictivo en el epigastrio antes de evacuar, pareciéndose en esto muy estrechamente a Nux vomica; la evacuación consiste en sangre y moco, saliendo en masas gelatinosas. El retortijón puede cesar o no después de la evacuación. Además, puede ser expulsada una cantidad extraordinaria de moco.

Nux vom. es un valioso medicamento en la hernia; sea inguinal o umbilical. Está indicado, cuando al levantarse por la mañana, el paciente se queja de una sensación de debilidad en el abdomen, particularmente en la región inguinal, afectando especialmente el lado izquierdo.

Lycopodium puede usarse cuando la hernia inguinal radica en el lado derecho.

Cocculus indicus, puede aplicarse en la hernia umbilical, cuando Nux vom. ha fallado.

Vamos a estudiar ahora la acción de Nux vom. sobre los ojos, pues tiene indicación en muchas afecciones de éstos. Puede darse en la conjuntivitis ordinaria, particularmente cuando se empeora por la mañana; este período de agravación llega a ser tan bien marcado, que constituye un característico de la droga; hay aglutinación de los párpados y fotofobia a esta misma hora. En tratándose de un niño, hunde la cabeza en la almohada en las primeras horas del día y toda la mañana, en tanto que en la tarde mueve sus ojos libremente. Estos síntomas también pueden indicar a la droga en la oftalmía escrofulosa y en el blefarespano.

En estos padecimientos debe compararse con Euphrasia, que tiene la

aglutinación por la mañana, pero la fotofobia es producida especialmente por la luz artificial; el lacrimeo es profuso y acre, produciendo escozor en los párpados, mientras que en Nux vom. en los bordes de los párpados hay comezón y ardor sin lacrimeo.

En el espasmo de los párpados, Agaricus es generalmente el mejor remedio; pero deberá consultarse también Belladonna, Natrum mur., Euphrasia, Pulsatilla, etc.

Nux vom. puede indicarse también cuando los tejidos más profundos del ojo están complicados; por ejemplo, en la terrible enfermedad de la atrofia de la retina sea que venga de una corio-retinitis o no. Lo encontramos también indicado en otro estado de la retina llamado hiperestesia retiniana; está indicado por la intolerancia a la luz agravada por la mañana; al menor intento de mover los ojos se producen intensos dolores y movimientos espasmódicos de los músculos oculares; puede haber juntamente con esto, lacrimeo escoriante y dolores frecuentes en la coronilla de la cabeza.

En la ambliopía o en los trastornos visuales debidos a los efectos de la intoxicación por el tabaco, los licores o cualquier otro vicio, ningún remedio será mejor para restablecer el funcionamiento del nervio óptico debilitado. Aún cuando la atrofia haya comenzado, Nux vom. aliviará por lo menos si no verifica una curación completa.

Otro padecimiento en el que se encuentra indicado Nux vom., es en las equímosis de la esclerótica cuando hay cierta cantidad de sangre extravasada en la cara profunda de la conjuntiva, resultando esto por el libertinaje, por desvelarse estudiando o en las personas afectadas de dispepsia.

Si las equimosis son de origen traumático, deberá consultarse Ledum, Arnica y Hamamelis.

Hablemos ahora de Nux vom. en los catarros. Se acomoda a los estados iniciales del coriza ordinario, particularmente cuando ha sido causado por una temperatura fría y seca, o por sentarse en lugares fríos, por ejemplo, una escalera de piedra; la molestia va asociada a estornudos, atracamiento de la nariz por la noche y en el aire libre; con escurrimiento fluído en una habitación caliente y durante el día; hay lacrimeo ocular y sensación de desolladura y arañamiento en la garganta; los síntomas van asociados a un adolorimiento en todo el cuerpo y escalofrío que se produce por el movimiento, aún cuando el enfermo esté bien arropado en su cama.

La desolladura de Nux vom. difiere de la de Mercurius; ésta no es una sensación de avivamiento dolorosa, como si la piel fuera levantada, sino de una aspereza ruda. Mercurius es útil en el coriza con sensación de desolladura y dolor en la nariz y garganta, con agravación por el tiempo húmedo.

Pulsatilla es el remedio para el "catarro maduro" en que el escurrimiento es verde y blando. Administrada en el comienzo, generalmente agrava el caso. He encontrado que Phosphorus le sigue bien, cuando a pesar del uso de Nux vom., el proceso catarral se extiende al pecho.

Hay una epistaxis curable por Nux vom., que se presenta en personas de temperamento hemorroidario y es ordinariamente precedida de dolor de cabeza, con mejillas rojas Generalmente sobreviene en la noche durante el sueño, aunque puede ocurrir a cualquiera hora.

Nux vom. puede también ser empleado en el catarro de la trompa de Eustaquio; hay escozor a lo largo de la trompa, incitando al paciente a deglutir con frecuencia.

Se encontrarán a veces síntomas en la boca, que hagan pensar en Nux vom. como en el medicamento indicado. Se forman úlceras sobre los labios acompañadas de ardor y picazón; pueden también aparecer sobre las encías. La estomacase a de Nux vomica es de origen gástrico.

La tos no es un síntoma prominente de Nux vom. Puede ser empleado cuando es de origen nervioso; por ejemplo, en la tos provocada por el trabajo mental. Puede ser usado también en la tos de origen gástrico; el paciente tose después de comer y por la mañana; hay generalmente cefalalgia e irritación gástrica o intestinal.

En las enfermedades del pecho no encontramos a Nux vom. frecuentemente indicado. Es útil algunas veces en el asma; este padecimiento ordinariamente no es esencialmente nervioso, sino que proviene de desórdenes gástricos. Va asociado de una sensación de plenitud y opresión en el estómago, particularmente manifiesta después de una comida suculenta, teniendo el enfermo necesidad de aflojarse las ropas, con el fin de obtener mejoría. El abdomen está distendido por los gases. Los síntomas asmáticos empeoran después de un alimento, después de media noche, en la mañana y casi siempre por el aire frío o cualquier ejercicio, particularmente por ascender a alguna altura. El eructo mejora. Hay un medicamento análogo a Nux vomica, que a menudo es menospreciado por los médicos de nuestra escuela y es Zingiber. Zingiber o gengibre, a condición de no ser dado muy frecuentemente, tiene efectos tónicos sobre el estómago. No es un alimento apropiado para los niños y para aquellas personas que tengan alguna afección renal; favorece más bien el desarrollo del mal de Bright. Como medicamento, puede emplearse Zingiber en el asma de origen gástrico. El ataque sobreviene en la noche hacia el amanecer. El enfermo tiene que incorporarse para respirar; a pesar de la intensidad de los paroxismos, parece no tener ansiedad.

Carbo veg. y Lycopodium son semejantes a Nux vom. en el asma, producido por irritación abdominal con marcada flatulencia.

En la hemoptisis está indicado Nux vomica cuando aparece a consecuencia del alcoholismo; se presenta generalmente después de una borrachera o de alguna violenta emoción, como un coraje, pero también puede resultar de la supresión del flujo hemorroidal.

Nux vom. es un medicamento útil en las afecciones de los órganos génitourinarios. Está indicado en el cólico nefrítico, cuando uno de los riñones, generalmente el derecho, es asiento de la enfermedad. Los

dolores se extienden a los órganos genitales y bajan a los muslos; generalmente van asociados de intenso dolor de espalda. En esto necesitamos diferenciar a Nux vom. de Lycopodium, Cantharis, Belladonna y Berberis.

Lycopodium, como Nux vomica, generalmente afecta el lado derecho, pero los dolores se extienden a lo largo del uréter y terminan en la vejiga; no descienden hasta los muslos; el dolor de espalda es mejorado por la micción. Puede ser los muslos; el dolor de espalda es mejorado por la micción. Puede ser dado después de Nux vomica.

Uno de los mejores remedios para los paroxismos del cólico nefrítico es Cantharis, que mejora al paciente disminuyendo la irritación local y permitiendo así el paso del cálculo, con menos sufrimientos.

Belladonna es otro medicamento para los cálculos biliares; los dolores son punzantes y de carácter agudo; difieren de los de Nux vom. en el hecho de que se presentan repentinamente e irradian en direcciones diversas, partiendo del punto central de irritación. El enfermo se pone febricitante y excitable. Belladonna modifica la contracción espasmódica producida por la presencia del cálculo y permite su paso con más libertad.

Berberis vulgaris es un excelente remedio para los cálculos renales; los dolores son de carácter punzante. El enfermo no puede hacer el más ligero movimiento y necesita permanecer sentado y doblarse sobre el lado dolorido para obtener mejoría. Si además, se queja de dolores agudos como producidos por dardos, que siguen la dirección del uréter y se propagan a los muslos, no hay ningún medicamento como Berberis. Se encuentra en la orina un depósito rojizo, constituido por moco, epitelios y uratos amorfos. Berberis algunas veces produce cálculos biliares asociados a los nefríticos; Belladonna es también útil en la colelitiasis. Pero el remedio para curar en forma permanente la litiasis biliar, es Cinchona. Ha sido altamente recomendado por el Dr. Thayer de Boston, a menos que algunos otros síntomas reclamen en una forma clara otros medicamentos, hay que imponer al paciente el uso de la Cinchona, continuado por algunos meses.

En el paso de los cálculos biliares, cuando los medicamentos no producen mejoría, encuentro que el éter es bueno, tanto al interior como al exterior, obrando mejor que el cloroformo.

Encontramos a Nux vom. indicado en la hematuria, cuando se atribuye a la misma causa que la hemoptisis antes descrita, llamada "de libertinaje".

La Nux vom. también se indica en las afecciones de la vejiga, principalmente en la estranguria acompañada de dolorosa urgencia para orinar; dejando pasar solamente unas cuantas gotas, que escaldan, producen ardor y otras sensaciones molestas; esta misma urgencia la hay también para evacuar el intestino.

En la gonorrea Nux vom. es útil después del abuso de la Cubeba y la Copaiva, cuando el flujo es delgado. Algunas veces he notado que

después de que la gonorrea ha sido curada, en lo que concierne al flujo, el paciente, sin embargo, se queja de irritación en la parte posterior de la uretra, probablemente en la próstata, produciéndole una sensación de incomodidad, que el paciente refiere a la raíz del pene. Nux vomica frecuentemente modifica esta situación .

Es útil en los excesos sexuales, especialmente en los resultados de una masturbación precoz. Es uno de los remedios usados en estos casos desde los tiempos de Hahnemann. Este grupo de medicamentos está formado por Nux vom., Sulphur, Calcarea carb. y Lycopodium.

Nux vomica debe darse cuando el paciente tiene cefalalgia, frecuentes emisiones nocturnas involuntarias, especialmente hacia el amanecer; se queja de dolor de espalda y dificultad para caminar; no debe repetirse esta medicina muy a menudo; y cuando la mejoría deja sentirse con Nux vomica, Sulphur será casi siempre el siguiente medicamento indicado.

Calcarea carb. sigue generalmente a Nux vom. y a Sulphur, particularmente cuando los sudores nocturnos siguen a las emisiones nocturnas; o después del casamiento, si cada coito es seguido de debilidad mental y corporal.

Lycopodium está indicado también después, cuando el caso ha avanzado hasta la impotencia completa. No hay erecciones o son imperfectas. Los genitales están fríos y flácidos.

Staphysagria es de utilidad para los malos efectos de la masturbación, particularmente si hay gran extenuación, con círculos obscuro alrededor de los ojos, cara cetrina y un mal humor bien marcado, acompañado de timidez.

Hay todavía otro medicamento que deseo citar para este estado y es Cobalt. Es excelente para el dolor en la región lumbar que sigue a las emisiones seminales, sean involuntarias o no; empeora de un modo particular mientras el enfermo permanece sentado.

Nux vom., está indicado en una variedad de enfermedades de los órganos sexuales femeninos. Nos encontramos que ha producido, y que puede curar, el prolapso uterino. Debe emplearse cuando la enfermedad es de origen reciente y es resultado de una torsión Violenta del cuerpo. Estos síntomas van asociados frecuentemente al estreñimiento característico de ineficaz urgencia de evacuar. Si Nux vom., no cura completamente, el mejor remedio que siga será Sepia.

La menstruación, bajo la acción de Nux vom., es casi siempre abundante, generalmente de color obscuro y acompañada de arqueadas y calambres abdominales. La enferma tiene con frecuencia desmayos en la época de la menstruación, especialmente cuando permanece en una pieza caliente.

Durante el embarazo Nux vómica es un medicamento útil para las molestias que se presentan por la mañana; la enferma se levanta sintiéndose atormentada y molesta del estómago. Predominan las arqueadas sobre el vómito; en estos casos se puede esperar mucho de Nux vómica. Puede haber también ictericia. La piel tiene un color

cetrino; hay constipación intestinal y el apetito está perdido. más aún, la enferma se queja de una gran presión hacia arriba, como si esto si esto la impidiera respirar.

Durante el parto, Nux vómica es el medicamento cuando el estreñimiento lo indica. Los dolores pueden ser espasmódicos e intensos. La mujer tiene deseos constantes de orinar y defecar; estos síntomas, cuando Nux vom., es el remedio indicado, no son debidos a una causa mecánica, como la presión que ejerce la cabeza del feto, sino de origen puramente reflejo. Frecuentemente se encontrarán desmayos durante los dolores; o éstos empiezan en la espalda y de ahí descienden a los glúteos y a los muslos. Podemos también dar Nux vómica cuando los dolores del parto cesan enteramente o en parte, exactamente como sucede en Pulsatilla, el temperamento de la paciente nos capacitará para decidir entre los dos medicamentos.

Nux vom., es a menudo útil para evitar el retorno de la metrorragia que precede a la menopausia, o durante el parto. Hay urgencia para evacuar, desmayo y los demás síntomas ya mencionados.

Ahora vamos a tratar de la acción de Nux vómica sobre la médula espinal; produce, como hemos visto al hablar de Estricnina, irritación de los centros motores y nervios eferentes. El dolor del dorso aliviado por Nux vómica, está localizado en la región lumbar; generalmente empeora por la noche cuando el enfermo se acuesta en su cama; no puede voltearse sin sentarse antes; es por lo tanto útil en el lumbago; mientras más tiempo permanece acostado en la mañana, más le duele la espalda. Picricum acid. debe ser aquí mencionado; conocido químicamente con el nombre de trinitrofenol, es un veneno violento; hay que pensar en él cuando después de cada esfuerzo mental considerable, el enfermo sufre de intensa cefalalgia de carácter pulsatil, localizada en la base del cerebro; hay a menudo una congestión medular concomitante, con aumento de excitación sexual, de tal manera que las erecciones llegan a ser tan pertinaces, que pueden catalogarse dentro del priapismo.

Nux vom., está indicado en la tortícolis que proviene de un resfrío o de una afección medular. Belladonna es el mejor remedio para la tiesura del cuello de origen reumático o por el frío. La rigidez propende a localizarse sobre el lado izquierdo.

Causticum producen tiesura del músculo esterno-cleidomastoideo derecho, con tirantez. La tortícolis puede ser debida a debilidad paralítica, como sucede en las afecciones que invaden el undécimo par craneano. Agaricus y Lachnanthes deben ser también comparados en estos casos.

En la irritación espinal deberá usarse Nux vómica, cuando el dolor de espalda antes descrito, esté presente, acompañado de los siguientes síntomas : repentina pérdida de la fuerza en las piernas, por la mañana; las manos y pies se duermen fácilmente; rigidez y tensión en el hueco poplíteo; la ropa se siente muy ajustada en la cintura; sensación como de una banda a este nivel; deseo de acostarse; adormecimiento y hormigueo a lo largo de la espina y en

las extremidades. Estos síntomas también indican a Nux vom. En la mielitis y en las primeras etapas de la ataxia locomotriz especialmente cuando las molestias se han presentado por la exposición al frío o por los excesos sexuales.

Phosphorus es en muchos aspectos muy semejante a Nux vómica; ambos producen aumento de la impresionabilidad; los dos ocasionan anemia espinal. Pero Phosphorus tiende a producir la parálisis completa. Nux vom., generalmente produce parálisis parcial que depende del agotamiento; los dos han probado su utilidad en el reblandecimiento espinal.

Physostigma tiene una sintomatología casi típica de la irritación espinal; bajo su acción, todos los nervios de origen espinal son irritados. La presión de un dedo entre dos vértebras hace al paciente saltar. Physostigma produce rigidez de los músculos por irritación meningea. Finalmente produce trismus y tétanos.

Ambra grisea, como Nux vom., se adapta a sujetos nerviosos, delgados "que se secan rápidamente"; tiene marcado adormecimiento de la piel; varias partes del cuerpo se duermen fácilmente. Hay también tiesura en la cintura después de haber estado sentado y tensión en los músculos lumbares, que empeora al despertar. Aún el escroto y pene se sienten entumecidos. Cuando tales pacientes se quejan de estos síntomas son propensos a ser excesivamente nerviosos y débiles. En las reuniones se aturden fácilmente, hablan y actuan de un modo precipitado. Son impulsados por su nerviosidad a hablar impetuosamente, pero pronto se cansan. (como en Cocculus, Veratrum... album, Calcarea ostrearum, Alumina, Sulphur y Kali carb.) La conversación y el ejercicio, rápidamente les fatigan.

Asarum europeum responde a otro género de nerviosidad, se adapta especialmente a mujeres irritables que son tan excesivamennte sensibles que el solo pensamiento de que cualquiera persona frotara una seda ú otro ruido semejante, produce agravación de sus síntomas.

Castoreum está indicado cuando las mujeres son nerviosas y no reaccionan después de las enfermedades. De ahí que puede usarse después de la fiebre tifoidea, especialmente cuando las enfermas están sujetas a dolores de cabeza, muy sensible al tacto. Estos síntomas van acompañados de sensación de hormigueo y reptación que se mejoran por el sueño.

Nux vom, es útil en el reumatismo, cuando afecta las articulaciones más grandes y los músculos. Está indicado especialmente en el reumatismo del tronco. La hincházón de las articulaciones es generalmente pálida. Los síntomas siempre se empeoran por la mañana.

Nux vom, ha sido recomendado para el acné de los bebedores y también para el que resulta de comer mucho queso; estreñimiento que produce este abuso, es curado por Colocynthis.

Debe preferirse a Sulphur cuando existen estos otros síntomas : la cara está roja y con ronchas; a Ledum cuando hay ronchas rojas y

granos que producen ardor por el más leve tacto. Kreosotum y Lachesis también deben ser comparados con Nux vom en estos estados.

El reblandecimiento cerebral puede ser prevenido por Nux vomica. Es particularmente el remedio en el que se debe pensar cuando los hábitos sedentarios o los esfuerzos mentales y también la intemperancia, han producido la enfermedad. Especialmente en las personas que han llevado una vida demasiado regalada. La memoria es inconstante; el dolor de cabeza sobreviene por cada intento de trabajo mental. Hay vértigo al despertarse por la mañana y su marcha es vacilante.

Estudiaremos ahora a Nux vom., en la fiebre tifoidea. La selección de Nux vomica será inspirada en tales casos por los síntomas gástricos y biliosos, sabor amargo de la boca, especialmente en la mañana, vomitos biliosos y la constipación característica. La debilidad que necesariamente acompaña al estado tifoideo, se manifiesta bajo la acción de Nux vomica, por una muy marcada tendencia a acostarse. Las noches se pasan nerviosamente, con sueño excitado; los más ligeros ruidos hacen estremecer al enfermo. Puede presentarse el delirio.

Nux vom., es útil en los tipos de fiebre intermitente, cuando el escalofrío es precedido o acompañado de un color azuloso en las uñas de las manos; los bostezos son notables; también hay siempre dolorimiento en la espalda y en las piernas, que es seguido por la fiebre y los sudores. Durante la apirexia hay síntomas gástricos y biliosos prominentes.

Una particularidad de Nux vom digna de ser notada, es que parece intensificar la acción de Sepia. La misma relación existe entre Sepia y Lilium tigrinum y entre Sulphur y Mercurius. Nux vom es antagónico de Zincum.

El paciente de Nux vom se siente mejor después de un sueño ininterrumpido. Guiado por este síntoma el Dr. P.P. Wells, curó a el Dr. Dunham, de difteria con Nux vom.; un síntoma característico del caso, era la marcada mejoría después de la siesta. Cuando el sueño es interrumpido, el enfermo de Nux vom empeora siempre. A buena hora de la tarde se siente irresistiblemente soñoliento.

Nux vom obra mejor administrándola por la tarde. Según Hahnemann, las personas sensibles no deberían tomarla en ayunas, en la mañana o en su primer despertar, porque sus poderosos síntomas se harían manifiestos. No debería ser tomada inmediatamente antes o después de las comidas o cuando la mente está ocupada.

Ignatia amara

Ignatia amara, o, más propiamente hablando, Strichnos ignatia, es un arbusto que crece en las Islas Filipinas y la Cochinchina. Su fruto es esférico u ovoide y como de cuatro pulgadas de diámetro. Su

cáscara es lisa y frágil y encierra de veinte a treinta semillas. Su nombre es atribuido a los jesuitas que la llamaron Haba de San Ignacio en honor a sus virtudes, aúnque química y botánicamente es semejante a Nux vom., Ignatia difiere materialmente de esa droga en su sintomatología, a pesar de sus cercanas semejanzas de familia.

Ignatia es eminentemente un medicamento espinal, como también lo es Nux vom. Como Nux vom., parece intensificar la impresionabilidad de todos los sentidos, quizá en grado más alto de lo que lo hace Nux vom. Bajo la acción de Nux vom., sin embargo, esta sobre excitabilidad es manifestada por la cólera, la vehemencia y la irascibilidad; en Ignatia se manifiesta por melancolia con tendencia al llanto. Ahora, mientras existe este temperamento lloroso melancolíco, sin embargo, el paciente oculta su pesar. El enfermo de Ignatia mantiene sus pesares ocultos a los que le rodean, en tanto que el de Nux vom es vehemente, contradice a cualquiera que se la pueda oponer, es tan, insoportable, que difícilmente se puede vivir con él. Se debe separar este temperamento melancólico de Ignatia del de Pulsatilla. La paciente de Pulsatilla está llorosa, triste y melancolica como la de Ignatia, pero no hay ese modo introspectivo que se desarrolla en la paciente de Ignatia. Hace que su aflicción sea conocida por todos los que se acercan a ella; busca la simpatía; es tímida y complaciente en su disposición.

Encontramos a Ignatia indicado en las mujeres nerviosas que son agobiadas por los pesares, especialmente cuando tienen un origen reciente y muy particularmente cuando son secretos. Tales casos encuentran mejoría en Ignatia si no son muy antiguos.

Para los efectos de pesares crónicos o constantes, tenemos a Phosphoricum ac. y a Natrum mur. A menudo, cuando el primer medicamento está indicado, la enferma se queja de sudores nocturnos, sin ninguna enfermedad orgánica, sino exclusivamente por agotamiento. Tiene poco o ningún apetito; se queja de una sensación de como si un peso comprimiera el vértice de su cabeza; como si soportara un gran peso. La extenuación, el tedio y los sudores nocturnos son síntomas característicos.

En algunos casos los síntomas son de tal manera que pueden hacer preferible Phosphorus a Phosphoricum acid.

Natrum mur., es muy semejante a Ignatia en su estado mental, pero hay más irascibilidad y melancolía; el consuelo agrava y despierta enojosa contrariedad; hay cefalalgía en el vértice, extenuación y palpitación trémula por cualquier ruido extraño. Cuando Ignatia falla no quitando completamente los síntomas, Natrum mur completa la curación.

Encontramos a Ignatia útil para los malos efectos de un pesar y también por razón de su gran sensibilidad a las impresiones externas, que produce en más alto grado que Nux vom.; está indicada en la histeria, especialmente cuando la enferma alternativamente ríe y llora, o en otras palabras, exhibe su modo cambiante. La cara se sonroja por cualquiera emoción. Algunas veces la risa llega a ser

espasmódica y termina con gritos y aún con espasmos del pecho, con el rostro azulado. También hay globo histérico o sensación de como si una bola fuera subiendo a la garganta. Esta es mejorada por el eructo, mientras que el beber agua produce agravación de la acción convulsiva en la garganta. La paciente puede caer en un estado de semi-inconsciencia, con los pulgares contraidos y la cara azulosa, como sucede bajo la acción de Cuprum. Finalmente, un suspiro y una prolongada respiración, anuncian el retorno a la consciencia. Ahora vamos a considerar algunos de los medicamentos concordantes de Ignatia, en los estados histéricos.

Platina está indicado en las mujeres histéricas con manía violenta y notable modo altanero.

Hyosciamus es utilizado cuando el estado mental del paciente exhibe una marcada tendencia a los celos. La paciente está llena de sospechas. Teme ser envenenada y debido a esto rehusa todo alimento y medicinas.

Asafoetida como Ignatia, tiene globo histérico, acumulación de gases en el abdomen, que, comprimiendo los pulmones estorba la respiración. Es especialmente útil en las convulsiones histéricas, después de la supresión de las secreciones.

Moschus se adapta particularmente cuando el paciente se desmaya con facilidad; se sienta a la mesa y experimenta un desmayo de muerte al tomar aún la más pequeña cantidad de alimento. También tiene espasmos violentos del pecho, durante los cuales parece que va a morir. La cara se pone azulosa y hay espuma en la boca; es propenso a querellar y aun esto le produce desmayo.

Valeriana es útil en esta clase de enfermas histéricas, cuando el ejercicio les produce violentas cefalalgias. Frecuentemente se quejan de una sensación de como si una cuerda estuviera colgando en la garganta. Ya cerca de la noche tienen tendencia a los bochornos. El más leve dolor les produce desmayos. Se quejan de una sensación de calor que sube del estómago a la garganta, acompañado de globo histérico. A menudo se tendrá que hacer uso de Valeriana para los dolores de los miembros, especialmente los inferiores, que simulan reumatismo. Empeoran mientras la enferma está sentada y mejoran por caminar.

Cocculus tiene modalidad algo semejante a la de Ignatia: sensibilidad, ansiedad, mirada temerosa, pérdida de la memoria, confusión mental, vertigo, espasmos uterinos gran debilidad y náusea que favorecen el desmayo. Una especie de estado semi-paralítico invade todo el cuerpo; constricción sofocante en la parte más elevada de las fauces, con respiración dificultosa; parálisis histérica.

Los síntomas en Cocculus, son generalmente resultado de un desvelo o de la pérdida del sueño.

Nux moschata está indicado en la histeria acompañada de frecuentes cambios emocionales y enorme distensión del abdomen después del más ligero alimento. La enferma se queja de una abrumadora somnolencia y de una excesiva resequedad de la boca, aún cuando

haya humedad normal. Hay también marcada tendencia al desmayo.

Belladonna está indicado en los estados histéricos, cuando la paciente está turbulenta e indómita, con cara roja, etc.

Yo he empleado el Valerianato de zinc para un síntoma común en las enfermas histéricas y pacientes generalmente nerviosos, y es la agitación e inquietud. No pueden estar sosegados y necesitan tener sus piernas en constante movimiento; no recuerdo que haya fallado en un solo caso. Esta inquietud de los pies no es un síntoma poco común en los casos antiguos de afecciones uterinas; generalmente doy el medicamento a la segunda o tercera potencia.

La cefalalgia de Ignatia está generalmente situada en un punto de la cabeza, justamente como si en ese sitio hubiera sido introducido un clavo. Cualquier trabajo mental insignificante, o que sea más molesto e intenso que el de costumbre, cualquier olor fuerte, sea a no agradable, cualquiera emoción, que toleraria sin molestias una persona cuyo sistema nervioso fuera normal, le producirá dolores de cabeza. El ataque generalmente termina con vómito; estas cefalalgias son con frecuencia periódicas presentándose cada dos días. A menudo terminan con la emisión copiosa de orina muy clara.

Varios medicamentos tienen cefalalgia que mejora por la micción copiosa : Aconitum, Gelsemium, Kalmia, Melilotus, Sanguinaria, Silicea y Veratrum album. Algunas veces la cefalalgia de Ignatia es de carácter pulsatil; radica en los ojos, en las cejas y la raíz de la nariz, se mejora por momentos con el cambio de posición. Otras veces puede estar indicado en la cefalalgia, cuando la cabeza se siente pesada, como congestionada y sin embargo, el dolor mejora por inclinarse hacia adelante; algunas veces la agravación se presenta por doblarse, dándonos así lo que Hahnemann llama "efecto alternante". La cefalalgia de Ignatia se agrava por la conversacion, por escuchar con atención o por tomar café.

El poder de Ignatia produciendo aumento de la excitabilidad la hace útil en los espasmos, no sólo de origen histerico, sino también en las mujeres delicadas no histéricas y en los niños. Los espasmos son despertados por las emociones, tales como el espanto o el temor. Por ejemplo: el niño presenta convulsiones después de ser castigado. Cuando duerme, solloza. En circunstancias ordinarias, el niño pasaría estas molestías sin ningún tratamiento; pero si es extremadamente delicado o si estos fenómenos ocurren durante el período de la dentición, o si hay temor de que se presenten las convulsiones o el hidrocéfalo, Ignatia puede prevenir muchos males. Durante las convulsiones en las que Ignatia es el medicamento apropiado, generalmente se encuentra la cara con palidez de muerte, aunque a veces puede estar sonrojada. Hay contracciones de músculos aislados, particularmente de los orbicularse de los párpados y de la boca y el niño se pone rígido. Como dije antes, Ignatia está indicado especialmente cuando las convulsiones aparecen después de un temor, un susto o alguna emoción violenta.

Las mujeres nerviosas pueden necesitar de Ignatia durante el parto

en los espasmos; éstos deben ser distinguidos de los que produce Belladonna, Stramonium, etc., por la ausencia de fiebre o congestión intensa, y de Hyosciamus, por la falta de inconsciencia o manía.

Es estas convulsiones producidas por las emociones, a menos que hayamos distinguido claramente las particularidades de los diversos medicamentos, no se podrá obtener la curación tan pronto como se quisiera. Opium como Ignatia, es un medicamento para los efectos inmediatos de las emociones; siendo de poca o ninguna utilidad en los efectos tardíos; también empeora después de un castigo, susto o temor; el cuerpo se pone rígido y la boca y los músculos faciales se contraen. En estos detalles es bastante parecido a Ignatia. la diferencia consiste en las siguientes particularidades : en Opium la cara está rojo-obscura y abotagada y los espasmos frecuentemente van asociados a fuertes gritos más frecuentemente de lo que sucede en Ignatia.

Glonoinum produce repentinas y violentas congestiones de la cabeza, como sucede en Opium. Como Opium e Ignatia, puede ser empleado para los efectos repentinos de las emociones violentas; en las convulsiones, los dedos de las manos están separados y extendidos, síntoma que también se encuentra en Secale.

Veratrum album es adaptable a las convulsiones que se presentan con motivo de las emociones violentas y repentinas, pero la cará esta fría y azulosa, con sudor frío en la frente.

Hyosciamus tiene sacudidas y contracciones musculares violentas, más notables que Ignatia; un brazo se contraerá, después el otro; todos los movimientos son angulares; hay mucha espuma en la boca. El enfermo parece estar rabioso.

Belladonna parece estar indicado con más frecuencia que cualquier otro medicamento en las convulsiones consecutivas a las emociones violentas, cólera, etc.; la cara es de un rojo encendido, la mirada fiera y forzada, la cabeza caliente, y hay espasmos de la glotis.

Opium es probablemente el mejor remedio, cuando por un susto de la nodriza, el niño tiene retención de la orina.

Cuprum está indicado en las convulsiones, cuando las manos se empuñan; hay un color azulino notable en la cara y en la boca; cualquier intento para deglutir produce gorgoteo en a garganta.

Chamomilla es útil en las convulsiones de los niños después de alguna emoción. Fácilmente se distingue de Ignatia por la disposición petulante y corajuda del niño. Una mejilla está roja y la otra pálida, hay sudor caliente en la cara y cabeza.

Hay un dolor de garganta curable por Ignatia; el paciente se queja de una sensación de como si tuviera un tapón, que empeora cuando no deglute; examinando las tonsilas se encuentran salpicadas de pequeñas úlceras superficiales de color blanco amarillento; hay una sensación de constricción en la garganta, con gran nerviosidad e insomnio.

La tos de Ignatia proviene de la constricción de la laringe o de una sensación como si una pluma estuviera en la misma; mientras más

tose el paciente, empeora el cosquilleo.

Ignatia puede ser usado en la fiebre intermitente, cuando hay sed durante el escalofrío y cuando el calor de la estufa u otro calor artificial lo mejora. Este no es un síntoma comun; es muy diferente de lo que sucede en Nux vom. en el que generalmente no se encuentra mejoría por arroparse, ni por el calor de la estufa. Capsicum tiene mejoría por la aplicación de bolsas de agua caliente. Lachesis, deseo vehemente del calor del fuego, sin ambargo, el escalofrío no se abrevia con esto. En Arsenicum el escalofrío mejora por el calor moderado. Otros medicamentos que pueden ser comparados en este caso son : Rhus tox., Menyanthes, Nux moscata y Sabadilla.

La acción de Ignatia sobre los órganos genitales, debe ser mencionada también y la encontramos indicada en la dismenorrea, asociada a lo que se llama cólico menstrual, cuando hay gran pesantez en la región hipogástrica. La enferma presenta síntomas histéricos; los dolores son semejantes a los de parto y aparentemente mejoran por la presión, por acostarse o por cambiar de posición. Los menstruos son obscuros, frecuentes y abundantes.

El medicamento más parecido a Ignatia en esto, es Cocculus indicus. Produce espasmos uterinos y flujos menstruales obscuros, pero el dolor de espalda permitirá establecer la diferencia entre estas drogas. Hay una sensación de debilitamiento en la cintura, como si la enferma estuviera a punto de sufrir una parálisis. Los miembros, especialmente los inferiores, tiemblan cuando intenta caminar. Además, la paciente se queja frecuentemente de una sensación de vacío en varias cavidades del cuerpo, especialmente en el pecho y el abdomen.

Pulsatilla está a veces indicado en el cólico menstrual, particularmente cuando los menstruos son tardíos y de color obscuro; el flujo es generalmente caprichoso; la paciente es propensa a los escalofríos; mientras más intensos son los dolores, más escalofrío experimenta.

Chamomilla es la tercera droga semejante a Ignatia en los espasmos uterinos. Debe indicarse de acuerdo con sus síntomas mentales; la paciente está tan malhumorada, que difícilmente puede contestar cortesmente, cuando se le interroga.

Me agradaría recordar también a Magnesia muriática que está indicada en los espasmos uterinos acompañados de induración uterina, sea o no de naturaleza escirrosa.

Actea racemosa es útil en los espasmos uterinos, cuando los dolores cruzan el hipogastrio de una lado a otro.

En los desórdenes de la digestión Ignatia es de utilidad, cuando la enferma se queja de un sabor amargo y acre en la boca, mucosidades y salivación copiosa; hay imaginación caprichosa y aversión por ciertos alimentos. Pide un antojo, pero después de saborearlo lo rehusa. El alimento puede ser regurgitado. Hay gastralgia. La paciente tiene hipo que se agrava por comer o fumar y

en los niños, especialmente por las emociones. Hay una sensación de vacío en el epigastrio con náusea; en algunos casos hay arqueadas en vacío que mejoran por comer. El enfermo vomita en la noche los alimentos tomados por la tarde. Los intestinos están en disfunción.

Hyoscuamus en uno de nuestros mejores medicamentos para el hipo que se presenta después de las operaciones de vientre; Stramonium y Veratrum album, después de las babidas calientes; y Arsenicum y Pulsatilla después de las bebidas frías.

Teucrium marum verum es de utilidad en el hipo que se presenta por sacudidas después de mamar. Cajaputum se adapta al hipo que por la más ligera provocación. (Sulphuric. acid). Hay constricción espasmódica del esófago y la lengua se siente hinchada; también hay flatulencia.

Amonium mur. se caracteriza por el hipo acompañado de dolores punzantes en el pecho y en el estómago, sensación de vacío y de roedura después de una abundante comida.

Ignatia es útil en el prolapso del recto, pudiendo ir o no acompañado de hemorroides. Tiene como síntoma característico, violentos dolores, como producidos por puñaladas. Este prolapso molesta al paciente aún cuando haya evacuaciones blandas. Hay constricción anal, angustia, que se agrava después de la evacuación y mejora mientras el paciente está sentado; comezón y hormigueo en el ano, como producido por ascárides; en tales casos, Ignatia es un excelente remedio.

Se dice que Indigo es un magnífico medicamento para los ascárides, especialmente en los niños meláncolicos. La miel de abejas dada en las mañanas y en las noches, obrará como paliativo. Debe pensarse en Teucrium en estos casos.

Ignatia produce una variedad de síntomas que se refieren a los ojos, siendo útil en algunos de sus padecimientos. Como Agaricus, tiene pestañeo; también tiene acción espasmódica sobre los músculos faciales. Hay dolores neurálgicos en torno de los ojos, son notablemente intensos y frecuentemente se asocian al globo histérico.

Ignatia puede también ser de utilidad en la oftalmia flictenular, cuando hay intensa fotofobia y una sensación como de arena en los ojos.

La odontalgía que cura Ignatia empeora en los intervalos de la comida, esto está en perfecta armonía con los síntomas de la garganta que produce este medicamento; esto es, hay una sensación de un cuerpo extraño en la misma, que no se siente durante, sino entre los actos de la deglución; puede sentirse irritación en el momento de deglutir, pero ésta es más marcada en el intervalo de las degluciones. Este síntoma ha conducido a la selección de Ignatia en las lesiones aftosas de la garganta (estando las amígdalas hinchadas y cubiertas de placas blancas y planas). y también en la difteria.

Zincum tiene una relación muy especial con Ignatia y Nux vóm.;

sigue bien a Ignatia, en tanto que Nux vóm., es su antagonico.
Natrum mur. sigue bien a Ignatia, especialmente en las afecciones mentales.

Curare

El Curare obra sobre las terminaciones nerviosas periféricas; por este motivo produce la abolición del movimiento, sin ningún trastorno de la sensibilidad. Tomado al interior, provoca síntomas violentos, vértigo repentino asociado a una gran debilidad de las piernas, seguido tarde o temprano de vómitos biliosos.
Hace algún tiempo atendía un enfermo atacado de cirrosis hepática. Todas las mañanas, entre las diez y las once tenía vómitos biliosos precedidos de un escalofrío. Nada parecía corregir estos síntomas, pero como tenía la sensación vertiginosa que hace poco mencioné, le di Curare a la 500a, y los vómitos, que habían durado dos o tres semanas se detuvieron. El enfermo vivió todavía dos o tres mesés.
El Dr. Pitet, de París, recomienda Curare para la disnea causada por el enfisema cuando el paciente parece estar muy grave. La administra el medicamento a la 3a. y a la 6a. dilución.
Estrechamente ligados a Nux vóm. y al tipo de remedios que estudiaremos en la próxima conferencia hay ciertos medicamentos derivados de la clase de las Juglandáceas.
Dd juglandaceas
Todas las Juglandáceas parecen producir un estado especial en la sangre consistente en que este líquido se vuelve obscuro, color de brea.
Las juglandáceas producen hemorragias.
Juglans regia o nuez, presta utilidad en las reglas demasiado precoces constituídas exclusivamente por coágulos negros.
Todas las Juglandáceas producen erupciones cutáneas. La más importante de esta variedad para este caso, es Juglans cinérea, también llamada Juglans cathartica.
Juglans cinérea es uno de nuestros mejores medicamentos en la cefalalgia occipital; los dolores son de carácter agudo y lancinante; con este síntoma, podemos hacer uso del medicamento en las afecciones cerebrales y de la médula.
Juglans cinérea produce también ictericia, en el mismo grado que Nux vómica, con dolores punzantes en el hígado, dolores bajo el hombro derecho (igual que Chelidonium y Bryonía); el paciente despierta a las tres de la mañana y no puede ya dormir; con frecuencia estos síntomas van asociados a la cefalalgia occipital ya mencionada. Las evacuaciones son biliosas o de un verde amarillento con ardor en el ano y tenesmo.
En la hidropesía del tórax, Juglans cinérea presta utilidad cuando hay manchas rojas sobre la piel, muy semejantes a los piquetes de pulga.
Dd araceas
El orden de plantas que ahora vamos a estudiar, es el de las

Aráceas, o más correctamente expresado, el de las Aroidéas. Todas las plantas de este grupo contienen un principio acre en más o menos cantidad. La Diffembachia puesta en la boca, produce una estomatitis terrible; la boca se cubre de una membrana blanco-amarillenta; las úlceras se forman en los labios, lengua y fauces; este medicamento fué experimentado por un estudiante de este colegio. Se le ha empleado después en el tratamiento de formas violentas de estomacace.

Tenemos que estudiar en este grupo a Arum tryphyllum, Arum dracontium, Caladium seguinum, Pothos foetida, Acorus, del que nada o muy poco conocemos, y Diffembachia.

Tenemos en el grupo de las Aráceas a Arum Tryphillium que debe ser comparado con Ailanthus, Ammonium causticum, Nitricum acidum, Muriaticum acidum, Selenium y Graphites. Después tenemos a Caladium seguinum. En seguida vienen Dracontium, y Pothos foetida que deben ser comparados con Balsamo del Perú, Pix liquida, Guaiacum, Eriodiction californicum. Y por ultimo vienen Acorus y Diffembachia.

Arum triphyllum

Este medicamento tiene una historia interesante. Hace unos veinticinco años apareció una epidemia de escarlatina, en el curso de la cual, todos los enfermos que no se atendían con presteza desde su principio morían. El porcentaje de mortalidad, tanto con la Homeopatía, como con otros sistemas, era verdaderamente aterrador. La razón de esto, era que no se conocía ningún medicamento que cubriera todos los síntomas epidemicos. En una pobre familia que vivia en un barrio apartado, cinco niños fueron atacados de esta forma epidémica de escarlatina. El médico que fué llamado había perdido tantos enfermos con los remedios habituales, que pensó inútil recurrir a ellos y encontró preferible ensayar algún tratamiento nuevo. Se habían hecho solamente algunos experimentos con Arum triphyllum pero ya habían encontrado que producía ciertos síntomas que justificaban su elección y lo administró en bajas diluciones. Todos los enfermos sanaron. El medicamento fué prescrito en otros casos de la misma epidemia, con éxito notable. Desde entonces Arum triphyllum ha sido considerado como un medicamento de valor en la difteria, en las formas malignas de escarlatina y también en otras fiebres de tipo tifódico.

En la escarlatina podemos hacer uso de Arum, cuando estén presentes los síntomas que en seguida se mencionan : flujo excoriante por la nariz y la boca, estando la nariz y los labios superiores desollados y dolorosos. La lengua está hinchada; las papilas aumentadas de tamaño y rojas, dándole un aspecto comparable al de la lengua de gato. La garganta está dolorosa y las amígdalas muy hinchadas; con frecuencia también hay una tos seca que molesta mucho al niño obligándolo a llevar involuntariamente sus

manitas a la garganta, como para atenuar el dolor. El escurrimiento de la boca irrita los labios y las regiones de la cara, que están agrietadas y sangrantes. Aún la misma saliva es acre: se forman costras y el niño no quiera abrir la boca. Está excitable e irritable mental y físicamente. Por lo que se ve Arum triphyllum es un medicamento extremadamente irritante. El niño está agitado, se mueve, tiene mal humor y no duerme en la noche. La erupción puede brotar normalmente y tener una doble descamación; otras veces el rash es obscuro e imperfectamente desarrollado; el niño lleva su dedo a la nariz o se rasca nerviosamente hasta hacerse sangre. En los casos ligeros, la orina puede ser profusa, o si no, la aparición de este síntoma es indicio de que el medicamento obra bien. Sin embargo, en los casos muy graves, en aquellos en que la malignidad se manifiesta por los síntomas internos y externos, se ve desarrollarse un cuadro perfecto de uremia durante el cual el niño se mueve inconsciente en su cama y se pellizca involuntariamente en un punto o se introduce el dedo en la nariz; la orina está completamente suprimida. Hay una irritación cerebral muy marcada, como lo demuestra la excitación, la inquietud y el hundimiento de la cabeza en la almohada. En tal caso Arum triphyllum puede salvar al paciente, aún cuando el caso sea extremadamente dudoso.

Yo no he visto jamás, que la inflamación del cerebro ceda a la acción de Arum triphyllum a menos que esté presente uno o varios de los síntomas que voy a mencionar: o la irritación en la garganta, boca y nariz, o el movimiento peculiar de pellizcarse o taladrar la nariz en un punto hasta hacerse sangre. Yo pienso que está indicado generalmente cuando la inflamación cerebral proviene de la supresión de alguna toxina violenta, como nos lo encontramos en la difteria y la escarlatina. No pensaría jamás en aplicar Arum en la uremia, cuando se presenta en el curso de un mal de Bright común; no creo que el medicamento obre eficazmente, a menos que estén presentes los síntomas ya citados.

Arum triphyllum tiene una acción marcada sobre la laringe; produce ronquera que se caracteriza por la pérdida del control sobre las cuerdas vocales. Si el orador intenta elevar la voz, repentinamente falla con estrépito. Con este síntoma puede hacerse uso de Arum en el dolor de garganta de los "predicadores", ya provenga del uso excesivo de la voz, o de algún enfrimiento. Es posible que el medicamento que se le acerca más en semejanza en la ronquera y en la incertidumbre en la voz, sea Grpahites, que resulta excelente para los cantores cuando no pueden controlar sus cuerdas vocales, cuando se ponen roncos y su voz suelta "gallos" desde que comienzan a cantar. En carbo veg., la voz es de tono profundo, fallando cuando se trata de alcanzar notas altas. Hay además otro medicamento y es Selenium. El enfermo se pone ronco desde que comienza a cantar.

Estudiemos ahora por un momento los análogos de Arum triphyllum, empezando por Nitricum acidum. Este era en otro tiempo, el solo medicamento de que disponíamos para la escarlatina maligna.

Produce escurrimiento nasal excoriante; ningún remedio ha sido más notable en esto, ni el mismo Arum. El flujo de la nariz excoría las fosas nasales y los labios; todo esto va acompañado de una gran postración; la garganta está extremadamente dolorosa y recubierta de una membrana de carácter diftérico, obscura y fétida o blanco-amarillenta. La boca (ya sea que se trate de difteria o escarlatina) está llena de ulceraciones que aparecen sobre todo, en la cara interna de las mejillas, en los labios y en los bordes de la lengua. Esta ulceración va acompañada de salivación; la saliva es de ordinario muy acuosa y acre y no espesa y viscosa. El pulso tiene frecuentes intermitencias, cada tres o cinco latidos, lo que constituye un síntoma muy grave. Es de preferirse Nitricum acidum a cualquiera de los medicamentos análogos, en la difteria con escurrimientos excoriantes cuando la enfermedad progresa hacia el estómago (que la membrana en este caso invada o no al estómago, es cosa que no puedo asegurar); cuando con una gran postración y membranas en las garganta y nariz hay malestar y sensibilidad gástrica con expulsión total de los alimentos.

Muriaticum acidum, es también otro de nuestros medicamentos en los casos malignos de la escarlatina y la difteria. En esta droga se presenta una postración grande; el enfermo parece tener apenas suficiente vida para moverse; se agrava entre diez y once de la mañana. La boca está esparcida de úlceras que tienen un fondo negro u obscuro, que crecen en profundidad. Tienden a perforar la región donde se encuentran. Con frecuencia, también en Muriaticum acidum, existe el pulso intermitente de Nitricum acidum y además evacuaciones y micciones involuntarias.

A mas de Nitricum acidum y Muriaticum acidum, en los casos en que se presentan estos cuadros sintomáticos peligrosos, es necesario pensar en el alcohol; recordemos que Grawvolgl ha descubierto que la membrana diftérica se disuelve y su crecimiento se detiene por algunas substancias entre las que se cuenta el alcohol; por esto es que este agente constituye un remedio para la difteria bajo la forma de aguardiente con agua, no solamente para detener el crecimiento, sino para contrarrestar la postración terrible.

Lycopodium es semejante a Arum triphyllum en la escarlatina y la difteria; hay un escurrimiento nasal parecido, ordinariamente asociado, sin embargo, a un dolor de cabeza sordo, batiente, que irradia a la raíz de la nariz y por encima de los ojos; la nariz está obstruida y el niño no puede respirar por la noche; el paciente se pica y rasca la nariz, tal como sucede en Arum; en el caso de Lycopodium sucede que la invasión diftérica va de derecha a izquierda; el paciente siempre se encuentra peor después del sueño, aún cuando haya dormido muy poco. El enfermo despierta de pronto lanzando gritos como si hubiera sido espantado sin que nada pueda tranquilizarlo; está irritable y de mal humor. En los casos aún más graves que exigen el uso de Lycopodium se encuentra el niño inconsciente y sumergido en profundo sueño; el maxilar inferior está caído; la orina

es escasa y aún suprimida y la que llega a salir, mancha en rojo las ropas y los vestidos, dejando una arenilla roja; la respiración es rápida, estertorosa y un poco roncante, con movimiento de las alas de la nariz. Todos los síntomas se relacionan a la parálisis cerebral inminente.

Ammonium causticum ha sido sugerido a este respecto por el Dr. J. P. Dake, como un medicamento indicado en la difteria que aparece en las formas nasales, acompañada de un flujo que quema y escoría, a la vez que de una gran postración. Los síntomas antes mencionados indujeron al Dr. Dake a emplear este medicamento en una epidemia que apareció en Nashville, Tennessee.

Por último, mencionaremos a Ailanthus. La historia de este medicamento es la siguiente : el Dr. P.P. Wells, de Brooklyn, tuvo dos casos de envenenamiento en niños; pudo observar que había cierta semejanza de estos casos con la escarlatina maligna; pero como no había epidemia en esa época, tuvo que buscar otras causas y encontró que los niños habián masticado las flores de Ailanthus. Esto le sugirió la probabilidad de que Ailanthus pudiera servir para curar la escarlatina. Hizo experimentos con él y comprobó en todo, lo que antes había observado en los envenenamientos. Después de esto, el medicamento se ha empleado frecuentemente con éxito. Hace un año atendí a un pobre niño con escarlatina; yacía en estupor con la boca ampliamente abierta; la garganta hinchada; la nariz obstruida; la escasa erupción que había sobre el cuerpo, era obscura y esparcida de puntos azulosos obscuros. Di Lycopodium sin ningún resultado benéfico; el niño se empeoró en vez de mejorarse; pensé entonces en Ailathus y lo prescribí a la 6a. dilución, obteniendo como resultado la curación completa del niño. Creo que se hubiera muerto sin Ailanthus. ¿En qué se semeja. Ailanthus a Arum triphyllum? Se parecen en la acritud de las secreciones. Hay escurrimiento excoriante por boca y nariz, que pone sensibles los labios; hay una semejante hinchazón de la garganta interior y exteriormente. Tanto que al observar los síntomas superficiales, los casos parecen idénticos; pero se puede notar una gran diferencia en otros síntomas. El enfermo de Ailanthus es soñoliento y yace en estupor; de aquí que esté indicado cuando hay estupor, más bien que la inquietud y la agitación como sucede en Arum triphyllum.

El rash de Ailanthus sale de un modo imperfecto; es rojo obscuro o azuloso y esparcido de petequias. Hace algún tiempo se me pidió que hablara acerca de los remedios que son de utilidad en la difteria. Ahora que tratamos de Arum y sus concordantes en esta afección, aprovecho la oportunidad para hacerlo.

Baptisia tinctoria, como se sabe, goza desde hace mucho tiempo de una gran reputación en la fiebre tifoidea. Recientemente se le ha empleado en la difteria y también en la escarlatina, cuando el niño está muy postrado y yace en un estado de semiestupor, como si estuviera intoxicado; la cara está rojo-obscura y tiene un aspecto embrutecido; el escurrimiento de la boca y nariz es horriblemente

fétido, de tal manera que podría creerse que las partes afectadas se han gangrenado.

Rhus toxicodendron está indicado en casos muy graves cuando las membranas son de un color obscuro y durante el sueño sale por la boca una saliva sanguinolenta. Estos síntomas van asociados a una inflamación de los ganglios del cuello, de aspecto erisipelatoso obscuro.

Phytolacca decandra es de utilidad, cuando en el comienzo de la enfermedad hay escalofrío y dolor en el dorso; el enfermo está débil y se siente desfallecer cuando se incorpora en su cama. Examinando la garganta se la encuentra rojo obscura, casi púrpura; hay una sensación quemante intensa, que se agrava por las bebidas calientes.

Amigdala amara está indicado cuando hay dolores agudos y lancinantes en las amigdalas hinchadas; el paladar y la garganta tienen un aspecto rojo-obscuro y el paciente está sumamente postrado.

Naja tripudians debe prescribirse, cuando hay amenaza de parálisis cardiaca. El enfermo tiene un aspecto azuloso; despierta jadeante; el pulso es intermitente y filiforme. El Dr. Preston, de Norristown, ha tenido muchos éxitos con Naja tripudians, cuando están presentes los síntomas ya mencionados.

Apis mellifica, a mi juicio, tiene indicaciones en la difteria, cuando desde su comienzo, el niño está muy postrado; no hay mucha calentura; de hecho hay una ausencia sospechosa de temperatura; está asoporado a las 3 de la tarde. El pulso fluctúa entre 130 y 140 y es muy débil. Desde luego la garganta tiene un aspecto barnizado, como si las amígdalas y los pilares hubieran sido cubiertos por un barniz rojo liso. La membrana se forma sobre una de las amígdalas, con más frecuencia la derecha, y es gruesa como la piel del camello. Con frecuencia la lengua está hinchada. Si el niño es grandecito, se queja de una sensación de plenitud en la garganta que le obliga a deglutir, siendo este acto muy difícil. La úvula, y de hecho toda la garganta está edematosa e hinchada. La glotis también participa de esta inflamación, rubicundez y edema, haciendo difícil la respiración. En algunos de estos casos el aliento es muy fétido, en tanto que en otros no lo es. En ciertos casos, un rash rojizo aparece sobre el cuerpo, que tiene un gran parecido al de la escarlatina.

Arsenicum album está indicado en casos más graves de difteria, cuando la garganta está muy hinchada tanto interior como exteriormente; cuando la membrana tiene un color obscuro y es muy fétida; hay un escurrimiento nasal delgado y excoriante; la garganta está edematosa, exactamente como en Apis: el enfermo está agitado, especialmente después de media noche y muy postrado; la orina es escasa y hay constipación, o bien diarrea acuosa y fétida.

Natrum arsenicosum es el medicamento, cuando la garganta tiene un color púrpura obscuro; hay notable hinchazón y gran postración sin mucho dolor.

Kali permanganicum presta utilidad cuando las falsas membranas

son horriblemente fétidas, la garganta está edematosa y hay un escurrimiento nasal delgado; la principal característica de este medicamento es la extremada fetidez.

Lachesis está indicado cuando la membrana se forma desde un principio sobre la amígdala izquierda y de ahí se extiende a la derecha. ¿Cómo distinguirlo de otros medicamentos que obran de manera semejante? Por los síntomas siguientes: los síntomas son agravados por deglutir alimentos sólidos. Hay una constante sensación como de una masa en el lado izquierdo de la garganta que desciende en cada acto de la deglución volviendo a su sitio. Algunas veces al despertar hay la sensación de como si tuviera agujas en la garganta, produciéndole sofocación. Otras veces, cuando las amígdalas están muy hinchadas, los líquidos son expulsados por la nariz. Los pilares tienen un color púrpura obscuro y hay una gran postración. La acción cardiaca es muy débil; hay agravación después del sueño y la garganta es muy sensible al más ligero tacto.

Belladonna no es un medicamento importante en la difteria : cuandó se prescribe en esta enfermedad, es necesario estar seguro de que es el remedio indicado, so pena de perder un tiempo precioso. Sin embargo, puede ser el medicamento en las primeras fases, cuando la violencia del ataque lo exige; cuando existe congestión cefálica antes de que la membrana se forme.

Además de los medicamentos ya mencionados, hay otros frecuentemente indicados, por ejemplo : Kali bichromicum, Iodium, Bromium, Mercurius biiod, Mercurius cyanat, y otros más. Veremos más tarde sus indicaciones.

Caladium seguinum

Caladium está indicado en las personas gruesas y de fibra laxa que son víctimas del asma catarral, que es el asma con producción de como difícil de expulsar, produciendo gran alivio cuando se logra su expulsión.

Es un medicamento que hay que recordar en la espermatorrea o debilidad seminal, particularmente en las emisiones nocturnas, cuando hay relajamiento completo de los órganos genitales, de modo que las emisiones se producen sin ningún sueño o si los hay, son del todo extraños a asuntos sexuales.

Menciono este medicamento para su estudio, con el fin de expresar algunas palabras acerca de sus remedios análogos. Dracontium, jamás ha sido experimentado en altas diluciones; produce síntomas de naturaleza semejante a los de Arum triphyllum, solamente que tiene su acción sobre la parte más baja del aparato respiratorio, lo que no sucede en el segundo medicamento. Arum produce una tos laríngea. Dracontium obra sobre la tráquea y los tubos bronquiales, dando origen a un violento ataque de catarro, con formación rápida, desde un principio, de una secreción acuosa quemante, para dar lugar después a un desarrollo rápido de pus o mocopus; también

tiene como síntoma característico una secreción amarillenta y purulenta con sensación de quemazón y desolladura, además de otros síntomas de inflamación intensa.

Al lado de Dracontium he colocado una lista de medicamentos, algunos de los cuales pueden sernos desconocidos. El Bálsamo de Perú es un excelente remedio, cuando los sudores nocturnos y hécticos indican que el enfermo camina hacia un estado alarmante. Yo hago uso de este medicamento a bajas diluciones. A continuación he colocado a Pix líquida, que no solamente es un excelente remedio en el catarro brónquico, sino también en la tisis pulmonar. Está indicado cuando hay expectoración de una materia purulenta, fétida y de mal sabor, acompañada de un dolor localizado en el tercer cartílago costal izquierdo. (Sitio que topográficamente corresponde al bronquio izquierdo).

El dolor puede dar o no la impresión de irradiar hasta el dorso; en este caso Pix líquida será el medicamento indicado; es de prescribirse con especialidad en el tercer período de la tisis.

Después de Pix he colocado a Guaiacum, en el que también debe pensarse en el último período de la tuberculosis, cuando hay dolores pleurales en el vértice izquierdo y además esputos muco-purulentos y fétidos.

Eryodiction californicum (también llamado Yerba santa) tiene una sintomatología muy limitada, pero se ha empleado con éxito en la que se ha llamado tisis bronquial. El enfermo tiene sudores nocturnos y el cuerpo demacrado. Hay una intolerancia notable por los alimentos. Está indicado en la tisis que resulta de catarros bronquiales frecuentes y en el asma que se mejora por la expectoración.

Ictodes foetida

Este es un medicamento que es necesario recordar en el asma; presta utilidad cuando esta afección empeora por la inhalación de polvo, por ejemplo en una troje, habiendo mejoría por defecar. También tiene síntomas muy marcados de histeria: distracción mental, irritabilidad, accesos histéricos parecidos al tétanos, con enorme timpanismo.

Dd anacardiaceas

Este órden de plantas es muy importante, pues nos proporciona muchos medicamentos de gran valor; 1o. el Anacardium orientale que procede del Este; 2o. el Anacardium occidentale o bellota de acajou que procede del Oeste; 3o. la Comocladia dentata, que es el Rhus común de las regiones meridionales de Estados Unidos y de Cuba. En las flores de esta planta, las abejas hacen su provisión en cierta época del año. Las personas que toman su miel en este tiempo están expuestas a sufrir una erupción muy semejante a la erisipela. La Comocladia es muy parecida a Rhus toxicodendron; los dos medicamentos producen dolores que mejoran por el movimiento;

ambos pueden estar indicados en la erisipela; los dos producen una rubicundez escarlata en el cuerpo, con ardor y comezón, debilidad, entorpecimiento, agitación, etc. Difieren en sus síntomas oculares. Comocladia produce dolores en el ojo derecho con una sensación de como si este órgano estuviera muy agrandado o pareciera salir de la órbita; estos síntomas oculares empeoran por estar cerca de una estufa; en tanto que los de Rhus se alivian por la misma circunstancia. Los síntomas oculares de Apis también se agravan por estar cerca de una estufa caliente. Comocladia se parece a Euphorbium officinarum en sus síntomas cutáneos, aún en las rayas rojas que produce sobre la piel. 40. Rhus toxicodendron o yedra venenosa que estudiaremos en una conferencia próxima; 5o. Rhus glabra o zumaque común; esta variedad de Rhus no es tan venenosa como las ya mencionadas; ha curado la cefalalgia occipital y también la epistaxis de la fosa nasal izquierda; 6o. Rhus radicans, considerado por muchos como idéntico a Rhus toxicodendron; 7o. Rhus vennenata una variedad extremadamente tóxica; poseé una enorme flor de color café-rojizo obscuro; es casi un árbol que crece en ocasiones hasta la altura de diez pies y se parece mucho al Ailanthus. Todo el órden de estas plantas posee propiedades tóxicas que envenenan la sangre y producen una erupción sobre la piel, primero vesiculosa y finalmente pustulosa y eczematosa. También pueden producir eritema que degenera en erisipela. A pesar de las semejanzas mencionadas, hay grandes diferencias en su acción fisiológica; en efecto, estas diferencias suelen ser tan grandes, que en ciertos casos, llegan a tener acción opuesta.

Anacardium orientale

Anacardium ejerce una acción muy deprimente sobre la economía, no solo sobre la mente sino también sobre el cuerpo; ocasiona debilitamiento de la memoria; nos encontramos con frecuencia este síntoma como resultado de enfermedades agudas; por ejemplo, un exantema agudo como la viruela. La erupción que produce Anacardium es semejante a la de la viruela. Teniendo en cuenta estos dos síntomas, pérdida de la memoria y erupciones que semejan a las de la viruela tendremos un excelente motivo para prescribir este medicamento, cuando la pérdida de memoria sobreviene como secuela de esta enfermedad.

Anacardium puede también ser de utilidad, cuando la pérdida de la memoria sobreviene en las personas de edad o se presenta como resultado del reblandecimiento cerebral.

Además de esta acción sobre la inteligencia nos encontramos que la esfera emotiva está muy desordenada. El enfermo de Anacardium imagina escuchar voces lejanas que le llaman.

Acontece en esto algo parecido a lo que sucede en Stramonium. Hay una sensación de como si tuviera dos voluntades, una que le ordena actuar y la otra que le prohibe. Este no es un síntoma raro en la

fiebre tifoidea, en la que, las plantas que envenenan la sangre, como las que estamos estudiando, pueden ser considerablemente útiles. Esta sensación de como si el enfermo tuviera dos voluntades también se encuentra en otros medicamentos; por ejemplo en Lachesis, que como se recordará "el enfermo piensa que está bajo el dominio de algún poder sobrehumano". Un síntoma semejante también se encuentra en Belladonna.

Otro estado mental caracteristico de Anacardium es la propensión a blasfemar. No se suponga que recomiendo a Anacardium para la curación de la impiedad, cuando es el resultado de una moral baja; de ningún modo. Sin embargo, cuando la tendencia a blasfemar sobreviene como resultado de una enfermedad mental, Anacardium puede prestar contigente de mucha valía. En cierta ocasión atendí a un ministro inclinado notablemente a proferir palabras impías; fracasados todos los esfuerzos, nada se podía hacer; este desarreglo no apareció sino hasta cuando empezó a tener una cefalalgia particular caracterizada por una sensación de como si tuviera un tapón en la cabeza. Anacardium produjo en este caso, una curación completa.

Otro medicamento que produce inclinación a la blasfemia, es Nitricum acidum, pero no lo he visto producir buenos efectos en estos casos, excepto después del abuso del mercurio. La enferma se imagina que está poseída del diablo. Tiene la idea fija de que su cuerpo y espíritu están separados. Se imagina que su niño no es de ella. Quisiera llamar la atención sobre un síntoma del medicamento, consignado por el Dr. Talcott, de Middletown, y es la propensión al suicidio por arma de fuego, síntoma que también se encuentra en Antimonium crudum.

Nos encontramos también que Anacardium es un medicamento para los malos efectos de la sobreactividad mental o, en otros términos, para la fatiga mental. El trabajo mental produce una cefalalgia desgarradora; los dolores se situan de preferencia en la frente y parte superior de la cara. En otros casos, esta cefalalgia puede revestir una forma diferente en la que el enfermo se queja de una sensación de como si un tapón estuviera introducido en alguna parte de la cabeza, o de una sensación de constricción, como si una faja estuviera anudada en su rededor. Estas cefalalgias de Anacardium van asociadas a una gran irritabilidad mental, que sin embargo, no es tan intensa para inducir al paciente a blasfemar.

Anacardium también produce hipocondriásis; el enfermo tiene la tendencia a ser torpe en su manera de conducirse y está muy deprimido; estos síntomas mentales, tienen con frecuencia su orígen en los síntomas gástricos.

Los síntomas gástricos de Anacardium son los que siguen, muy característicos por cierto; veremos que el enfermo constantemente tiene hambre; que se siente mejor en el momento de comer, pero que empeora después de haber comido; es propenso a la constipación y con frecuencia tiene deseo de evacuar, pero cuando

intenta hacerlo, cesa el deseo. El recto parece carecer de fuerza; el enfermo se queja de como si una masa o substancia extraña tuviera en el recto, no siendo este síntoma el resultado mecánico de la retención fecal. Nuevamente se experimenta, la sensación de como si una masa o cuerpo extraño se opusiera al funcionamiento normal de este órgano. Estos síntomas son más comunes de lo que se cree; cuando los observamos, estamos habituados a pensar en Nux vómica, Ignatia y Sulphur y generalmente nos olvidamos de Anacardium Anacardium se parece muy especialmente a Nux vómica por la náusea de la mañana. Como Nux vomica, puede ser de utilidad en la náusea matinal del embarazo; la enferma se siente mejorada mientras come, pero los síntomas se presentan inmediatamente después. También hay semejanza en los síntomas mentales de los dos medicamentos. ¿En qué se diferencían pues? Hay una diferencia esencial en la patología de los casos que demandan estos remedios; en tanto que Anacardium produce necesidad de defecar, hay además una impotencia o una insuficiencia del recto, demostrando así un estado parético que no existe en Nux vómica, pues este último responde a una irregularidad de la acción peristáltica intestinal; de aquí que la sensación como de un tapón en el recto, no se encuentra en Nux vómica.

Sepia es semejante a Anacardium y produce la sensación de como si alguna substancia extraña se encontrara en el recto, una constante sensación de plenitud en el recto mismo después de ir al excusado. Además, hay una inactividad rectal de tal manera que una masa fecal blanda es difícilmente expulsada. Es verdad que estos síntomas de Sepia se relacionan casi siempre con algún padecimiento uterino, para que este remedio sea el indicado.

No debemos olvidar la diferencia que he expresado entre Nux vómica y Anacardium; insisto en esto, porque sé que con frecuencia damos Nux vómica, cuando deberíamos prescribir Anacardium.

Un médico francés ha recomendado Anacardium como un medicamento inestimable en las hemorroides internas; lo administra a la 30a. dilución varias veces al día, durante algunas semanas. Asegura haber hecho muchas curaciones; yo no he tenido oportunidad de confirmar su experiencia.

El Mismo médico empleaba Lamium album para las hemorroides externas. Veamos a continuación la acción que Anacardium ejerce sobre la piel. Nos lo encontramos prestando utilidad cuando la cara está hinchada, particularmente el lado izquierdo y cubierta de pequeñas vesículas de apariencia pustulosa, umbilicadas, pudiendo encontrarse en otras partes del cuerpo. Dejan escapar una serosidad amarillenta, que se endurece al aire libre formando costras. La comezón es extremada, tan intensa que el enfermo se ve obligado a sangrarse la piel con las uñas. Estos síntomas cutáneos frecuentemente van acompañados de algunos de los síntomas gástricos ya mencionados.

El Anacardium occidentalc o bellota de ocajou, produce

ordinariamente sobre la cara una erupción vesicular, pero también sobre las demás regiones del cuerpo, dando orígen a una comezón casi intolerable como es de imaginarse y con formación de pústulas umbilicadas semejantes a la viruela. Produce una erupción erisipelatosa sobre la cara que se propaga de izquierda a derecha. Esto es lo que se observa en su patogenesia. Recordemos que he dicho que cuando en una patogenesia los síntomas se propagan en una dirección, el remedio que los produce, debe curar una enfermedad cuyos síntomas van en dirección opuesta. Por ejemplo, en la patogenesia de Rhus, la inflamación erisipelatosa va de derecha a izquierda, de donde se deduce que debe curar la inflamación erisipelatosa que va e izquierda a derecha. Como Anacardium tiene síntomas análogos a Rhus, pero que van en dirección opuesta, puede obrar como antídoto de Rhus.

Hablemos ahora de la acción de Anacardium orientale sobre el corazón. Anacardium está indicado en las palpitaciones cardiacas, particularmente en los ancianos, cuando se complican con pequeños achaques como el coriza ordinario. Esta palpitación va frecuentemente asociada a una disminución de la memoria. Nos lo encontramos también indicado en las afecciones reumáticas del pericardio, en la pericarditis reumática caracterizada por algunos piquetes que atraviezan la región cardíaca. Estos piquetes son dobles, es decir, que uno va seguido inmediatamente de otro, siguiendo después un largo intervalo.

Diremos ahora algunas palabras acerca de la acción de Anacardium sobre la espina dorsal, el dorso y los miembros. Anacardium puede ser prescrito en las afecciones medulares; los síntomas que lo indican son una sensación de como si una ligadura se anudara alrededor del cuerpo, como si un tapón se hundiera en la columna vertebral; de manera que todo movimiento da orígen a un dolor, como si el tapón se hundiera de este modo más profundamente en el cuerpo. Las rodillas, en particular, parecen estar muy débiles en estas afecciones espinales; como paralizadas. El enfermo apenas puede caminar y además experimenta una sensación de como si las tuviera estrechamente vendadas.

Revisando los trabajos de Boenninghausen, nos encontramos que Anacardium orientale tiene acción sobre la articulación de la rodilla. Veremos también que Pulsatilla obra sobre esta misma región. La hinchazón que produce Anacardium es de carácter crónico y va acompañada de una sensación de como si hubiera una ulceración subcutánea.

Anacardium, debemos recordarlo, no es antídotizado por Rhus, aunque en ciertas circunstancias antidotiza a este medicamento. Pero es antidotizado por Juglans y también por el café cárgado, sin azúcar ni leche.

Hemos llegado ahora a las diferentes variedades de Rhus. Rhus toxicodendron, como ya se ha dicho, será estudiado de un modo completo en nuestra próxima conferencia. Quiero decir algunas

palabras acerca de Rhus radicans y sobre el tratamiento antidotal del envenenamiento por Rhus. Rhus radicans ha sido altamente recomendado para la cefalalgia occipital comunmente asociada a una tiesura reumática de la nuca.

Se han sugerido muchos antídotos para el envenenamiento por el Rhus. Uno de los mejores es Croton tiglium. Este, aplicado localmente o tomado al interior, produce una erupción casi idéntica a la de Rhus toxicodendrum. Al principio aparece un eritema con una inflamación notable y hundimiento de la piel a la presión. Se forman pequeñas vasículas muy confluentes y acompañadas de una comezón casi intolerable, de ardor y piquetes. Las vesículas se llenan de una serosidad amarillenta y finalmente se rompen, formando costras más o menos gruesas.

Ammonium carbónicum también ha sido sugerido. Se la puede emplear tanto al interior como exteriormente. Produce una erupción muy fina, rojiza con mucho ardor y quemazón que empeora por la noche. Los médicos occidentales últimamente han empleado Grindelia robusta; aquí es poco usado.

Se debe pensar en Arsenicum, cuando la erupción va acompañada de dolores ardientes y quemates en la piel, con gran agitación.

El envenenamiento crónico por el Rhus, encuentra su remedio en Graphites. Grindelia robusta, de la que hace un momento hablé con tanta brevedad, es un maravilloso medicamento debido a su acción sobre los pneumogástricos. Parece producir una paresia de estos nervios, de tal manera que cuando el enfermo intenta dormir, se detiene la respiración y de este modo despierta por la necesidad de oxígeno. Recordemos que en esto es semejante a Lachesis y a Gelsemium.

Rhus toxicodendron

El medicamento de que voy a tratar ahora, es el principal de las Anacardiáceas, la yedra venenosa o Rhus toxicodendron.

Debemos recordarlo como complementario de Bryonia, hecho descubierto por Hahnemann, por su experiencia en una epidemia de tifus en la guerra durante la que trató muchos casos, habiendo perdido solamente dos. Los éxitos que obtuvo entonces, fueron reconocidos en todas partes. Después, muchas vidas se han salvado por el uso de estos dos medicamentos alternando; es decir, dando Bryonia cuando existen los síntomas de Bryonia y Rhus, cuando el enfermo presenta los síntomas que exigen la aplicación de este medicamento. Es una alternación legítima. Debemos recordar también un hecho, del que ya he hablado, pero es tan importante, que lo repetiré nuevament; que Rhus toxicodendron es incompatible con apis mellifica; aunque los síntomas de los dos aparentemente sean parecidos, por una razón que no sabría explicar, no se siguen bien estos dos medicamentos.

Encontramos que Rhus toxicodendron forma el centro de un gran

número de medicamentos. Si quisiéramos estudiarlos comparativamente, tendríamos necesidad de varias horas. Por ejemplo, teniendo importantes relaciones tifódicas, tendríamos que estudiar muchos medicamentos empleados en los estados tifódicos. Bryonia, como ya se ha dicho, se coloca a su lado. Después tenemos, pasando a otro capítulo, a Arsenicum album, a otro más, a Muriaticum acidum, a Phosphorus, a Carbo vegetabilis, etc., y con Baptisia a otro numeroso grupo de medicamentos.

Estudiaremos desde luego la acción de Rhus sobre el sistema circulatorio; nos encontramos que produce un eretismo, un aumento en la circulación, o en otros términos, una ebullición de la sangre. Obra sobre el órgano central del circulación, el corazón. De este modo nos lo encontramos indicado en la hipertrofia de esta víscera, sin complicaciones, es decir, hipertrofia no asociada a lesiones valvulares. ¿De qué causa? por efecto del ejercicio exagerado, como puede suceder con frecuencia en los atletas y obreros que manejan instrumentos pesados.

Rhus toxicodendron es complementario de Bryonia. Obra sobre la sangre teniendo acción sobre el corazón, el pulso y produciendo síntomas tifódicos. Produce fiebres, de carácter intermitente, etc. Obra sobre los tejidos fibrosos, como en las aponeurosis, tendones y articulaciones; produce celulitis, siendo útil para los efectos del ejercicio exagerado. Obra sobre la piel produciendo erupciones, erisipelas. Afecta las mucosas produciendo influenza, diarrea. También tiene acción sobre los órganos.

Debe compararse en las afecciones cardíacas, con Arnica, Bromium Aconitum, Kalmia, Pulsatilla, Actea racemosa y Phytolacca decandra.

En la fiebre tifoidea debe compararse con Phosphorus, Arsenicum, Muriaticum acidum, Carbo vegetabilis, Baptisia, Arnica, Phosphoricum acidum, Taraxacum y Bryonia.

En las afecciones reumáticas debe compararse con Arnica, Arsenicum, Sulphur, Petroleum, Ruta, Staphysagria, Kali carbonicum, Ledum, Valeriana, Anacardium, Conium, Lycopodium, Pulsatilla, Ferrum, Rhus radicans, Kalmia, Colchicum y Rhododendron.

En la escarlatina compárese con Lachesis, Ailanthus, Arum triphyllum, Belladonna y Calcarea ostrearum.

En el eczema debe compararse con Mezereum y Nux juglans.

En los síntomas cefálicos, con Cinchona, Sulphuricum acidum, Belladonna, Spigelia y Carbo animalis.

En los síntomas oculares, con Calcarea ostrearum, Sepia, Gelsemium y Kalimia.

Otros medicamentos que prestan utilidad en estos casos, son Arnica y Bromium. Estos remedios, cuando están indicados deben administrarse de un modo persistente durante días y aún semanas, hasta que se haya tenido éxito, obteniendo una verdadera reabsorción de las fibras musculares cardíacas en demasía. De este modo encontramos que Rhus está indicado en las palpitaciones cardíacas que siguen a un exceso de ejercicio fisico. Cuando Rhus es

el medicamento en las enfermedades del corazón, se encuentra ordinariamente acompañando a este desorden, una sensación como de adormecimiento en el brazo y hombro izquierdo. El enfermo experimenta una sensación de debilidad en el pecho, como si el músculo cardiaco estuviera fatigado, más notable después de cualquier ejercicio. Las palpitaciones pueden ser experimentadas, aún permaneciendo tranquilamente sentado, mejorándose por el movimiento.

Aconitum tiene hormigueo en los dedos, acompañando a una afección cardíaca; se sienten como si fueran a dormirse. Con este medicamento, siempre hay ansiedad. Lo mismo diremos de Kalmia que tiene el mismo síntoma en el brazo izquierdo en las afecciones cardíacas.

Pulsatilla tiene adormecimiento particularmente en el codo, muy a menudo con la hipertrofia o en la dilatación del ventrículo derecho.

Actea racemosa tiene la sensación de como si el brazo estuviera fuertemente ligado al cuerpo.

Phytolacca afecta el lado derecho del cuerpo y tiene la misma sensación en el brazo derecho, que Aconitum, Kalmia y Rhus en el brazo izquierdo.

Veamos ahora el pulso de Rhus toxicodendron. Produce una depresión en la economía; por lo tanto el pulso no tiene tendencia a ser lleno y fuerte, como sucede en Aconitum; es acelerado, pero al mismo tiempo, tiende a ser débil en sus latidos. Otras veces es irregular y aún intermitente. Todos estos fenómenos son característicos de Rhus toxicodendron. Con estas diferentes variedades de pulso nos encontramos frecuentemente el adormecimiento del brazo izquierdo ya señalado.

Estudiemos ahora los síntomas tifodicos de Rhus; me refiero a los síntomas que revelan un decaimiento de las fuerzas vitales, como los que se presentan en la fiebre tifoidea. En igualdad de circunstancias podemos contar con el buen efecto de Rhus, siempre que las enfermedades agudas tomen una forma tifódica. Nos encontraremos que la disentería revistiendo este carácter, puede reclamar su aplicación; otro tanto puede decirse respecto a la peritonitis, la neumonía, la escarlatina y la difteria, cuando no está claramente indicado otro medicamento. De todo esto se deduce que Rhus obra sobre la sangre produciendo envenenamiento. Los síntomas que reclaman su uso en la fiebre tifoidea propiamente dicha, son los siguientes : en primer lugar el temperamento del enfermo de Rhus nos facilitará su elección; el paciente es afable; su delirio es tranquilo y no de forma violenta; es cierto que a veces el enfermo tiende a saltar fuera de la cama, pero cuando está más o menos consciente, revela poca irritabilidad; en consecuencia, no son la ira y la violencia, lo que caracteriza a Rhus. Se observará que el delirio va asociado a una inquietud que no es solamente mental, sino también física. El enfermo se mueve en la cama constantemente; se acuesta primero sobre un lado, después sobre el otro; de pronto se sienta para volver

a acostarse en seguida. Se observa, por consiguiente, un deseo constante de moverse y cambiar de posición, siendo posible que con esto siente mejoría el enfermo. Excepcionalmente se observa al principio de la enfermedad, que el paciente desea estar en completa quietud, esto se debe a la debilidad muscular tan notable, pues se siente completamente postrado; es indiferente a todo; esta sensación de debilidad está en desproporción con los demás síntomas. Algunas veces hay alucinaciones; teme ser envenenado; no tomara las medicinas que se prescriben, ni los alimentos o bebidas que se le ofrezcan, pues cree que sus enfermeros desean envenenarlo. (Hyosciamus tiene el mismo síntoma y aún más marcado que Rhus). A medida que el estupor progresa, el pacienta contesta a las preguntas muy lentamente, como si lo hiciera de mala gana, o lo hace con irritabilidad, pero no monta en ira. Se queja de una violenta cefalalgia, que compara a las molestias que le produjera una tabla amarrada a la frente. Esto con frecuencia se acompaña de un aflujo de sangre a la cabeza, como lo demuestran los bochornos súbitos que se experimentan en la cara. La cefalalgia es mejorada por la epistaxis, siendo la sangre de color obscuro. Las toxinas pueden interesar los pulmones dando origen a la pulmonía, con la tos que le es habitual, disnea y esputos herrumbrosos; como síntoma concomitante de todos los ya citados, encontramos la lengua de color café-obscuro, seca y partida. Los labios están muy agrietados y a veces sangran. Otras veces la lengua y la boca están recubiertas de un moco café y viscoso; en otras ocasiones la lengua tiene marcada la impresión de los dientes. Ruego que no se prescriba Mercurius simplemente por encontrar este último síntoma; su aplicación en la fiebre tifoidea es muy rara y a menos que haya síntomas francamente ictéricos, hará daño. La punta de la lengua, (hablo de Rhus) frecuentemente presenta un triángulo rojo. Hay desarreglos gástricos e intestinales; deyecciones de color café amarillento y de olor cadavérico. Las deposiciones pueden escapar involuntariamente durante el sueño. La orina también escapa involuntariamente y muchas veces deja una mancha rojiza en la ropa. El enfermo se queja de dolores desagrantes en las piernas y también de un dolor casi insoportable en la espalda. Si se queda dormido está inquieto, sueña que anda corriendo en el campo o que emprende arduos trabajos. Algunas veces, como Bryonia, sueña en los negocios cotidianos. (Aurum, Causticum y Aurum mur) también tienen esta inquietud de las piernas con agravaciones nocturnas.

La superficie del cuerpo está seca y caliente y con frecuencia de un color más rojo que lo natural. Muchas veces a este estado sigue una erupción de la piel, consistente en manchas rojas. Si hay sudor, es abundante, de olor agrio y va acompañado de erupción miliar. Hay timpanismo abdominal y sensibilidad, sobre todo, en dos puntos importantes: la fosa iliaca derecha y la región del bazo, que en estos casos está crecido. Por último, las evacuaciones se vuelven escasas, de color verdoso y no hay tenesmo. En las mujeres puede

presentarse la hemorragia uterina, que no alivia en nada los síntomas. Suelen presentarse fenómenos de congestión pulmonar, notándose a la auscultación estertores sobre el pecho, siendo más acentuados en los lóbulos inferiores. La tos es en un principio seca, volviéndose después más frecuente y floja, con expectoración estriada de sangre. Estos son los principales síntomas que pueden conducirnos a la elección de Rhus en el tratamiento de la fiebre tifoidea. Permítaseme decir brevemente, cómo podemos distinguir este medicamento de sus concordantes; hablaré primeramente de algunos que le siguen bien.

Phosphorus le sigue bien cuando los síntomas de la neumonía no han cedido a la acción de Rhus y cuando la diarrea continúa. Las deyecciones son amarillas y estriadas de sangre, teniendo algunas veces un aspecto como de agua en la que se ha lavado carne.

Arsenicum debe seguir a Rhus en la forma erética de la fiebre tifoidea; cuando a pesar de la postración tan terrible, el enfermo está irritable y ansioso, aún en las últimas horas que preceden a la muerte. La profunda debilidad continúa; el aspecto negro de la boca se hace más notable y la diarrea persiste a pesar de la aplicación de Rhus. Refiriéndome a Arsenicum, voy a dar un consejo. Entre los médicos de poca experiencia, hay una costumbre de prescribir Arsenicum antes de tiempo y haciéndolo así, sólo aceleran el curso de la enfermedad que tratan de curar. Arsenicum es un excelente medicamento cuando está bien indicado, pero es terriblemente perjudicial cuando se abusa de él; por lo tanto, doy el siguiente consejo : NO ADMINISTRARLO AL PRINCIPIO DE LA FIEBRE TIFOIDEA, A MENOS QUE ESTE CLARAMENTE INDICADO. Como Rhus, Arsenicum produce inquietud, postración y síntomas abdominales prominentes. La sed es intensa; hay dolores quemantes; las evacuaciones son de color café obscuro, fétidas, sanguinolentas y más frecuentes después de la media noche.

Muriaticum acid. es también útil en la forma erética de la fiebre tifoidea. Tiene muchos síntomas que son comunes a Rhus; debe ser preferido cuando la descomposición de los fluidos en aún más evidente; la postración es notable; el enfermo está tan débil que se desliza hacia los pies de la cama. Las heces y la orina, escapan involuntariamente. Pero Rhus también tiene concordancia con los medicamentos que se adaptan a la forma tórpida de la fiebre tifoidea. A la cabeza de esta lista se encuentra Carbo vegetabilis. El enfermo de Rhus frecuentemente pasa al estado que reclama Carbo vegetabilis, y en estos casos yace en un estado de entorpecimiento completo, sin dar señales de reacción. Las piernas, especialmente de las rodillas a los pies, están frías cubiertas de un sudor también frío. El pulso es rápido y débil; las deyecciones son horriblemente fétidas.

Otro medicamento de utilidad es Baptisia, que como Rhus, está indicado cuando la lengua tiene un sarro de color café o negruzco y cuando la fiebre es bien marcada. La cara es de color rojo obscuro y tiene un aspecto de embrutecimiento; como de beodo. Las

deposiciones son obscuras, líquidas y muy fétidas; el enfermo está somnoliento y estúpido; se queda dormido al contestar las preguntas, o bien está inquieto cambiando constantemente de lugar en la cama; tiene la ilusión de que es doble o que su cuerpo está hecho pedazos y que éstos están esparcidos por toda la cama tratando de juntarlos. Se queja de que la cama es demasiado dura. Frecuentemente la lengua está cubierta de úlceras aftosas.

Tanto Arnica montana como Baptisia tinctorea, tienen un aspecto somnoliento y estúpido; el enfermo se queja de que la cama esta demasiado dura y se queda dormido al estar contestando las preguntas que se le hacen. Pero bajo la acción de Arnica, la apatía es completa; se presentan equimosis y úlceras por decúbito; Arnica tiene expulsión involuntaria de materias fecales y orina y si están interesados los pulmones, hay esputos sanguinolentos.

Phosphoricum acid. sigue bien a Rhus, cuando la debilidad y la postración van en aumento y la apatía es absoluta. Las deyecciones son sanguinolentas y babosas. Cuando se presenta la epistaxis, no mejoran los síntomas.

Taraxacum también debe tenerse en cuenta en estos casos. El hijo de Boenninghausen, fué atacado de fiebre tifoidea, siendo atendido por su padre; presentaba entre otros síntomas, la inquietud característica de Rhus tox., y sin embargo, este medicamento no lo alivío. Consultando la Materia Médica, Boenninghausen encontró que Taraxacum tenía esta misma inquietud en las piernas y dolores desgarrantes en las mismas, además de otros síntomas que también tenía su hijo, como la lengua "mapeada". Boenninghausen prescribió Taraxacum y los buenos resultados no se hicieron esperar. Las indicaciones de Bryonia en los estados tifódicos, las dejaré para una de las próximas conferencias en que me ocupe extensamente de dicho medicamento.

Después de esto veremos los trastornos circulatorios que produce Rhus en otra clase de fiebres, una de ellas la intermitente. Rhus es de utilidad en la fiebre de tipo intermitente, cuando el escalofrío se inicia por una pierna, más comunmente por la cadera. En algunas ocasiones el escalofrío se incia en la región interescapular. Es de mucha importancia tratándose de la fiebre intermitente, observar de que punto parte el escalofrío; en Natrum mur. y en Eupatorium perf., el escalofrío parte de la cintura; bajo la acción de Gelsemium, el escalofrío sube por la espina. Durante el escalofrío hay una tos seca y molesta, síntoma que también se presenta en Cinchona y Sulphur. A la vez que se desarrolla un escalofrío exterior, hay un calor interno. No hay sed. Frecuentemente hay síntomas cutáneos como urticaria y "botones de fiebre" (herpes); estos últimos situados generalmente alrededor de la boca. El sudor es general, excepto en la cara.

Vamos a estudiar ahora la acción de Rhus sobre el tejido fibroso, incluyendo las aponeurosis y tendones musculares, los ligamentos que rodean a las articulaciones y el tejido conjuntivo. No hay un medicamento que tenga acción más marcada sobre el tejido fibroso,

que Rhus tox. Hablare en primer lugar acerca de su acción sobre los tendones musculares. Rhus es de utilidad cuando estos tendones están inflamados, sean por el ejercicio exagerado o por una torcedura violenta, como en los casos de lastimaduras. Lo encontramos también indicado en las diversas afecciones consecutivas al ejercicio exagerado. En los filarmónicos, por ejemplo, que tocan instrumentos de viento y que por este ejercicio exagerado les sobreviene una hemoptisis, Rhus será el medicamento de elección. Si una persona es atacada de parálisis debido a un ejercicio violento, es muy probable que dicha afección ceda con la administración de Rhus.

Permítaseme citar aquí algunos otros medicamentos de que se puede disponer para los malos efectos del ejercicio exagerado a fin de que los podamos ditinguir en cada caso, del medicamento que nos ocupa.

Arnica obra con más intensidad sobre el tejido muscular que sobre los ligamentos. En consecuencia está indicado, cuando después de un ejercicio prolongado, hay adolorimiento muscular. El paciente tiene la sensación de haber sido golpeado. No se experimenta esa sensación de torcedura que hay en Rhus. Cuando una articulación ha sufrido movimientos más amplios que los normales, no será Arnica el mejor medicamento que podamos usar, a menos que haya una considerable inflamación de las partes blandas, aparte de los ligmentos afectados.

Debe pensarse en Arsenicum para los efectos del ejercicio exagerado particularmente cuando éste ha consistido en escalar cerros o montañas muy altas; en estos casos se combinan los malos efectos del ejercicio pesado a los efectos que puede producir la respiración de una atmósfera enrarecida. Sin embargo, el caracteristico general que nos guiará en la elección de Rhus en todos estos casos, es el siguiente : EL ENFERMO EXPERIMENTA MEJORIA DE TODOS SUS SINTOMAS CON EL MOVIMIENTO CONTINUADO; EN TANTO QUE SE AGRAVAN AL EMPEZAR A MOVERSE. Esto se explica por que el tejido fibroso se pone más flexible a medida que el paciente continúa moviéndose.

Diré que parece haber una excepción respecto a estos síntomas, y es precisamente en la afección tan dolorosa llamada lumbago. He observado que en el principio de la afección, Rhus es el remedio curativo, sea que el enfermo se sienta mejor por el movimiento o no. Los síntomas que reclaman el uso de Rhus en estos casos, son los dolores intensos al intentar levantarse, rigidez del cuello, de origen reumático, por sentarse en una coriente de aire; dolores reumáticos en la región inter-escapular, con mejoría por el calor y agravación por el frío. Puede también haber dolores constrictivos de los músculos del dorso, que mejoran echándose hacia atras.

Sulphur también tiene dolores reumáticos con rigidez de la región lumbar, acompañados de impotencia súbita al intentar moverse el enfermo.

Petroleum y Ruta son útiles para estos dolores reumáticos de la espalda, cuando empeoran por la mañana, antes de levantarse.

En Staphysagria, los dolores lumbares obligan al enfermo a

levantarse temprano.
Kali carb. tiene dolores agudos en la región lumbar, que se agravan a las tres de la madrugada y obligan al enfermo a levantarse a caminar. Los dolores descienden hasta los glúteos.
Ledum produce dolores en la espalda que pueden ser comparados a la sensación de rigidez que se experimenta después de estar sentado por largo rato. Hay un dolor calambroideo en las caderas al caer la noche. En la mañana, rigidez de los pies.
Valeriana produce y por tanto cura, los dolores violentos, calambroideos, como de un dardo, con sacudimientos que se presentan súbitamente en las extremidades. Se agravan por permanecer sentado y se mejoran por el movimiento. El paciente experimenta una sensación de torcedura en la región lumbar, sujeta a las mismas modalidades que los dolores en las extremidades.
Rhus está indicado en el reumatismo, no tanto en la forma inflamatoria de esta afección sino cuando hay que combatir la diátesis reumática; cuando están presentes las modalidades características antes mencionadas y cuando hay agravación por el tiempo húmedo y también por habitar casas húmedas. Otra particularidad de Rhus es que las salientes óseas éstan sensibles al tacto, por ejemplo, los huesos malares, con lo que queda demostrado que Rhus afecta el periostio; otro síntoma característico de Rhus es que el enfermo no tolera la más leve corriente de aire frío.
Rhus es de utilidad tanto en el hombre como en el caballo, cuando debido al ejercicio se presenta un sudor copioso y éste es suspendido en forma brusca por la lluvia o por la húmedad.
En estas diferentes afecciones reumáticas, deseo hacer comparaciones, en primer lugar con Anacardium, que tiene rigidez del cuello, con agravación al empezar a moverse.
Conium tiene agravación al empezar a moverse, pero hay mejoria por el movimiento continuado. Bajo la acción de Pulsatilla y Lycopodium hay mejoría por el movimiento lento.
Ferrum tiene dolores reumáticos y neurálgicos, que mejoran por el movimiento moderado en la noche.
Rhus radicans tiene dolores calambroideos y desgarrantes en las piernas; también tiene dolores en el occipucio. Es de utilidad en la pleurodinia o falsa pleuresía, cuando los dolores se extienden a los hombros. En las experimentaciones hechas por el Dr. Oslin, produjo dolores que seguían el trayecto del nervio cubital.
Kalmia latifolia, produce dolores desgarrantes que descienden a las piernas, sin hinchazón ni fiebre, pero con mucha debilidad. Por lo visto es semejante a Colchicum.
En Rhododendron hay grande susceptibilidad a los cambios atmosféricos, con particularidad al tiempo frío del invierno y cuando la atmósfera está cargada de electricidad. A más de esta susceptibilidad a dichos cambios, hay adormecimiento, sensación de reptación, etc. Dolores en las extremidades, especialmente en los huesos de los antebrazos, manos y pies; y, como en Rhus, estos

dolores se agravan por el reposo. Algunas veces el enfermo se queja de una sensación de debilidad paralítica. Los síntomas pueden moderarse durante horas y días enteros. Rhododendron es particularmente útil en el reumatismo crónico que ataca las pequeñas articulaciones. Es uno de los mejores remedios para lo que se ha llamado gota reumática. Está especialmente indicado en la hinchazón reumática con hinchazón gordo del dedo del pie, que frecuentemente se confunde con los juanetes.

Ledum es de valor inapreciable en la gota y en las afecciones reumáticas del las pequeñas articulaciones. Tiene como síntoma característico que los dolores comienzan en los pies y se propagan hacia arriba. Hay nudosidades en las articulaciones. Ledum está indicado en la gota cuando los dolores empeoran por el calor de la cama; cuando hay un estado edematoso de los pies; cuando se ha abusado de Colchicum y la acción de este medicamento asténico ha minado marcadamente las energías del enfermo. Observaremos que tanto Ledum como Colchicum producen dolores agudos y desgarrantes en las articulaciones, con debilidad paralítica de la extremidades y frialdad y adormecimiento de la superficie del cuerpo. Como en Rhus tox., el cerebro se siente como golpeado al dar un traspié. También tiene Ledum dolores calambroides en las articulaciones, con agravación por el vino; los músculos se sienten como dislocados.

Al hablar de la acción general de Rhus vimos que obra sobre el tejido celular. Es de utilidad en la celulitis, así como en la celulitis que acompaña a la difteria, y en la celulitis de la órbita con formación de pus. En esto último se distingue de Apis, que NUNCA produce la celulitis con formación de abscesos.

En el carbunco, otra forma de inflamación del tejido conectivo, Rhus está indicado al principio, cuando los dolores son intensos y las partes afectadas tiene un color rojo-obscuro. Administrado oportunamente Rhus, puede hacer abortar el carbunco. Si no cede en Rhus, es probable que más tarde tengamos que echar mano de Arsenicum, Carbo veg., o aún Anthracinum.

La acción de Rhus sobre la piel es muy notable. Produce una eritema que progresa con rapidez hacia la formación de vesículas, acompañado de edema, con formación ulterior de pus y costras. La superficie cutánea contigua a la erupción tiene un aspecto irritado.

Rhus está indicado en el eczema. Si la cara es la afectada, hay edema en el tejido celular de los párpados y dolores quemantes con comezón y latidos, distinguiéndolo esto perfectamente de Apis que tiene dolores quemantes y aguijoneantes.

También reproduce Rhus el cuadro perfecto de la erisipela vesículosa; teniendo una afinidad especial para el cuero cabelludo, la cara y los órganos genitales. Las partes afectadas tienen un color obscuro, y la inflamación invada de izquierda a derecha.

En Apis, las erisipelas invaden de derecha a izquierda; las partes afectadas tienen un color rojo rosado, de clavel, o bien púrpura

obscuro. Hay ausencia de sed; y para que encuadre este medicamento es preciso que haya edema.

En la escarlatina está indicado Rhus, especialmente en las formas adinámicas de esta afeccion, debiendo substituir bien pronto a Belladonna cuando aparezcan los síntomas siguientes : el niño se pone somnoliento e inquieto. La lengua está roja y algunas veces lisa; síntoma este muy raro en la escarlatina. Las fauces tienen un color rojo-obscuro y presentan un aspecto edematoso peculiar. Los ganglios cervicales están aumentados de volumen y puede estar agrandada la glandula parótida izquierda. Puede aun ser inminente la supuración de estas partes. El tejido celular del cuello, está inflamado de tal manera que la superficie cutánea en esta región, presenta un tinte rojo-obscuro, o azuloso y erisipelatoso. Si el niño delira, el delirio es siempre quieto. La erupción no se desarrolla completamente como es debido, y cuando brota es de color obscuro, y probablemente de forma miliar. Por lo que se ve, Rhus obra en esta forma sobre las fuerzas vitales. Produce una depresión del sensorio, lo que se demuestra por la somnolencia y el delirio tranquilo. Las secreciones se alteran, volviéndose acres. Puede haber inflamación no solo de las glándulas cervicales, sino de todos los ganglios en las distintas partes del cuerpo, especialmente de los axilares. El cuerpo sufre una demacración y el paciente se pone más débil.

Lachesis y Ailanthus siguen bien a Rhus en estos estados, pero presentan un cuadro más adinámico todavía. Ailanthus está especialmente indicado cuando la piel presenta un rash esparcido de color azuloso obscuro. La garganta está inflamada interiormente. El tejido celular del cuello está infiltrado; hay una secresión nasal excoriante. El niño está somnoliento y estúpido.

Arum triphyllum es semejante a Ailathus por cuanto tiene coriza excoriante. Las comisuras labiales están agrietadas y sangrantes. la misma saliva es acre. El niño está irritado e inquieto. (Véase la conferencia sobre las Araceas.)

Belladonna también presenta este agrandamiento e induración de los ganglios axilares, pero raras veces se piensa en él para estos estados. Es especialmente de utilidad para combatir estos síntomas cuando se presentan en las señoras durante la época de la menopausia.

Rhus está indicado en la viruela cuando las pustulas se vuelven negras, debido a la infiltración de sangre y cuando existe una diarrea con cámaras obscuras y sanguinolentas.

En el eczema, Rhus debe ser comparado con Mezereum, especialmente en los enfermos escrofuloso, cuando se forman costras duras y gruesas que se agrietan, dejando escurrir un pus abundante. La comezón es más intensa en la noche por el calor cuando el enfermo está abrigado. Algunas veces hay flictenas alrededor de las placas principales.

Nux juglans es uno de nuestros mejores medicamentos en la tiña favosa, especialmente cuando aparece en el cráneo y detrás de las

orejas. La comezón es intensa por la noche, al grado de que el enfermo duerme con dificultad. Hay escamas en los brazos y en las axilas.

En la escarlatina debe comparase con Calcarea ostrearum; las glándulas parótidas se afectan; la erupción repercute y la cara está abotagada y pálida.

Estudiemos ahora la acción de Rhus sobre las membranas mucosas. Produce coriza con secreción copiosa, enrojecimiento y edema de la garganta. Está indicado en la influenza con fuertes dolores osteócopos, estornudos y tos. La tos es seca y se agrava desde que termina la tarde hasta la media noche; (Mezereum tiene esta misma modalidad de la tos) y por descubrir el cuerpo; tos provocada por cosquilleo retroesternal. Rhus estrá especialmente indicado en estos casos cuando la afección provenga por exponerse a la humedad.

En la diarrea que reclama el uso de Rhus, las cámaras contienen sangre y mucosidades mezcladas siendo el moco amarillo-rojizo, lo que revela un carácter disentérico. Rhus está indicado en la disentería cuando las evacuaciones tienen este aspecto y hay dolores desgarrantes que descienden hasta los muslos durante la defecación. En cierta ocasión curé con Rhus un caso de viruela que había adquirido el carácter hemorrágico, estando las pústulas llenas de pus sanguinolento. Las características que me guiaron para su elección fueron las siguientes: evacuaciones de sangre con dolores desgarrantes que descendían a los muslos durante la defecación.

Como he dicho, Rhus puede estar indicado en otras afecciones inflamatorias del abdomen, cuando toman un carácter tifódico, sea que se trate de peritonitis, enteritis, tiflitis, peritiflitis o metritis. En las afecciones que se presentan durante el estado puerperal, Rhus es un medicamento de primer orden, cuando los síntomas toman el ya referido carácter tifódico.

Hay una forma de cólico que se cura con Rhus; puede ser de carácter reumático o no; el dolor se mejora por doblarse hacia adelante Y POR EL MOVIMIENTO. En este último detalle se distingue de Colocynthis, en el que también hay alivio por doblarse hacia adelante.

Ahora veremos los síntomas de Rhus en lo que se refiere a la cabeza. Hay una forma de vértigo, común en los ancianos, que se presenta tan pronto como el paciente se levanta del asiento; va asociado a sensación de pesantez en las extremidades. Sin duda, indicio de algunas modificaciones propias de la vejez, en el cerebro. Rhus tox, es uno de los medicamentos que puede paliar este estado de casos. Algunas veces se tiene la sensación de como si se moviera agua dentro del cerebro, al caminar. Para esta sensación debe compararse Rhus con los siguientes medicamentos: Cinchona, Sulphuricum acid., Belladonna, spigelia y Carbo animalis.

Rhus es de gran valor en muchas afecciones de los ojos. Es útil en la oftalmía escrofulosa cuando es forman flictenas en la cornea o alrededor de ella. La fotofobia es intensísima. Los párpados, que

también están invadidos por el proceso inflamatorio, se cierran en forma espasmódica. Si se abren por la fuerza, salta un chorro de pus amarillo. Los dolores en los ojos se agravan por la noche.

Puede usarse también en la conjuntivits ocasionada por mojarse. (Véase Calcarea ostrearum).

Rhus también puede ser usado en la iritis, sea esta de origen reumático o traumático. La inflamación puede extenderse a la coroides e invadirla y sin embargo, Rhus seguirá siendo el remedio. Hay dolores que pasan rápidamente a través de los ojos, dirigiéndose a la parte posterior de la cabeza, con agravaciones nocturnas. Al abrir los ojos, hay abundante salida de lágrimas calientes. En algunos casos, puede seguir la inflamación hasta llegar a supurar.

Rhus ha sido de utilidad en algunos casos de glaucoma.

En la celulitis de la órbita, Rhus es casi un específico. Debe darse siempre que los síntomas no reclamen otro medicamento.

Es asi mismo uno de nuestros mejores remedios en la ptósis en personas reumáticas, por exponerse a la húmedad.

El medicamento que más concuerda con Rhus en estos casos, es Causticum, pero debemos pensar también en Gelsemium, Sepia y Kalmia, cuando se trate de este síntoma. Kalmia tiene una sensación de rigidez en los párpados y en los músculos orbiculares.

La otalgia de Rhus se acompaña de latidos dentro del oído, en la noche; sensación de como si alguien soplara en el óido; silbidos, etc.; todo esto se intensifica al acostarse el paciente, como si se hubiera reventado la membrana del tímpeno.

Un síntoma de la cara que reclama el uso de Rhus en los enfermos reumáticos, es un dolor en la articulación témporo-maxilar, como si éste se fuera a romper. A cada movimiento de masticación la mandíbula cruje. La fácil dislocación del maxilar reclama el uso de Rhus. En esto es semejante a Ignatia y Petroleum.

Rhus puede estar indicado en la odontalgia cuando los dolores empeoran por las aplicaciones frías y mejoran por el calor. Sin embargo, hay una excepción a estos casos y es la odontalgia errática en la que hay una mejoría pasajera aplicando la mano fría sobre la región afectada. Los dientes se sienten como flojos o como si estuvieran demasiado largos y entumecidos. Las encías están adoloridas y se sienten como ulceradas.

Rhus puede estar indicado en las diversas formas de parálisis, especialmente en los pacientes reumáticos, cuando la afección es el resultado del ejercicio exagerado o de estar expuesto a la humedad, como acostarse sobre el suelo húmedo. En este último caso la afección puede tener su origen en la inflamación reumática de las meninges o de la médula. Sin embargo, si la exposición a la húmedad provoca una mielitis, Dulcamara será el remedio más apropiado.

Rhus puede ser también de utilidad en la parálisis espinal aguda infantil.

En estas diversas formas de parálisis, Sulphur tiene una acción complementaria respecto de Rhus.

Dd compuestas

Vamos a estudiar en seguida las plantas del órden de las Compuestas; es un grupo muy extenso y del cual obtenemos un buen número de drogas; a saber: Arnica, Chamomilla, Cinna, Eupatorium perfoliatum, Eupatorium purpureum, Artemisia vulgaris, y Absinthium, obran también sobre la médula y el cerebro; viene después Millefolium; Eupatorium perfoliatum y Eupatorium purpureum, tiene acción en las fiebres; y por último Taraxacum sobre el hígado.

Vamos a proceder a estudiar el primero de estos medicamenots.

Arnica montana

También es llamada comunmente veneno del leopardo. La tintura debe prepararse con las raíces de la planta, más bien que con las flores; pues estas son infestadas por un insecto cuyo cuerpo y huevos, al ser incluídos en la tintura, modifican considerablemente la acción de la droga pura, y naturalmente le agregan síntomas ajenos a la acción genuina de Arnica. También se encuentra un aceite esencial en las flores de esta planta que difiere más o menos del aceite que se obtiene de sus raíces. No me explico por qué se le ha dado a esta planta tan poco venenosa, el nombre de veneno del leopardo. Si es cierto que se han dado algunos casos de defunción debidos a su uso excesivo, casi todos se han referido a las preparaciones obtenidas con las flores; por tanto, no es difícil que a esto hayan obedecido los resultados fatales.

La especie de Arnica, que es oficinal en nuestra Materia Médica, o sea la Arnica montana, no se da en América pues es indígena de Europa; tiene un aceite esencial que contiene un alcaloide no bien conocido, llamado Arnicina y una substancia amilácea, conocida con el nombre de Inulina. Para comprender debidamente los efectos de Arnica en su totalidad, debemos saber cómo afecta a los vasos sanguíneos ¿Cómo obra exactamente? me es difícil decirlo, porque no está claramente definido en mi mente; pero puedo hablarles de sus efectos y explicarlos. Afecta de tal manera los vasos sanguíneos, con particularidad los capilares, que hace posible la dilatación de estos pequeños vasos y la extravasación de la sangre. Este debilitamiento de las paredes capilares que permite la extravasación, explica el uso de Arnica en las afecciones traumáticas; así como también en los estados tifoideos. Ahora bien, teniendo en cuenta que Arnica altera los capilares en esta forma, de tal manera que la sangre puede escaparse a través de sus paredes, podremos comprender sus síntomas. Parece producir un estasis venenoso que de lugar a extravasación. Esta extravasación o escurrimiento de sangre, no puede verificarse en un vaso sano.

Arnica está indicado en los efectos agudos y crónicos de las constituciones. Los casos a los que se adapta Arnica, son : contusiones simples en las que las equímosis están bien marcadas ;

confusiones cerebrales y espinales o cerebro-espinales. En estos últimos casos Arnica es un medicamento sin igual. Incluso la compresión cerebral está comprendida en la acción curativa de Arnica, ya sea resultado del desplazamiento de un fragmento óseo, consecuencia de una fractura craneana o de un derrame sanguineo en la cavidad. En el primero de estos casos, claro esta, Arnica no podra curar, pues habra necesidad de recurrir a medios quirurgicos para conseguir la curación permanente. Puede hacerse uso de Arnica en las contusiones musculares producidas por un esfuerzo violento o por una torcedura repentina, como cuando se levantan grandes fardos y en las hemorragias de origen mecánico. Las fracturas óseas pueden reclamar el uso de Arnica, tanto al exterior como al interior, para aliviar la tumefacción de las partes afectadas, asi como los subsaltos musculares que aparecen como síntomas reflejos de las fracturas. En los efectos cronicos de las contusiones se puede usar Arnica, en las enfermedades que, siendo aparentemente extrañas a la sintomatología del medicamento, reconocen, sin embargo, un orígen traumático. No importa qué enfermedad sea, del cerebro, de los ojos, del los pulmones, de los nervios, si la causa productora ha sido una contusión la indicación de Arnica será correcta.

Además, como Arnica obra indudablemente sobre el tejido muscular mismo, puede ser de utilidad en las enfermedades de los mismos músculos; por ejemplo, cuando se ha estado trabajando afanosamente, resultando de esto un adolorimiento o magullamiento de todo el cuerpo, dando una sensación de como si estuviera golpeado, o también, cuando el trabajo rudo ha producido una hipertrofia cardíaca. Esto último. estrictamente hablando, no es una enfermedad, pero sus consecuencias últimas, si conducen a ella. El corazón es un musculo que puede, bajo el estímulo del ejercicio desarrollarse tanto como sucede por ejemplo con el biceps. Como resultado de la hipertrofia cardíaca, el enfermo se queja de hinchazon en las manos, con cualquier ejercicio. La mano toma un tinte más rojo de lo natural y se hincha cuando el brazo es suspendido. Se verá que el pulso es lleno y fuerte. Cuando ha llegado a este punto la hipertrofia cardíaca, se presentan síntomas locales además de los ya mencionados. El corazón se siente como si fuera comprimido con fuerza por una mano; el pecho todo, está dolorido y magullado y el enfermo no tolera el roce de la ropa.

La sensación de opresión cardiaca como por una mano, nos recuerda desde luego a Cactus. Sin embargo, en Cactus, estos síntomas no son de origen traumático.

La sensibilidad del pecho nos recuerda a Lachesis, pero Arnica se distingue en que no hay, como en aquel la sensibilidad de los nervios periféricos, sino una verdadera sensación de magullamiento, producida por la plenitud de los vasos sanguíneos.

Otros medicamentos que deben ser comparados con Arnica en la hipertrofia cardíaca, son :

Rhus tox., especialmente si existe una diátesis reumática.

Arsenicum si es el resultado de ascender a lugares elevados.
Bromium También se ha usado con éxito en estos casos.
Voy a mencionar ahora los síntomas tifoideos de Arnica, que, aunque muy diferentes a los que acabo de señalar, dependen, sin embargo, del mismo estado de los vasos sanguíneos.
Los cambios verificados en estos por las toxinas de la tifoidea, favorecen la formación de equimosis en diferentes partes del cuerpo. Hay también una congestión cerebral pasiva; que se manifiesta por la somnolencia y la indiferencia a todos los que le rodean y aún a su misma enfermedad. El enfermo se queda dormido al contestar las preguntas que se le hacen, justamente como sucede en Baptisia. Con estos síntomas encontramos, casi siempre, que "la cabeza está caliente y el cuerpo frío, o al menos, no está caliente", traduciendo esto una gran diferencia entre la temperatura de la cabeza y la del resto del cuerpo. Este síntoma ha sido confirmado muchas veces y es bueno tenerlo siempre presente. El paciente se queja de una sensación de magullamiento en todo el cuerpo, al grado de que la cama la siente demasiado dura. Está inquieto y cambia de sitio en su propia cama, buscando un lugar blando para descansar; sin embargo, la causa no radica en la cama sino en él mismo. Aparecen equimosis en el dorso, debidos a la congestión hipostática. Los pulmones se afectan revelándose también en esto, la naturaleza de la acción de Arnica.. Hay una tos con expectoración de moco y sangre. Si conserva el conocimiento, se queja de una sensación de adolorimiento y magulladura en las paredes torácicas. A medida que la enfermedad avanza, Arnica puede estar indicado cuando la presión sanguínea en el cerebro, es suficientemente fuerte para producir síntomas apopléticos. La respiración se vuelve difícil y aún estertorosa. La mandíbula inferior está colgante. Aparecen petequias en la piel y las materias fecales y orina, escapan involuntariamente; el enfermo, como es natural, yace en estado de estupor. Los síntomas tifoideos precedentes, son los que corresponden a Arnica.
Ahora veremos su acción muscular: Arnica produce una verdadera mialgia, presentándose dolores musculares en cualquier parte del cuerpo; son de origen traumático o pueden venir por el ejercicio exagerado; las partes afectadas se sienten doloridas y magulladas, detalle tan importante para la elección del medicamento.
Arnica puede emplearse en el reumatismo; no en el verdadero reumatismo inflamatorio, sino en el reumatismo local que sobreviene en tiempo de invierno y que parece ser resultado de los efectos combinados de la exposición a la humedad y el frío, y de las torceduras musculares causadas por un ejercicio brusco. Las partes afectadas se sienten doloridas y magulladas, aumentando esta sensación por cualquier movimiento. Hay dolores agudos de dardo, que se extienden del codo al antebrazo o de las piernas a los pies; éstos se hinchan frecuentemente y se sienten magullados. Para los contusiones, los medicamentos en que debe pensarse, relacionados con Arnica, son los siguientes : primero Rhus tox., que como se ha

dicho ya más de una vez, es de preferirse a Arnica en la contusión de las articulaciones y de los ligamentos. Rhus obra sobre los tejidos fibrosos. Arnica se adapta a la tumefacción de los otros tejidos.

Debe pensarse en Calendula para las heridas con desgarro y posiblemente con pérdida de substancia. Calendula, combatiendo la inflamación de las partes afectadas, favorece la formación de granulaciones cicatriciales.

Hypericum debe sústituir a Arnica cuando han sido lesionados los nervios a la vez que las demás partes blandas. Hyperiucm no tiene rival en las machacaduras de los dedos, pues alivia el dolor y promueve la cicatrización; frecuentemente sigue bien a Arnica en las conmociones medulares. El Dr. Ludlam, de Chicago, es partidario de Hypericum en estos accidentes medulares. Ha aliviado algunos casos graves con él.

Otro medicamento útil es Staphysagria; presta servicios en las heridas de bordes regulares tales como las quirúrgicas y por lo tanto, está indicado en los síntomas resultantes de esta clase de operaciones. Aún cuando los síntomas subsecuentes a una operación no tengan relación aparente con la patogenesia de Staphygrasia, son de esperarse buenos efectos de su aplicación, cuando reconozcan este origen.

Ledum sigue a Arnica, cuando éste no ha aliviado el dolorimiento; es también de utilidad en las heridas causadas por armas punzantes y en las heridas punzo-cortantes.

Symphytum officinale, es el remedio adecuado para las contusiones óseas. Por ejemplo, cuando un golpe sobre el ojo, afecta las láminas orbitarias del hueso frontal. Después de las amputaciones, puede administrarse en la irritabilidad del muñón; así como en la irritabilidad del punto de unión de los huesos fracturados. Si este último síntoma es resultado de la nutrición defectuosa, debe pensarse en Calcarea phosphórica.

Puede administrarse Arnica como preventivo en la pioemia. Algunos médicos creen que este medicamento promueve la evacuación del pus. haciéndolo salir a la superficie. Ciertos cirujanos, prescriben Arnica al interior y en aplicaciones locales, después de las intervenciones, con el fin de evitar la pioemia.

En esta propiedad de Arnica, se funda la costumbre inveterada de muchos médicos, administrando la droga a las parturientas después del alumbramiento. Tiende a aliviar el adolorimiento consecutivo al trabajo del parto y promueve las contracciones normales del útero, y la expulsión de los coágulos y fragmentos de membranas que pudieran haber quedado retenidas.

Arnica tiene acción sobre la piel produciendo furúnculos en todo el cuerpo. Se inician por dolor y llegan hasta la supuración, siendo seguidos de otros brotes. Puede usarse también en los abscesos y diviesos que han supurado parcialmente, pero que en vez de evacuar el contenido, se retraen por la absorción del pus. Arnica aplicado interior y exteriormente corrige este defecto, llevándolos a su

maduración.
Siguiendo el estudio de Arnica, deseo llamar la atención acerca de los efectos que produce en el canal alimenticio. Está indicado en la dispepsia, cuando después de las comidas hay amenaza de apoplejía con cefalalgía pulsátil y somnolencia; también cuando hay cierta dificultad en la digestión; el aliento es fétido; hay sarro viscoso y amarillento en la lengua; eructos que tienen sabor de huevos pudridos; distensión timpánica del abdomen y deyecciones fétidas.
El cólera infantil, la diarrea y la disentería, pueden reclamar el uso de Arnica, cuando las evacuaciones son fétidas, viscosas, sanguinolentas y hasta purulentas, acompañadas de gran urgencia y esfuerzo para defecar. Los síntomas dispépticos antes señalados, estarán presentes y habrá dolores agudos y pungitivos en las paredes del abdomen. El enfermo tiene sed y sin embargo no sabe qué es lo que desea beber.
Para terminar mis observaciones acerca de Arnica, deseo hacer mención de su aplicación en la tos ferina. Está indicado en los niños cuando la tos es violenta y hay cosquilleo, pareciendo ser excitado cada vez que el niño se encoleriza. Se le va la respiración cada vez que llora y empieza a llorar antes de los paroximos. ¿Por qué? porque hay adolorimiento de los pulmones y la tráquea; el niño sabe lo que le va a pasar y teme el dolor. Tal es la interpretación de este síntoma. La expectoración es espumosa y viscosa y siempre mezclada con sangre.
En la compresión cerebral por la extravasación de sangre en los casos de apoplejía, puede ser de utilidad Arnica; cuando como consecuencia de esto hay hemiplegía, hay un adolorimiento y magulladura en todo el cuerpo; las úlceras por decúbito se forman rápidamente.

Artemisia vulgaris

Artemisia vulgaris es otro miembro del órden de las Compuestas; se trata de un medicamento útil en la epilepsia, cuando los ataques sobrevienen después de emociones violentas y especialmente después de un susto; cuando se suceden muy de cerca; es decir, cuando se repiten con frecuencia y a cortos intervalos, siendo seguidos de largos períodos de reposo. Los paroxismos van generalmente seguidos de sueño. Además, Artemisia vulgaris parece ser de cierta utilidad en la epilepsia llamada "pequeño mal". Caminando por la calle, el enfermo se detiene súbitamennte, fija la mirada en el vacío y probablemente murmura algunas palabras; recupera su estado normal y sigue su camino, completamente desapercibido de que algo extraordinario le aconteció.
Artemisia, como algunos otros miembros del orden de las Compuestas (de estas es Cina, que tiene una acción mas marcada que las demás) obra sobre los ojos. Produce este síntoma : "una luz coloreada ocasiona vértigo"; por ejemplo, recibiendo los rayos

luminosos através de una ventana de vidrios de colores; además produce una astenopía bien desarrollada, que se revela por el siguiente síntoma; al tratar de hacer uso de la vista, el enfermo experimenta un dolor en los ojos, juntamente con empañamiento de la vista, mejorándose momentáneamente por restregárselos. Esto se explica fácilmente: la astenopía obedece a un defecto muscular y a errores de acomodación, restableciéndose temporalmente esta irregularidad, por restregarse los ojos.

Absinthium

Absinthium, otra planta del género Artemisia, familia de las Compuestas, nos interesa no solo como medicamento, sino también porque encontramos casos de intoxicación en las personas que abusan de ella como bedida. Los primeros efectos mentales del ajenjo son el buen humor, que pronto es seguido de resultados nocivos, entre los que se encuentra el delirio horrible, durante el cual el enfermo se ve obligado a pasearse contínuamente. Este síntoma se observa en todos los medicamentos del orden de las Compuestas, Chamomilla y Cina tienen mejoría por el movimiento y en Artemisia hay deseo de estar moviéndose; bajo la acción de Absinthium el enfermo se pasea con angustia, viendo visiones de toda especie. Podemos hacer uso de Absinthium en el insomnio de la fiebre tifoidea cuando hay congestión cerebral de la base.

Millefolium

Nos interesa como medicamento en las hemorragias pulmonares, uterinas o intestinales de origen mecánico. La sangre es generalmente de un color rojo rutilante y generalmente profusa.

Se distingue de Aconitum por la carencia de ansiedad.

Taraxacum officinale

Llamado también diente de león, es un prominente medicamento para el hígado. Si se ingiere durante algún tiempo, produce una afluencia abundante de bilis; los síntomas que nos guiarán en su elección, son : lengua "mapeada", sabor amargo de la boca, escalofrío después de comer o beber, dolor y sensibilidad en la región hepática y diarrea biliosa. Se hizo mención de su uso en la fiebre tifoidea en la conferencia anterior.

Eupatorium perfoliatum

Llamado "compone huesos", "rompe huesos, etc., es un medicamento popular en las regiones palúdicas para combatir las "calenturas" y "frios". Está indicado en las enfermedades que presentan los síntomas siguientes : el escalofrío empieza con sed y cefalalgía, entre las siete y las nueve de la mañana; se inicia por la espalda y va acompañado de adolorimiento de las extremidades, como si todos los huesos del cuerpo fueran a romperse. A esto sigue una calentura elevada y exacerbación de los dolores, presentándose

después un sudor, que algunos dicen que es escaso, en tanto que otros sostienen que es profuso. En algunos casos hay una doble periodicidad, presentándose el escalofrío un día en la mañana y al siguiente, al caer la noche.

Eupatorium purpureum se ha usado en estos casos, cuando el escalofrio comienza por la espalda. No conozco ningún síntoma que lo distinga de Eupatorium Perfoliatum. Debemos tener en cuenta a este último en la influenza, con ronquera que se agrava por la mañana y tos con extremada sensibilidad a lo largo de la tráquea e incluso hasta las finas ramificaciones de los bronquios. Juntamente con estos síntomas, estarán presentes los ordinarios del medicamento : adolorimiento en todo el cuerpo, etc.

Abrotanum

La Artemisia abrotanum se adapta a las inflamaciones de la médula que se presentan súbitamente y a la mielitis crónica. Hay dolores sordos y repentinos en la espalda, que se alivian por el movimiento, con parálisis y adormecimiento. Está indicado especialmente en los enfermos reumáticos, con sensación de estropeo y rigidez en las articulaciones. Es de utilidad en esa clase de enfermos que están sufriendo a consecuencia de una enfermedad suprimida, habiendo una tendencia marcada a la metastasis. De este modo, el reumatismo, sea espontáneamente o por efecto de un tratamiento inadecuado, desaparece de las extremidades y ataca el corazón. También después de la extirpación de las hemorroides o de la detención de una diarrea, sobrevienen síntomas gástricos.

Abrotanum es también uno de los medicamentos aplicable en los casos de metastasis de la parotiditis a los testículos o a las glándulas mamarias, debiendo colocarse a lado de Pulsatilla, Carbo vegetabilis y quizá Arsenicum.

Está igualmente indicado en el marasmo de los niños débiles que están extenuados, arrugados, pálidos, y con ojeras azulosas, hambre insaciable y abultamiento del abdomen; pueden distinguirse de otros medicamentos que tienen síntomas análogos, especialmente por el hecho de que la extenuación se inicia por las extremidades inferiores.

Dd cina y chamomilla

Las virtudes medicinales de Cina se deben en gran parte, aunque no exclusivamente, a un prinicipio activo venenoso que contiene la planta, llamado Santonina, cuyo punto central de acción son los ganglios abdominales, de donde se reflejan las impresiones nerviosas a todas las demás partes del cuerpo, pero de un modo especial al cerebro y a la médula, Como resultado de esta acción primaria sobre los ganglios abdominales, se presentan síntomas reflejos, contorsiones, convulsiones, subsaltos de las extremidades, y aún violentas convulsiones de carácter tónico También hay estrabismo.

Bajo la influencia de Cina la cara está pálida y de paso diré que conserva este color aun cuando se presente la fiebre. Este síntoma se encuentra parcialmente en lpecacuanha y Bryonia. En Cina generalmente la palidez de la cara va asociada a círculos obscuros alrededor de los ojos. Las pupilas están dilatadas. El niño rechina los dientes durante el sueño y también se pica o escarba la nariz con los dedos. El sueño es intranquilo y hay gritos durante el mismo. Esta es la acción general de Cina. Ahora ya se sabe qué podemos esperar de ella. Tomando estos síntomas en cuenta, nos inducen a la aplicación de Cina, cuando hay parásitos intestinales. El análisis más escrupuloso de la experimentación clínica, ha demostrado que Cina es una agente poderoso para eliminar los ascárides. El aspecto enfermizo de la cara, los círculos obscuros alrededor de los ojos y el rechinar de los dientes, asociados a una hambre canina, nos dan un cuadro perfecto de la patogenesia de este medicamento. Cina corrige a tal grado los órganos abdominales y tonifica de tal manera sus ganglios, que normaliza la secreción de la mucosa intestinal, de modo que no teniendo los parásitos un pábulo adecuado para subsistir, mueren y son expulsados. Este es pues, el uso que hacemos de Cina. Para los oxiuros, esos pequeños parásitos que aparecen en las márgenes del ano y penetran en el recto Cina no es de ningún provecho, pues los síntomas que ocasionan no corresponden a los del medicamento. Para estos parásitos tenemos otro grupo de medicamentos.

Aconitum, cuando el niño está febricitante y no puede dormir. Cuando el niño solamente tiene una marcada excitación, puede recurrirse a Ignatia.

Indigo es el mejor medicamento para las convulsiones que resultan de las lombrices.

Si los medicamentos mencionados fallan, deberemos pensar en Quasia.

Caladium sequinum es el mejor remedio para las niñas, cuando las lombrices, pasando el periné se introducen a la vagina. La irritación así producida, puede provocar la masturbación.

También podemos hacer uso de Cina en las afecciones de los ojos, especialmente en la astenopía por defecto de acomodación ; cuando el enfermo trata de leer, empiezan a dolerle los ojos; las letras se opacan y una nube cubre la vista. Hay mejoría por restregarse los ojos; este mismo estado, como ya he dicho, se presenta en Artemisia vulgaris.

Un efecto muy peculiar de Santonina sobre la vista, es que los objetos se ven amarillos.

Teniendo Cina síntomas espasmódicos en su patogenesia, es de esperarse que sea de utilidad en la tos ferina, en la que está indicado cuando los síntomas se presentan con irregularidad de día y de noche, yendo acompañados de convulsiones tónicas. Inmediatamente que termina el acceso, se oye un ruido de gorgoteo en la garganta. Cina también puede ser de utilidad en la tos refleja causada por la

irritación de las lombrices.
Como síntoma concomitante a todos los estados anteriores, estará presente el temperamento de la droga. Está indicado en los niños irritables, nerviosos y enfadosos; se obstinan y no permiten que nadie se les acerque o los toque.
Cina parece ejercer cierto efecto sobre la vejiga, produciendo enuresis, generalmente durante el primer sueño; la orina es blanca y turbia y algunas veces de olor muy fuerte.
Cina no se usa con frecuencia en la fiebre intermitente; pero algunas veces está indicado cuando hay sed durante el escalofrío y en algunas ocasiones durante la calentura. La cara está pálida durante el período pirético; también hay vómitos; hambre canina, con lengua limpia.
Cina, como muchas otras plantas del orden de las Compuestas, presenta mejoría por el movimiento.

Chamomilla

La Chamomilla de la Materia Médica Homeopática es la variedad alemana, o sea la Chamomilla matricaria. Este medicamento aparentemente obra mejor en las personas que tienen una sensibilidad morbosa del sistema nervioso. Por tanto, es como Coffea, Ignatia y Belladonna, en lo que tienen de común disminuyendo la excitabilidad nerviosa.
Impresiones leves producen aflicción y angustia mental; los dolores con frecuencia causan desmayos; en esto se parece a Valeriana, Hepar, -Veratrum alb. y Nux moschata. Se aplica de un modo especial a estos síntomas, cuando provienen del uso prolongado de los narcóticos.
En todas las enfermedades que reclaman el uso de Chamomilla, observaremos la excitabilidad peculiar. En enfermo, sea niño, adulto, o una mujer durante el parto o con odontalgía, está malhumorado y excitable. Si no está presente el estado mental precitado, es muy probable que Chamomilla falle. Cuando las emociones violentas, como una cólera, afectan las visceras, el hígado, por ejemplo, produciendo ictericia, puede pensarse en este medicamento. En estos casos, Chamomilla tiene relación con algunos otros remedios.
Staphysagria está indicado en el cólico de los niños o adultos después de un acceso de cólera.
Bryonia tiene síntomas gastro-entéricos después del mismo acceso, pero van asociados al escalofrío, en tanto que en Chamomilla van acompañados de calor; bajo la acción de Bryonia la cara tiene un color rojo-obscuro; en Chamomilla es pálida con una mejilla roja.
En Bryonia la lengua tiene un sarro blanco, en Chamomilla el sarro amarillo.
Colocynthis tiene vómitos, diarrea y violentos dolores cólicos debidos a un acceso de cólera, pero se distingue fácilmente por el hecho de que los dolores mejoran doblándose hacia adelante y por la presión firme.

Siguiendo con los síntomas nerviosos de Chamomilla, lo encontraremos indicado en el insomnio de los niños, cuando se estremecen durante el sueño y hay contorsiones de los músculos de la cara y de las manos. Juntamente con estos síntomas es probable que haya cólico; la cara, especialmente uno de los carrillos, está roja y la cabeza bañada en sudor caliente.

Una explicación : algunas veces durante el acceso de fiebre en los niños, hay enrojecimiento del carrillo del lado sobre el que se acuestan; pero este no es un síntoma de Chamomilla. Los síntomas nerviosos de Chamomilla, son generalmente reflejos abdominales; el delirio apenas si se nota en estos casos. Cuando hay complicaciones cerebrales, Chamomilla deja de estar indicado cediendo su lugar a Belladonna.

Durante la dentición cuando falla Chamomilla, Belladonna será el remedio porque se adapta a un estado más avanzado de la afección.

Este mismo estado nervioso puede reclamar el uso de Chamomilla en el reumatismo. Los dolores reumáticos echan al enfermo de la cama y lo obligan a pasearse o a caminar. El paciente tiene sed, está agitado y casi fuera de sí por la angustia.

Los medicamentos análogos en este caso son : Rhus, que carece de la excitación de Chamomilla; Ferrum metall., que produce reumatismo, cuyos dolores mejoran caminando lentamente; Veratrum alb., que tiene dolores que enloquecen al enfermo y lo obligan a caminar. Este último carece del estado febril y de la excitación que caracterizan a Chamomilla.

Chamomilla obra también sobre las membranas mucosas, produciendo fenómenos catarrales. Está indicado en el catarro de los niños cuando la nariz está obstruída, y no obstante hay afluencia de moco caliente y acuoso por las ventanas nasales; hay estornudos e imposibilidad para dórmir; una tos seca y molesta, mantiene al pequeño; en estado de vigilia, pudiendo presentarse esta tos también durante el sueño; o bien hay una tos estertorosa, como si los bronquios estuvieran llenos de moco. Especialmente está indicado Chamomilla para los resfríos ocasionados por el tiempo frío y airoso.

Nux vóm. está indicado en los catarros cuando hay una sensación de obstrucción en la nariz pero no hay secreción.

Sambucus también está indicado en el catarro cuando los niños se extremecen súbitamente como si fueran a ahogarse.

Sticta se adapta a la tos dura, seca y perruna; la nariz está obstruída y seca. El verdadero estado de cosas es el siguiente : la secreción de las fosas nasales se seca tan rápidamente, que no se puede desalojar.

Chamomilla tiene un buen número de síntomas gástricos. Es de utilidad en los estados biliosos ocasionados por un coraje; también está indicado en la gastralgia, especialmente cuando los alimentos ingeridos parecen caer como un peso en el estómago. Hay distención de los hipocondrios; la lengua está cubierta de un sarro blanco-amarillento y hay sabor amargo en la boca. Hay cólicos abdominales

que se mejoran tomando café.
Chamomilla produce diarrea con evacuaciones calientes, verde-amarillentas, con apariencia de huevos revueltos; frecuentemente están mezcladas con bilis, produciendo escoriación del ano y dando un olor a hidrógeno sulfurado. Se agrava especialmente al caer la noche y es probable que se presente durante la dentición.
En estos casos, Sulphur frecuentemente sigue bien a Chamomilla, pues ambos producen evacuaciones del mismo aspecto, con adolorimiento del estómago. Si con estos síntomas hay fuerte tenesmo, Mercurius será el remedio.
Si las deposiciones se agravan por la mañana y se presentan en chorro, debemos pensar en Podophyllum y Sulphur.
Chamomilla es un medicamento inapreciable durante el parto; está indicado cuando los dolores comienzan en la espalda y se extienden a la cara interna de los muslos; la excitación nerviosa es considerable, pareciendo el parto excesivamente doloroso. Cuando éste ha terminado, los loquios son obscuros y demasiado abundantes, siendo los entuertos violentos e intolerable.
Puede usarse Chamomilla en la amenaza de aborto producida por un coraje, cuando los dolores son como los que he descrito y hay flujo de sangre obscura.
Viburnum es de utilidad en el conato de aborto cuando los dolores descienden a la parte inferior del abdomen y se extienden también a los muslos. Viburnum quitará los dolores aun cuando no se evite el aborto.

Dd melantaceas
Entre las Melantáceas contamos los siguientes medicamentos : Veratrum album, Veratrum viride, Sabadilla y Colchicum.
Veratrum album tiene acción sobre la mente y el abdomen; Veratrum viride, sobre la circulación; después viene Sabadilla; y por último Colchicum que obra sobre los nervios, abdomen, tejido fibroso y órganos.
Estoy persuadido que de estos medicamentos, Veratrum album y Veratrum viride, son lo bastante conocidos en sus efectos patogénésicos y por conscuencia, no es probable que se apliquen equivocadamente. También estoy persuadido de que Colchicum no ocupa en la práctica el lugar que le corresponde. Es cierto que nos viene de la escuela alopática, eminentremente recomendado en la gota. El uso inmoderado que de este medicamento hace la antigua escuela, no nos debe colocar en el extremo opuesto, despreciádolo del todo.

Colchicum autumnale
He arreglado los síntomas de Colchicum, bajo cuatro rubros. El primero corresponde a los nervios; incluye los estados tifódicos y la debilidad. Hay que tener en cuenta que este medicamento tiende a

producir una gran postración y de ahí el peligro que entraña su uso rutinario a grandes dosis en la gota y el reumatismo. Si es cierto que usado en esa forma puede aliviar el paroxismo doloroso, también es cierto que puede ocasionar tal estado de debilidad, que expone al enfermo a nuevos sufrimientos y peligros. Veamos cómo podemos aprovechar estas propiedades de Colchicum de acuerdo con nuestra Ley terapéutica. Lo encontramos indicado en la debilidad, particularmente en la que sobreviene por la pérdida del sueño; por ejemplo, cuando uno se acuesta más tarde de la hora de costumbre y en consecuencia duerme algo menos que lo habitual : se levanta a la mañana siguiente sintiéndose con fatiga y languidez. Apenas si puede hacer con las piernas los movimientos necesarios para andar; el apetito es nulo; hay mal sabor en la boca y náuseas. La debilidad depende de la mala digestión o acompaña a la mala digestión como resultado de la pérdida del sueño. Por esto veremos cuán parecido es este estado, al que reclama el uso de Nux vómica. Sin embargo, la debilidad es aún mayor que la de este medicamento. En ocasiones parece haber disgusto por todos los alimentos. El olor de los alimentos que se están cocinando, hace que el enfermo se sienta mal; se vuelve irritable; cualquiera impresión externa le molesta, siendo en esto, precisamente como en Nux vómica.

Otra forma de debilidad o de fiebre debilitante en que está indicado Colchicum, algunas veces es la tifoidea. Ahora bien, en esta fiebre, Colchicum ocupa un lugar entre Arsenicum y Cinchona. En primer lugar encontramos que el enfermo tiene ofuscada la inteligencia; pero no obstante esto, contesta las preguntas correctamente, lo que demuestra que el estupor no es completo. A menos que se le pregunte acerca del estado de su galud, nada dice de ello, pues le parece que su enfermedad no es de peligro. No existe esa timidez, ese temor a la muerte que es caraterístico de algunos otros medicamentos indicados en la fiebre tifoidea. Las pupilas están ampliamente dilatadas y su sensibilidad a la luz es imperfecta : hay sudor frío en la frente y en esto desde luego encontraremos semejanza con Veratrum album.

Cuando el enfermo trata de levantar la cabeza de la almohada, vuelve a caer hacía atrás y la boca se abre completamente; con esto se verá cuán débiles se encuentran los músculos en los casos que reclaman el uso de Colchicum.

La cara tiene un aspecto cadavérico; los rasgos fisonómicos están afilados y hundidos; la nariz se ve como si se hubiera pinchado u oprimido fuertemente y las ventanas de la nariz están secas y negras. La lengua está pesada y rígida, pudiendo sacarla sólo con dificultad. En casos extremados es de color azuloso, particularmente en su base. El habla casi se pierde por completo y el aliento es frío. Con frecuencia hay náusea y vómito, este último acompañado de arqueo considerable. Estos síntomas van asociados a inquietud y calambres en las piernas. En lo que se refiere a las regiones abdominales, nos encontramos que el cuerpo está caliente; mientras que las

extremidades están frías. El timpanismo es extraordinariamente marcado. Las deyecciones son acuosas y frecuentes, escapándose involuntariamente. Estos serán los síntomas que nos guíen para indicar a Colchicum en los estados tifódicos. Tienen gran semejanza con los que reclaman el uso de Arsenicum y China. Se parecen a Arsenicum en la debilidad tan intensa y a China en el timpanismo. Colchicum parece ocupar un lugar intermedio entre los dos, combinando la inquietud y debilidad de Arsenicum, con el timpanismo de China. Se observará que los síntomas de Colchicum son esencialmente abdominales; algunos de ellos nos recuerdan a Veratrum album. Por lo tanto, hay que tener siempre presente a este último a lado de Colchicum, para distinguirlos uno del otro.

Carbo veg. se asocia a Colchicum, en la frialdad del alíento, en el timpanismo y en la postración tan notable. Pero Carbo veg. parece adaptarse a los casos en que hay agotamiento de las energías vitales. El enfermo yace frío y casi sin pulso; apenas es percibido como una ligera onda bajo el dedo, pues no es un pulso franco; los pies y las piernas, de las rodillas para abajo, están fríos o puede haber frialdad en las rodillas y en los pies, estando las regiones intermedias en su calor natural. Además, las deposiciones acuosas, no son tan características de Carbo veg.; las evacuaciones son nulas o si las hay, son de color café obscuro y horriblemente fétidas.

En seguida vamos a estudiar los síntomas abdominales. El timpanismo y la diarrea ya han sido mencionados. Además de estos síntomas, hay otros que indican marcadamete el uso de Colchicum como un medicamento posible en el cólera. Hay náusea y vómitos, siendo la náusea provocada, al parecer, por el olor de los alimentos; siempre que el enfermo se incorpora, se agrava tanto la náusea como el vómito; el vómito es acuoso y bilioso. Cuando hay síntomas disentéricos, las evacuaciones son frecuentes, acuosas y sanguinolentas; conteniendo girones debidos a las formaciones plásticas procedentes del exudado; el tenesmo es violento y va seguido de espasmo del esfínter anal. Si nos encontramos un caso de disentería con estos síntomas, Colchicum nos sacará de apuros. Si además hay timpanismo, Colchicum estará más indicado todavía, siendo entonces preferible a Cantharis, Mercurius o a cualquier otro medicamento.

El tercero de los rubros, en que hemos dividido el estudio de este medicamento, comprende el tejido fibroso. Esto nos insinúa a estudiar a Colchicum en el reumatismo y la gota.

Colchicum tiene afinidad por el tejido fibroso, comprendiendo en este término, los tendones, las aponeurosis, los ligamentos y aún el periostio. La hinchazón que produce Colchicum es de color rojo obscuro a rojo claro, sin tendencia marcada a la supuración, extremadamente sensible al tacto y con propensión muy marcada a cambiar de una articulación a otra. En el reumatismo propiamente dicho, Colchicum está indicado, cuando la enfermedad empieza en una articulación y de ahi se extiende a otra; o bien empieza en un

lado del cuerpo y rápidamente cambia al otro. Los dolores se agravan al caer la noche; estando la articulación afeetada extremadmente sensible al menor movimiento; la orina es de color rojo obscuro y escasa, justamente como es de esperarse en la gota o en el reumatismo. Estos pacientes son excesivamente irritable; cualquiera impresión ligera, como la luz, el ruido o los olores fuertes, les molestan y el dolor les parece intolerable. La única diferencia que hay entre estos síntomas y los de la gota, es que en ésta está interesado el dedo gordo del pie y los accesos se presentan por la noche.

Algunas veces hay metástasis del reumatismo o de la gota al pecho. Aún en estos casos, puede estar indicado Colchicum. En las afecciones valvulares del corazón y en la pericarditis que siguen al reumatismo, está indicado por los dolores violentos, cortantes y pungitivos del pecho, particularmente alrededor del corazón y disnea. También existe la sensación de como si el pecho estuviera fuertemente oprimido por un vendaje apretado. La acción de Colchicum en la gota y el reumatismo, es casi única; no tiene análogos en estos casos.

Algunas veces está indicado en la hidropesía con supresión de la orina, teniendo la particular propensión a afectar la forma de hidrotórax. La poca orina que se segrega, contiene sangre, de color casi negro como la tinta y está cargada de albúmina. Por esto se verá que está indicado en la hidropesía consecutiva al mal de Bright. En esto se parece mucho a Lachesis que también tiene orina negra.

Igualmente se parece a Terebinthina que produce congestión renal, con ruptura de los más finos capilares y la salida de sangre consiguiente a las pelvecillas del riñón. La orina contiene cilindros renales, es de color humoso, depositando un sedimento color rosado sucio.

Ya hemos visto en qué casos podemos usar Colchicum en el reumatismo, en la fiebre tifoidea y cómo podemos usarlo también en la simple debilidad. Hemos hablado de la postración que produce el uso prolongado de Colchicum podemos, por consiguiente sacar esta consecuencia práctica : aplicar este medicamento en los casos en que es muy marcada la debilidad por los repetidos accesos de gota. Colchicum está íntimamente ligado a Spigelia en las afecciones cardíacas. Spigelia es el antidoto contra el abuso de Colchicum.

Veratrum album

Veratrum album no es un medicamento difícil de comprender. Desde la época en que vivía Hahnemann se ha usado en el cólera asiático, en el cólera morbus y en otras afecciones abdominales. Sus síntomas a este respecto son bien conocidos, pero a condición de ser precavidos, no descuida remos otros usos igualmente importantes de este medicamento, sus síntomas mentales. En los envenenamientos por el Veratrum encontramos muy pocos síntomas que se refieren al cerebro. Parece que obra de manera prominente sobre los órganos abdominales, probablemente por intermedio de los nervios

esplácnicos. Cuando estos nervios son paralizados, los vasos sanguíneos se recargan de sangre y dejan escapar el plasma. En este caso se parece a Elaterium. La postración, la frialdad y la terrible sensación de abatimiento en Veraturm parten precisamente de estos nervios; pero Veratrum puede afectar también al cerebro. Aún en este último caso, no es poco común que los síntomas vayan asociados a la frialdad, debilidad, etc.

Veratrum album puede estar indicado en el delirio. Debemos observar esto con particular atención, ya que en este caso tiene aparentemente una estrecha relación con Belladonna. El delirio va asociado a agitación, deseo de cortar y desgarrar las ropas, locuacidad, habla precipitadamente, con vehemencia y en voz alta; golpea a los que le rodean, hay ansiedad, se espanta de cosas imaginarias; es lascivo en sus actos y en su manera de expresarse; salta de la cama y echa a correr por las habitaciones, como si con esto encontrara alivio. Hasta aquí los síntomas mentales son de tal naturaleza, que con dificultad se pueden distinguir de los de Belladonna y Stramoinum. La direrencia consiste en lo siguiente : Veratrum album tiene frialdad de la superficíe del cuerpo, con sudor frío en la prente. En ocasiones la cara está roja y los labios azules y hay hormigueo en las extremidades.

Veratrum album es de utilidad en las mujeres cuando parecen tener impresiones mentales anormales, relacionadas a transtornos de la esfera sexual; por ejemplo, en la ninfomanía. La paciente es extremadamente lascivo; corre por las habitaciones tratando de besar a todo el mundo. Es propensa a sufrir estos accesos, especialmente, antes de las reglas. Está constantemente urdiendo mentiras ultrajantes.

También debemos pensar en Veratrum, cuando después de un susto, hay gran frialdad del cuerpo y diarrea. Gelsemium produce igualmente diarrea después de un susto. bajo la acción de Veratrum, la diarrea va acompañada de postración y frialdad.

Gelsemium, Argentium nitricum, Aconitum y Opium, también tienen diarrea ocasionada por un susto.

Ahora veremos algunos de sus síntomas abdominales. Está indicado en afecciones intestinales como en el cólera morbus, cólera infantil y cólera asiático; en la invaginación intestinal. La diarrea que reclama el uso de Veratrum tiene deyecciones abundantes, acuosas, verdosas y que en ocasiones contienen copos semejantes a espinacas; algunas veces son sanguinolentas y van acompañadas siempre de dolores agudos y cortantes en el abdomen y calambres en las extremidades. Hay suma debilidad y el enfermo casi se desvanece a cada intento de defecar; el vómito es copioso y espumoso. Siempre hay sudor frío en la frente.

En las diversas afecciones coleriformes, Veratrum está indicado por los síntomas siguientes : vómitos y evacuaciones simultáneas ; dolores cólicos en el abdomen, con calambres especialmente en las pantorrilas; evacuaciones profusas, acuosas, que han recibido el

nombre de riciformes ; van acompañadas de gran postración y sudor frío con especialidad en la frente. Será inútil preseribir Veratrum en las afecciones coleriformes si no hay dolor. Las agravacions son nocturnas, la extenuación es rápida. El primer medicamento que debemos estudiar en relación con Veratrum, es Camphora; éste, como Veratrum, produce frialdad y síntomas de colapso. Camphora se adapta más bien a los casos de cólera en que las evacuaciones son escases y la náusea muy marcada. En ocasiones el labio superior está contraído dejando al descubierto los dientes y dando a la expresión nauseosa un aspecto más repugnante. Todo el cuerpo está frío; la voz es chillona o plañidera.

Jatropha curcas produce un cuadro del cólera, aún más exacto que el de Veratrum album; ocasiona vómitos de substancias albuminosas y filamentosas, al mismo tiempo que diarrea.

Podophyllum se parece a Veratrum album en que produce una imagen perfecta del cólera morbus. Está especialmente indicado cuando el caso se caracteriza por la ausencia de dolor, siendo en esto muy diferente a Veratrum. Los ataques se presentan generalmente en el verano.; Las evacuaciones son acuosas y salen en chorro, produciendo un ruido muy semejante al que produce el agua al salir de una llave. Hay marcada repugnancia por los alimentos. Es más probable que las deposiciones se presenten después de la media noche y hacia la madrugada. Las evacuaciones tienden a cambiar de color.

Hay un medicamento que creo se adapta mejor a las afecciones del estío en los niños que Veratrum album; me refiero a Iris versicolor.

Iris produce síntomas inflamatorios bien marcados, con sensación de desolladura y excoriación en el ano. La agravación se presenta entre las dos y tres de la madrugada. Náuseas con vómitos ácidos, en ocasiones biliosos. Las deyecciones son acuosas y verde-amarillentas; mezcladas con bilis o partículas grasosas.

Pulstilla está indicado en la diarrea que se presenta después de media noche ocasionada por pasteles, etc., o por tomar nieve inmediatamente después de la comida.

Croton tiglium está indicado cuando las deposiciones son amarillentas o amarillo-verdosas; también salen estrepitosamente como el agua que sale de una llave. Son provocadas por todo intento de comer o beber.

Elaterium es el medicamento indicado para las evacuaciones profusas, cuando son de color verde olivo. He encontrado útil a Veratrum album en la debilidad cardíaca que sigue a las enfermedades agudas cuando el miocardio está tan débil, que el pulso es filiforme. El enfermo se desmaya al moverse. En decúbito dorsal la cara tiene un color rojo, pero al incorporarse se pone mortalmente pálido. Con frecuencia se encontrerán las manos frías y pegajosas.

Veratrum viride

Aunque el nombre de esta droga es parecido al de la que acabamos de estudiar, no debemos por ello pensar que produce los mismos síntomas. Veratrum viride produce congestión de la base del cerebro y de la parte superior de la médula espinal. De ahí que trastorne el funcionamiento del neumogástrico. En un principio parece producir ingurgitación de los pulmones, tal como sucede en el comienzo de la pneumonía. Esto va asociado a una excitación arterial notable. Si los síntomas no se corrigen, sobreviene el vértigo y los desmayos cuando el paciente trata de incorporarse, con náusea, sudor frío y ortopnea, y de hecho, todos los síntomas de la parálisis cardíaca por la excitación exagerada de este órgano. Por esto se verá que Veratrum viride es un medicamento de gran valor en las violentas congestiones que preceden a la pneumonía, pudiendo hasta llegar a abortar la enfermedad.

Veratrum viride produce esofagitis, enfermedad en la que puede estar indicado aún en los casos cuya etiología es traumática ; los síntomas que reclaman su uso, son estos : disfagia y dolores ardientes en el esófago.

También está indicado en la corea, cuando además de los movimientos hay una violenta congestión de los centros nerviosos. Administrado en bajas potencias, alivia la congestión y por consiguiente los trastornos producidos por ella.

Incluso podemos confiar en la acción de Veratrum para las convulsiones puerperales. La congestión cerebral es profunda en estos casos, yaciendo la enferma en un estado como de apoplegía. En los intervalos de las convulsiones la enferma está inconsciente y sumida en profundo sueño. La cara está roja, los ojos inyectados y hay violentas contorsiones convulsivas.

Gelsemium es de utilidad en algunos de estos casos cuando el estado mental está embotado y asoporado, pero el pulso en estos casos, aunque lleno es blando y depresible.

Sabadilla

Sabadilla como Veratrum album, es un medicamento útil por sus síntomas mentales. Puede usarse con éxito en las enfermedades imaginarias. Por ejemplo : la enfermo cree estar en cinta, cuando simplemente hay una distensión flatulenta; le parece estar afectada de una horrible enfermedad de la garganta y está segura de que tendrá un desenlace fatal.

Thuja tiene los siguientes síntomas : se imagina que es doble o triple o que su cuerpo es de vidrio y teme que se rompa si lo tocan.

Sabadilla es de utilidad en la influenza y en el asma de heno ; hay estornudos espasmódicos y violentos ; lagrimeo por salir al aire libre, la garganta también está afectada reproduciendo una imagen perfecta de la amigdalitis. La enfermedad comienza en el lado izquierdo y de ahí se extiende al derecho ; los dolores se agravan por la deglución en vacío, mejorando por las bebidas calientes. En

ocasiones se experimenta la sensación de tener un hilo o un cordón en la garganta o bien de constricción en la misma, como si estuviera ligada por una cuerda.

Podemos también hacer uso de Sabadilla para las lombrices, cuando hay náusea y vómitos asociados a un cólico peculiar, como si los intestinos estuvieran dando vueltas.

Dd menispermaceas

El grupo de plantas del órden de las Menispermáceas no es muy extenso ; en esta conferencia, sólo estudiaremos un medicamento obtenido de este grupo, y es Cocculus indicus. El nombre que lleva este órden de plantas se ha derivado de la forma de sus semillas.

Cocculus indicus

Cocculus indicus debe sus propiedades medicinales a un alcaloide, - la Picrotoxina, palabra compuesta de dos voces que significa "veneno amargo". Su estudio lo haremos bajo dos rubros ; primero su acción sobre los nervios, obrando sobre el sistema cerebro-espinal, en la debilidad, en la tifoidea y en los espasmos ; y segundo, su acción sobre los órganos en general.

Ahora bien, cualesquiera que sean los característicos de un medicamento en un caso dado, deben corresponder con los efectos generales del mismo medicamento ; de otro modo, la selección será solo parcial. Por ejemplo ya conocemos el siguiente síntoma de Belladonna : " está somnoliento pero no puede dormir", siendo uno de sus característicos. Pero este mismo síntoma lo encontraremos en China en Ferrum y en Apis. ¿como distinguirlos entre sí? Tomando como base los síntomas generales de Belladonna, alrededor de los cuales agruparemos sus particularidades.

Ahora bien, bajo la acción de Cocculus, se encuentran algunos síntomas que también los tienen muchos otros medicamentos, pero en ninguno guardan la misma relación con la patogenesia de Cocculus como en el medicamento que estamos estudiando. ¿Cuáles son pues los efectos generales de Cocculus? Estos efectos obedecen a la bien conocida acción de la droga sobre el sistema cerebroespinal y a su poca acción sobre los nervios y ganglios del gran simpático. ¿Cómo podemos llegar a este conocimiento? No es muy fácil, lo confieso, sin embargo, se ha logrado estudiando el medicamento como un todo y tratando de investigar mediante la fisiologia y otras ciencias relacionadas con la materia, sobre qué porciones del cuerpo obra, qué funciones altera y qué tejidos modifica. Hecho esto tenemos una base sólida en que apoyar nuestra sintomatología.

Cocculus obra sobre el sistema cerebroespinal, produciendo una gran debilidad de los órganos que están subordinados a su control ; de su acción sobre el cerebro mismo, ya me ocuparé cuando hable de su uso en la fiebre tifoídea. Ahora veremos cómo afecta la médula espinal. Produce una debilidad paralítica de la espina y especialmente de los nervios matores: de ahí que sea un remedio seguro y de uso frecuente en las parálisis que tienen origen en las

afecciones medulares. Está especialmente indicado en el principio de estas afecciones, sea que provengan de trastornos funcionales u orgánicos de la misma médula ; sea que se trate de irritación espinal por pérdidas seminales, reblandecimento medular o ataxia locomotriz.

En estos casos está especialmente indicado cuando la porción afectada es la lumbar ; hay debilidad en las cintura, como si estuviera paralizada, con cansancio en la misma al caminar ; hay debilidad en las piernas, y al decir piernas, me refiero a los miembros inferiores en su totalidad ; las rodillas flaquean al caminar ; las plantas de los pies se sienten como adormecidas ; los muslos duelen como si hubieran sido golpeados ; primero se duerme una mano y después la otra ; en ocasiones se duerme todo el brazo sintiéndose la mano como si estuviera hinchada. Estos detalles forman la base de la sintomatología completa de esta droga ; todos parecen depender de la debilidad medular. Son bastante comunes en las señoras que padecen de trastornos menstruales cuando por la mañana hay desfallecimiento en la espalda ; después de los excesos venéreos y también por la pérdida del sueño.

Hay un síntoma concomitante que casi siempre está asociado a los que acabamos de mencionar y es la sensación de poquedad en ciertas cavidades del cuerpo, ya sea la cabeza, el pecho o el abdomen. Es más que una debilidad, es una sensación bien definida de como si estas partes estuvieran huecas. El hablar fatiga mucho a los enfermos.

La debilidad de Cocculus tiene su origen en la médula. Es muy probable que suceda a la pérdida del sueño ; el enfermo no puede desvelarse una o dos horas más de la acostumbrado, sin sentirse agotado y lánguido todo el día siguiente.

Permítaseme en seguida enumerar los síntomas tifoideos de Cocculus, incluyendo en este cuadro los síntomas cerebrales. No es de esperarse que sea de utilidad Cocculus en la fiebre tifoidea, cuando los cambios o las ulceraciones de las placas de Peyer son bien marcados o cuando haya una diarrea profusa, neumonía o complicaciones semejantes. Pero en la fiebre de tipo nervioso, cuando el sistema cerebroespinal es el punto principal de ataque, entonces Cocculus será uno de los medicamentos que nos ayuden en el tratamiento de la enfermedad. Los síntomas que reclaman su uso, son los siguientes : el paciente se queja de vértigo muy acentuado y que se agrava al incorporarse o cuando intenta cambiar de la posición horzontal a la vertical. Frecuentemente va asociado de náusea, tendencia al vómito e incluso desmayos. Bryonia también tiene este síntoma ; por lo que respecta al síntoma en sí, no existe diferencia entre Bryonia y Cocculus ; y sin embargo examinando detenidamente el caso, veremos que en Cocculus obedece a la debilidad de los nervios espinales y cerebrales. Hay gran confusión mental, que puede expresarse más bien como un estado de embotamiento y desorientación; el paciente necesita hacer gran esfuerzo para hablar

con claridad. En algunos casos no puede encontrar las palabras adecuadas para expresar sus ideas. Generalmente estos enfermos están quietos y absortos en sus pensamientos. Los párpados se sienten pesados, como si apenas los pudieran levantar. Este último síntoma nos recuerda a Gelsemium. Si aún el estado del enfermo es consciente y le permite describir su situación, se quejará de una sensación de tirantez en el cerebro, como si todos los nervios estuvieran retraídos fuertemente. Otras veces tiene la sensación de poquedad o vacío en la cabeza. Cualquier intento de mover al enfermo, le produce desmayo o desfallecimiento completo. La lengua generalmente está cubierta de una capa blanca o amarilla ; hay sabor amargo en la boca. El abdomen generalmente está muy distendido, no siendo este timpanismo igual al de China, Carbo veg., Colchicum, Sulphur, ni siquiera como el de Lycopodium.

El timpanismo tiene su origen en diversas causas. Puede proceder de los vasos sanguíneos, de la aerofagia, de las modificaciones en el mismo alimento y también por la retención de gases. Esta última es la causa del timpanismo en Cocculus indicus. No debemos pensar en él para flatulencia que resulta de la descomposición de los alimentos ; esto reclama el uso de Carbo veg., Cocculus tiene una compresión notable sobre los pulmones, siendo este síntoma de origen nervioso. El paciente por lo general lo refiere a las paredes torácicas. Los enfermos están insomnes o al menos en un estado entre la vigilia y el sueño, debido a la afluencia de pensamientos relacionados con sus negocios, pareciéndose en esto a Bryonia. Estos son los síntomas que nos conducen a la elección de Cocculus en los estados tifódicos.

En seguida vamos a estudiar los espasmos. Cocculus indicus es de utilidad en las afecciones espasmódicas, cuando el enfermo tiene una gran debilidad del sistema nervioso cerebroespinal. Una debilidad irritable, es el estado que origina los espasmos que reclaman el uso de Cocculus. Es de utilidad especialmente para los síntomas espasmódicos que se presentan como consecuencia de la pérdida prolongada del sueño ; estado que se encuentra mas frecuentemente en las mujeres que en los hombres. También la debilidad medular es mas frceuente en las mujeres. Puede hacerse uso de Cocculus en las afecciones espasmódicas ocasionadas por la supresión de las reglas. Durante las convulsiones, los ojos estan generalmente cerrados con oscilación de los globos oculares. Pero para que Cocclus sea el medicamento indicado, la mujer debe ser de temperamento débil y nervioso, estando menos indicado en otras circunstanclas.

Refiriéndonos al rubro que trata de los órganos en general, diremos algunas palabras con respecto a Cocculus. En primer lugar hablaremos de su cefalalgia. Hace algunos años que hubo una epidemia de meningitis cerebroespinal en Filadelfia, durante la cual murieron muchos niños, especialmente en los primeros días. Después de algún tiempo se descubrió un síntoma característico de esta epidemia y que consistía en una cefalalgia intensa en la región occipital, en la parte más baja y posterior de la cabeza y la nuca;

cefalalgia que se manifestaba de varias maneras. En los niños en estado de estupor, se manifestaba por la tendencia a echar la cabeza hacia atrás a modo de disminuir la tensión de las membranas del cerebro ; otros, que estaban conscientes, se llevaban las manos a la parte posterior de la cabeza ; en tanto que otros se quejaban de un dolor en la región mencionada y de una sensación de como si se les abriera y cerrara alternativamente la cabeza. Este síntoma se encontró en la patrogenesia de Cocculus, después de cuya administración, fueron pocas las defunciones habidas. Las cefalalgias occipitales son dificiles de curar y Cocculus es uno de nuestros buenos medicamentos en estos casos. Gelsemium es otro buen remedio. En este último hay una congestión de la parte afectada, el pulso es heno y amplio y no duro y tenso como en Belladonna o Aconitum. A menudo la palabra es embarazosa en Gelsemium.

Otro medicamento para las cefalalgias occipitales es Juglans cathartica, llamada otras veces Juglans cinerea o nuez de matequilla. Considero este medicamento como el mejor para los dolores agudos de la región occipital.

Ya hemos anticipado algunos de los síntomas de Cocculus relacionados a los órganos sexuales femeninos; aún quedan otros que enumerar. La menstruación, o es muy profusa y anticipada, presentándose en chorro y muy débilmente, o bien tardía, padeciendo la enfermedad periódicamente, lo que se ha dado en llamar cólicos menstruales. Hay un grupo de medicamentos para esta afección y de los cuales forma parte Cocculus ; los otros son Pulsatilla y Chamomilla. Describiré en primer término los síntomas de Cocculus. Está indicado en el cólico, cuando parece como si en el abdomen hubiera piedras agudas frotándose unas contra otras. Con frecuencia hay al mismo tiempo una distensión abdominal marcada debida a la acumulación de gases. El cólico tiende a presentarse por la noche obligando a la enferma a despertar ; se mejora por eructos, pero vuelve en seguida por la misma causa de la acumulación de gases. La enferma está naturalmente irritable.

En Chamomilla el flujo menstrual es muy obscuro. Los síntomas mentales descritos en mi conferencia sobre este medicamento, necesariamente deberán estar presentes.

En Pulsatilla el flujo menstrual es escaso, presentándose con intermitencia y por golpes ; hay dolores de retortijón que obligan a la enferma a doblarse pero el temperamento de Pulsatilla es afable y lacrimoso.

Cyclamen es semejante a Pulsatilla ; tiene escalofríos durante los dolores ; carácter lacrimoso, dispepsia que empeora por los alimentos grasos y por los pasteles ; la menstruación es escasa ; hay cólico menstrual. Pero se distingue en lo siguiente ; Cyclamen no tiene mejoría al aire libre o en una habitación fresca y en muchos casos hay sed. La semejanza entre Cocculus y Cyclamen, consiste en que los dos se adaptan a un estado de depresión del sistema nervioso cerebroespinal. Los síntomas de Cyclamen son los siguientes, : la

enferma siente vértigo ; se siente débil por cualquier movimiento; está marcadamente anémica y generalmente tiene agravación por incorporarse ; estos síntomas se acompañan con frecuencia, de visión borrosa. También encontramos en Cyclamen el cólico flatulento, debido a los gases intestinales, presentándose en la noche y que se mejora solamente cuando la enferma se levanta a pasearse. En el cólico menstrual debe compararse también con Ignatia y Nux vómica.

Dd papaveraceas

Procederemos a estudiar las plantas del orden de las Papaveráceas, del cual obtenemos : Opium, Sanguinaria canadensis y Chelidonium majus. Todas las plantas de este orden obran sobre la circulación de la sangre y tienden a producir la narcosis en mayor o menor grado, mediante la congestión que producen en los vasos sanguíneos del cerebro. Los efectos que de este modo producen sobre el sensorio, varían desde la somnolencia hasta el estupor. Esto es eminentemente notable en la patogenesia de Opium y en menor grado en la de Sanguinaria y Chelidonium Ahora estudiaremos estos medicamentos por orden.

Opium tiene acción sobre el cerebro, en las emociones, en los espasmos, las parálisis, en el marasmo, en el extreñimiento, en la vejiga, en el sueño, el pecho, pulmones, corazón y en las reacciones defectuosas..

Opium, como probablemente sabrán ustedes, se obtiene de las cápsulas de la planta de la adormidera, Papaver somniferum, antes de su maduración. Generalmente se emplean las cápsulas aún no maduras, porque dan los efectos soporíferos más marcados. En ciertos detalles Opium es el medicamento más notables de nuestra Materia Médica. Como se sabe, muchos efectos de un gran número de drogas, se ejercen por medio de los principios activos que contienen. Así la Belladonna contiene la Atropina; el Stramoniuu la Solanina; Nux vómica la Estricnina; etc. Pero Opium parece contener un sin número de estos principios activos y no obstante parece que cada día se agregan más a la lista. Permítaseme enumerarlos, son los siguientes :

Morfina Protopina
Pseudo-morfina Methilnormacotina
Codeina Deuteropina
Apocodeina Laudanina
Thebaina Codamina
Cotamina Papaverina
Hidrocotamina Rhoadeina
Apomorfina Rhoagenina
Desoximorfina Dimethylnor narcotina
Nornarcotina Mecondina
Thebenina Cryptopina
Laudanisina Narceina

Narcotina Acido mecónico
Lanthopina Acido láctico.

Estos diferentes alcaloides son extraídos del Opio, mediante procesos más o menos complicados. Todos tienen propiedades narcóticas más o menos parecidas a las del mismo Opio.

La acción de algunos de estos alcaloides es bien conocida, en tanto que ignoramos la acción de otros. La Morfina (usada principalmente bajo la forma de sulfato) es probablemente la que mejor conocemos de estos alcaloides. Es usada extensamente por los médicos de la escuela antigua para aliviar el dolor. Nosotros podemos usarla como remedio homeopático. Se ha aplicado con éxito en enfermedades tan terribles como el cáncer, sirviéndonos de base uno de sus síntomas secundarios, o sea la extremada sensibilidad al dolor; tan violentos son los dolores, que amenazan producir convulsiones u ocasionar contorsiones y subsaltos de las extremidades. En estas circunstancias la Morfina es un medicamento homeopático; no cura, sí alivia los dolores; no como lo hacén las opiatas, produciendo un estado de estupefación al enfermo, sino de acuerdo con la Ley del Similia.

La Morfina tiene la propiedad de producir timpanismo. Este es un hecho muy importante y que debemos tener siempre en cuenta, porque llegará el caso en que necesitamos diferenciar un principio de peritonitis, de los efectos de la Morifina.

La Codeina, otro alcaloide del Opio, es un medicamento útil en el tratamiento de la tisis. Está indicado en la tos seca e irritante que atormenta al enfermo día y noche.

Por otro lado la Codeina ha producido y también curado el temblor muscular, especialmente de los párpados. este es un síntoma muy molesto y en algunas ocasiones se alivia con Crocus.

La Apomorfina produce y cura el vómito. Ahora bien, este vómito no es el que reclama el uso de Ipecacuanha, Tartarus emét., Lobelia, etc. es un vómito reflejo de origen cerebral. La Apomorfina inyectada hipodermicamente, produce el vómito, mucho antes de que sus efectos locales se produzcan sobre el estómago. Terapéuticamente, estos efectos de la Apomorfina, pueden ser utilizados en el vómito de origen cerebral y también en esa molesa enfermedad que muchas personas padecen : el mal de mar. En los casos de vómito de origen cerebral, hay que pensar también en Glonoinum, Belladonna y Rhus tox.

Hay otros alcaloides de esta lista, que se han experimentado, pero nada definitivo se ha escrito acerca de ellos; hay también numerosas preparaciones en las que entra el Opio y se usan extensamente en la práctica alopática; sin embargo, nosotros nada tenemos que ver con ellas, como no sea contrarrestar sus malos efectos. Las distintas preparaciones de Opio se usan en las elaboración de los remedios para la tos y los jarabes calmantes que tan ampliamente se utilizan en la práctica popular. Sus efectos son marcadamente nocivos, especialmente en los niños. Un prominente médico de la escuela antigua, ha dicho que el uso de los jarabes calmantes en los niños es

decididamente reprensible. Impide su desarrollo, los vuelve irritables y malhumorados, estorbando seriamente también su desarrollo cerebral. Nux vom. es uno de los antídotos para los malos efectos de los anodinos. Otro antídoto, y tal vez mejor que Nux vom., es Chamomilla. que se adapta a los casos en que, habiéndose administrado los derivados del Opio durante algún tiempo, han producido sus efectos secundarios; el niño está insomne; los dolores más ligeros le parecen intolerables. Cuando este estado exista, Chamomilla será nuestro medicamento ya se trate de niños o de adultos.

No hay otro medicamento del que tanto abusen los médicos alópatas, así como los homeópatas (i) como el que hoy estudiamos. Quisiera tener la oportunidad y la elocuencia para convencer a los prácticos de la antigua escuela, de lo absurdo que resulta el uso sin prudencia, de los opiados; y más aún, quisiera disuadir a los homeópatas de ocultar su ignorancia con el uso de los anodinos, administrando de vez en cuando una dósis de Morfina o de Láudano. Los unos, porque ignoran otro medio de mitigar el dolor y los otros, demasiado perezosos para estudiar sus casos, buscan el alivio de sus pacientes en los anodinos. Si se les hablé de su práctica anticientífica responden : "mi deber es aliviar a los enfermos" y yo replico: ¿A costa de qué? ¿Está usted obligado a hacer lo que de antemano sabe que es un mal? "No, pero ¿cómo es que incurro en un error?" Contestaría con un breve resúmen del modus operandi del Opium y si con esto no quedara resuelta la cuestión, en nada tendría que seguirme oponiendo al uso de los anodinos.

A pequeñas dosis, Opium produce primitivamente un efecto de alegría pasajera.

Parece, sin embargo afectar más la esfera emotiva que la intelectual. Al enfermo le parece flotar en el aire sin impedírselo las leyes del espacio y la gravedad. Da rienda suelta a su imaginación. Si la dosis se aumenta en cantidad o se repite con más frecuencia, estos síntomas van seguidos de un estado de somnolencia, que varía desde una sensación agradable de ligero sueño hasta el más profundo estupor. Estos efectos narcóticos y anodinos de Opium, obedecen al aumento de la circulación sanguínea en el cerebro, esto se verifica no sólo mediante la cantidad de sangre que afluye, sino también porque hay estorbo a la circulación de retorno.

Permítaseme una ligera disgresión para hablar de la explicación fisiológica del sueño. Hammond ha demostrado que en este estado, la cantidad de sangre que circula en el cerebro, está notablemente disminuída. Administrado Opium para producir el sueño ¿qué efectos conseguimos? ¿Acaso producimos la anemia cerebral? No hacemos precisamente lo contrario. Entonces yo pregunto: ¿Es racional la administración de los opiados para obtener sus efectos anodinos?

Volviendo a los efectos de Opium, veremos que la cara se pone de un color rojo-obscuro e hinchada por la distensión de los vasos sanguíneos. Cuanto más profundo es el estupor, más profundo es el

color de la cara, pudiendo llegar a ponerse de un color que tira a café. El pulso es lleno y lento, las pupilas están contraídas. La respiración es profunda y a medida que aumenta la intensidad del estupor se vuelve difícil y por último estortorosa. ¿A qué obedece este estupor? Significa que a medida que aumentan los efectos venenosos de Opium, se produce un estado parético y finalmente una parálisis del velo del paladar y los carrillos. De esta manera, completamente relajadas estas partes, se dejan distender siguiendo los movimientos de la respiración. El pulso es lleno, redondo y lento; lo que demuestra que el corazón impulsa una corriente normal de sangre, pero no late igual número de veces por minuto a como lo hace en estado normal. A medida que pasan las horas y el caso avanza, vemos desarrollarse el cuadro completo de la parálisis. La aplicación práctica de esto la daré al hablar de la fiebre tifoidea. Los esfínteres pierden su control al grado de haber escape involuntario de orina y materias fecales; la mandíbula inferior está caída y por último sobreviene la muerte.

En estos casos fatales, la autopsia demuestra que hay un aplastamiento de las circunvoluciones cerebrales; los vasos sanguíneos de la médula y cerebro están ingurgitados y hay un derrame seroso por debajo de la aracnoides y en los ventrículos cerebrales.

Estos son los síntomas del envenenamiento agudo por el Opio.

Estos fenómenos dependen de la acción de Opium sobre los nervios; de su irritación proviene la excitación primaria breve y de la subsecuente acción paralizante, sobrevienen la somnolencia, la relajación muscular y el coma. Desde un principio los vasos cerebrales están recargados de sangre y esta ingurgitación va en aumento hasta que sobreviene el estupor. Ahora bien, señores, vuelvo a preguntar : ¿es una práctica racional calmar el dolor con una substancia que paraliza y quita, no la enfermedad, sino la posibilidad de sentir, la consciencia del sufrimiento?

¿Cuáles son los efectos producidos por el uso habitual de esta droga? El primer efecto es el que ya he descrito, actividad somnolienta e imaginativa de la esfera emotiva. Después, a medida que se continúa el uso de la droga, se afectan todos los tejidos del cuerpo. La piel se marchita poniéndose de color cetrino y cuelga formando arrugas, las extremidades se extenúan y la inteligencia se embota.

El mejor antídoto de Opium es el café negro y cargado; se da a dosis repetidas hasta que haya alguna señal de reacción. Además de esto, debe hacerse uso de la electricidad. También se debe eliminar el veneno que pueda haber en el estómago, por medio de los eméticos o con la sonda; debe obligarse al enfermo a caminar para evitar el estupor.

He dado una descripción tal de la acción de Opium, que desde luego podremos ver en qué clase de enfermedades estará indicado.

Encontramos el cuandro patogénico de Opium en la fiebre tifoidea, con profunda congestión cerebral dando por resultado una parálisis

de este órgano. Abatimiento de la mandíbula y respiración estertorosa; en los casos que reclamen el uso de Opium en esta enfermedad, frecuentemente el cuerpo está bañado en un sudor caliente. Este sudor no es crítico, es de un mal pronóstico. Es síntoma de muerte inminente, pues es el resultado de la parálisis de las glándulas sudoríparas. Este síntoma también se encuentre en Stramonium.

En la fiebre tifoidea con amenaza de parálisis cerebral, debe pensarse en Lachesis, cuyo síntoma ya describí al ocuparme de esta droga. También hay que pensar en Hyosciamus que tiene respiración estertorosa, pero existen diferencias que ya veremos.

En un caso, en el que el coma profundo no cedió a la acción de Opium. Apis restableció al enfermo.

Opium debe ser tenido en consideración en el tratamiento de la apoplejía. Es lógico suponer que un medicamento que produce tal plenitud de los vasos sanguíneos cerebrales, pueda, en personas predispuestas a estos accidentes, producir una ruptura y la consiguiente extravasación sanguínea en la substancia cerebral. Debemos también pensar en Opium por el color de la cara, por la respiración estertorosa y por la rigidez tetánica del cuerpo. Está especialmente indicado en la apoplejía de los alcohólicos. Opium sigue bien a Belladona en esta enfermedad.

También hay que pensar en Baryta carbónica y Lachesis en la apoplejía de los bebedores.

Arnica se adapta a los casos de apoplejía, cuando el pulso es lleno y fuerte, cuando la parálisis interesa el lado izquierdo del cuerpo y hay respiración estertorosa.

Apis está indicado cuando el coma no cede a la acción de Opium.

Para la apoplejía cuando se presenta con convulsiones, hay que pensar en Belladonna, Hyosciamus, Lachesis y Opium.

Cuando la apoplejía va seguida da parálisis, deberemos pensar en Arnica, Belladonna, Lachesis, Nux vóm., y Rhus.

Cuando va seguida de idiotez, en Helleborus.

Opium es de utilidad en la manía "a potu" o en el delirium tremens; está especialmente indicado en los viejos bebedores, cuya constitución está minada completamente por sus excesos prolongados; en los sujetos que han padecido repetidamente este accidente y que, con pequeñas cantidades de licor que ingieran vuelve a presentarse. En su cara está siempre retratada la expresión del susto o terror. Tienen visiones de animales que saltan por todos lados en su habitación. Se imaginan ver fantasmas, demonios, etc., y con los cuales conversan a pesar de que su presencia les produce horror. Si logran dormir, el sueño es estertoroso como el de que hablamos.

Hay varios medicamentos, que administrados a tiempo, nos permitirá en los casos de delirium tremens, salvar a nuestros enfermos. Ya hemos aludido a Opium; Lachesis es otro de estos medicamentos; está indicado especialmente cuando el enfermo tiene

visiones de víboras y otros objetos horribles; sensación en la garganta de como si fuera a ahogarse y salta de la cama soñando.

Otro de nuestros medicamentos es Stramonium, siendo la violencia de sus síntomas la mejor guía para su administración. El paciente se estremece durante el sueño, completamente horrorizado, con visiones de animales que avanzan hacia él, de todos los rincones de la habitación; hace esfuerzos por escaparse; la cara está de color rojo-brillante.

Otro medicamento más de que disponemos, es Cannabis indica o Hashisch. Es uno de los más frecuentemente usados en el delirium tremens. Hasta ahora sólo se ha administrado en atenuaciones bajas. Parece que sus síntomas característicos son los errores de percepción respecto al tiempo y el especio.

Otros casos reclaman el uso de Arsenicum, cuando hay temor a la muerte y el enfermo no permite que se le deje solo.

Un medicamento que se olvida con frecuencia, pero que sin embargo es de utilidad, es Calcarea ostr. Cuando el enfermo cierra los ojos, ve visiones que le obligan a abrirlos, espantado.

Puede usarse Opium en el cólera infantil, cuando la cara está roja o pálida y va acompañado de un sopor que avanza fatalmente. Las pupilas no reaccionan para nada a la luz o bien reaccionan con torpeza. Parece que la enfermedad se inicia atacando el cerebro; todavía no hay diarrea ni vómito; el niño parece estar envenenado por alguna droga. Administrando Opium en casos como este, hará que el enfermo recupere el conocimiento; se presenta la diarrea y la enfermedad toma su curso normal hacia el restablecimiento. También puede usarse Opium cuando hay falta de vitalidad y el medicamento, aparentemente bien indicado no obra. El paciente está entorpecido y somnoliento; en estos casos Opium es tan útil como Carbo veg., Sulphur, Valeriana, Ambra grisea, Psorinum o cualquier otro medicamento de los indicados en los casos de falta de reacción. Hay otros casos de cólera infantil en que está indicado Opium y es cuando después que la diarrea ha durado algún tiempo, se presenta el estupor.

Hay un medicamento del que quiero hablar aquí, pero con una advertencia, pues es de los que se dice que ha nacido por presentación de nalgas; es decir, fué usado clínicamente antes de ser experimentado. Se trata de Ferrum phosphoricum. Está indicado en el cólera infantil cuando las deposiciones son frecuentes; en el transcurso de veinticuatro horas, el niño se extenúa completamente y cae en estado de estupor, con la cara roja, las pupilas dilatadas, presentando rotación de la cabeza y pulso blando y lleno. Sabemos que el pulso de Ferrum phosphoricum es como el que acabamos de citar; sabemos además que todas las preparaciones de hierro producen congestión. En un caso personal que presentaba estos síntomas, administré Belladonna y Sulphur separadamente y los dos fallaron. A continuación di Ferrum phosphoricum y en doce horas el niño volvió al conocimiento, quedando curado en forma definitiva.

Puede hacerse uso de Opium en la supuración de los pulmones, en personas que son muy afectas a bebidas embriagantes; la respiración está dificultada y se acompaña de ronquidos y estertores; la tos es muy difícil y va acompañada de accesos de sofocación; la cara se pone de color azul durante la tos.

Otra afección pulmonar que se presenta en los bebedores es la hemoptisis y reclama el uso de Opium cuando el pecho está caliente y las extremidades frías; la tos es violenta y hay somnolencia, expectoración de moco espumoso y sangre. También Antimonium tartaricum tiene tos con somnolencia y bostezos.

Algunas veces está indicado Opium en las convulsiones, especialmente cuando se presentan como consecuencia inmediata del terror o la ira; o cuando los niños presentan convulsiones por haber sufrido un susto la nodriza; el cuerpo está en estado de rigidez tetánica; las convulsiones van precedidas de un grito penetrante y fuerte; hay espuma en la boca; la cara se pone de color rojo-obscuro y aún purpúreo y el cuerpo con frecuencia se baña en un sudor caliente; las convulsiones van seguidas de un profundo sueño con ronquidos.

Opium produce la constipación y también la cura; se trata de un estreñimiento por inercia del recto y de todo el canal intestinal; no hay absolutamente ningún deseo de evacuar el intestino; de ahí que éste se recargue de materias fecales; hay acumulación de gases en la parte superior del abdomen que comprime el tórax. Este es un síntoma muy común en las enfermedades debilitantes o prolongadas. En estos casos acostumbro prescribir Opium en dosis repetidas, hasta que se presenta el cólico lo que indica que la acción perisáltica del intestino se ha restablecido; prescribo después un enema de aceite de coco o de jabón para ablandar las masas fecales, obteniendo así una evacuación fácil de los intestinos. Los excrementos característicos de Opium consisten en pequeñas bolas duras, secas y negras; esta forma de estreñimiento nos recuerda a Alumina, Plumbum y Bryonia.

Bryonia tiene constipación por inercia del recto y falta de secreción intestinal; las cámaras son gruesas y secas.

Plumbum se parece mucho a Opium, pero tiene constricción espasmódica del esfinter anal; las cámaras se componen de bolas duras y negras.

Alumina produce inercia del recto, pero va generalmente asociado a evacuaciones blandas.

En el timpanismo o acumulación de gases, debe comparase Opium con Terebinthina, Lycopodium, Carbo veg., Colchicum y Raphanus.

Los síntomas característicos que reclaman el uso de este último medicamento, son que el enfermo no expulsa gases ni por arriba ni por abajo, durante días enteros.

Opium puede ser de utilidad en las afecciones de la vejiga, especialmente en la retención urinaria, cuando es el resultado de algún susto o consecutiva al parto. Este último síntoma lo he

confirmado en dos ocasiones.
Para las retenciones de orina después del parto, debe compararse Opium con Hyosciamus, Causticum, y Arsenicum.
En los casos de supresión de la orina, se debe pensar en Stramonium, Zingiber, Lycopodium y Pulsatilla.
El poder que tiene Opium de producir el encogimiento de los tejidos en todo el cuerpo, nos sugiere su uso en el marasmo de los niños; el enfermito está arrugado y tiene la apariencia de viejito seco; estará presente en este caso el estupor característico de Opium.
Cuando los síntomas precitados han sido producidos por Opium, pueden usarse como antídotos : Sulphur, Argentum nit y Sarrsaparilla. Muriaticum acid. es el medicamento indicado en la debilidad muscular debida al uso prolongado de Opium.
Opium puede estar indicada en ese accidente tan peligroso llamado estrangulación intestina; hay dolores cólicos violentos y vómitos fecaloides.
Puede administrarse en el cólico, cuando haya un timpanismo notable; hay también frecuentes eructos que no producen alivio y presión hacia el recto y la vejiga.
Algunas veces se indica Opium en la metrorragia, sea que se presente o no después del parto. La paciente está inquieta; siente las sábanas demasiado calientes; está somnolienta y sin embargo no puede dormir.
En las fiebres, distintas de la tifoidea, puede ser administrado cuando el escalofrío va acompañado de calor en la cabeza y gran somnolencia; hay un calor abrazador en todo el cuerpo, aún cuando esté bañado en sudor; deseo de descubrirse, inconsciencia; experimenta una sensación de como si sus piernas pertenecieran a otra persona. (Compárese con Baptisia y Stramonium.)
La fiebre puerperal algunas veces reclama el uso de Opium, especialmente cuando un susto parece haber influído en su aparición. Hay una hiperexcitación de todos los sentidos; aun los ruidos lejanos molestan a la enferma; las secreciones uterinas son muy fétidas. Existe un estado que se aproxima al estupor.
En la hemorragia uterina debe compararse con Belladonna; que produce un flujo de sangre rutilante, y tanto la enferma como el médico, la sienten caliente.
Hyosciamus también tiene este síntoma; pero bajo la acción de este último medicamento, hay notables contorsiones espasmódicas del cuerpo.
Por lo que llevamos dicho acerca de Opium, se deduce que es un remedio inapreciable para los malos efectos de un susto, sea que éste ocasione convulsiones o diarrea.
Gelsemium, Pulsatilla y Veratrum alb., deberán tenerse presentes como medicamentos útiles en los casos de diarrea producidos por sustos.
Para los efectos crónicos de un susto, debemos pensar en Natrum mur., Silicea y Phosphoric, acid. Opium, como Bovista y Arnica, es de

utilidad para los malos efectos de las inhalaciones de vapores de carbón vegetal.
En el espasmo de los pulmones compárese con Moschus e Ipecacuanha.
También Drosera está indicado en la tos espasmódica de la tisis, cuando se presenta al caer la tarde y aún después de media noche. Todos los esfuerzos para desprender las flemas, terminan con arqueadas y vómitos.

Dd sanguinaria y chelidonium
Antes de proceder al estudio de Sanguinaria, diré que en la República Mexicana crece una variedad de adormidera llamada Argémona mexicana; en ese país, tiene usos parecidos a los que nosotros hacemos de Opium.
Produce erupciones cutáneas y se ha usado para expulsar la tenia. El jugo de la planta, de seco, se parece mucho a la gambogia. Hago mención de esto, no porque sea de mucha importancia, sino como mera información, que algún día pudiera sernos de provecho.
Ahora iniciaremos el estudio de otro miembro de las Papaveráceas, la

Sangunaria canadensis o raíz ensangretada. Esta planta se conoce desde luego por el aspecto de su raíz, que es de color rojo y al ser cortada deja escurrir un fluído que tiene apariencia de sangre; de ahí que a la planta se le haya dado el nombre de "raíz ensangrentada". Las semillas de la Sanguinaria son más o menos narcóticas. Se puede establecer semejanza entre esta planta y Opium, no una semejanza completa en su sintomatología, sino solamente de familia, que nos permite colocarla a lado de Opium. con el que, sin embargo, no es posible confundirla por existir entre ellas grandes diferencias. En los estados extremados de narcotismo producidos por Sanguinaria, encontramos languidez, estupor, pupilas dilatadas, visión desordenada y pulso irregular. Dichos síntomas se parecen a los producidos por el envenenamiento por Stramonium. En el estudio de este medicamento podemos evitarnos muchas repeticiones de sus síntomas si atendemos a la siguiente explicación:
Sanguinaria canadensis debe compararse en la cefalalgia, con Belladonna, Iris versicolor, Paullinia y Melilotus.
En la pneumonía debe compararse con, Veratrum vir., Phosphorus. Antimonium tart., y Sulphur.
Sanguinaria canadensis produce irritación sobre;
el cerebro ansiedad
irritabilidad
el oído hay sensibilidad a los sonidos súbitos.
la nariz La enferma se desmaya por los olores.
Cefalalgias
vértigo
hemorragias

menopausia
la circulación fiebres
menstruación
tisis florida y
congestiones locales.
Sanguinaria Sensación de
canadensis sequedad o desolladura
produce irritación las membranas tos
sobre: mucosas. crup
ulceración
pólipos
diarrea
pneumonía.
las glándulas {salivación
la piel {acné, úlceras.
Reumatismo
mialgia
los músculos languidez
náusea
desfallecimientos.

Sanguinaria es en primer lugar un irritante, sea que se tome por la vía oral, se aplique como tópico o que el torrente circulatorio la lleve a otros tejidos. Así que el efecto primario y más importante de la droga es la irritación de los tejidos. Por ejemplo, el cerebro es uno de los órganos irritados. Se menciona este en primer término, por la importancia preponderante de todos los síntomas mentales, ya referibles a la esfera emotiva o intelectual. La ansiedad casi siempre está presente en los demás síntomas de Sanguinaria; sin embargo esta ansiedad no es un síntoma aislado, sino que es un calificativo de las cefalalgias, los trastornos gástricos, los síntomas cardíacos y los del pecho; efectivamente, está presente en todos los achaques a los que es aplicable Sanguinaria. Como sucede siempre en tales casos, esa ansiedad va acompañada de irregularidades o trastornos en la circulación. Hay también una irritabilidad en el estado de ánimo, que hace que el enfermo se vuelva moroso, irascible, malhumorado o excitable. Vemos además que Sanguinaria irrita los oídos; primitivamente esta irritación proviene de la acción del medicamento sobre la circulación. Produce enrojecimiento progresivo de la oreja con zumbidos y rugidos en el oído, debidos a fenómenos congestivos. También produce una hiperexcitación de los oídos con los síntomas siguientes que le son característicos : sensibilidad dolorosa, especialmente a los sonidos repentinos; sensación de como si la enferma estuviera dentro de un coche de ferrocarril o un vehículo que se moviera y la sacudiera y como si todas las personas que la rodean hablaran con rapidez y confusión; la enferma desea ser sostenida para aliviar esta sensación nerviosa de vibración en todo el cuerpo. Por esto se verán los efectos primarios e irritantes sobre el oído, repercutiendo sobre todo el sistema nervioso y dando lugar a otros

síntomas, que diré de paso, no son poco comunes en las mujeres durante la época de la menopáusia. Sanguinaria es igual a Glonoinum en estos casos.

El deseo de ser sostenido nos recuerda a Gelsemium, que tiene afecciones cardíacas con temblor en todo el cuerpo y deseo de ser sostenida para poder estar quieta.

En seguida estudiaremos los síntomas nasales. El sentido del olfato está ordinariamente acrecentado; de ahí la sensibilidad peculiar a los olores, produciendo desmayo a la enferma. Este no es un síntoma poco común en la fiebre del heno. También se encuentra en la histeria y coloca a Sanguinaria a lado de Phosphorus, Ignatia, Valeriana, Nux vom., y otros remedios similares.

Hemos llegado a los trastornos circulatorios; que se traducen por vertigos con afluencia de sangre a la cabeza y vahídos; la enferma se siente mal y desfallecida, como si fuera a caer, cuando al estar sentada, trata de levantarse.

También tenemos trastornos circulatorios representados por la cefalalgia nauseosa, en la que Sanguinaria no tiene rival, especialmente cuando afecta la forma tan común en Norte América, que ha merecido el nombre de "cefalalgia gástrica americana". El paciente sufre de aflujo de sangre a la cabeza, que produce desfallecimientos y náuseas marcadas, continuando en algunas ocasiones hasta el vómito. Los dolores, que son de carácter violento, empiezan en el occipucio de donde irradian a la cabeza, fijándose sobre el ojo derecho. Son agudos, lancinantes y en ocasiones pulsátiles. En el momento álgido del padecimiento, la enferma no tolera ruidos ni olores. Obsérvense sus efectos sobre los nervios auditivos y olfatorios. No puede tolerar que alguna persona camine fuerte, pues el más leve sacudimiento le molesta; cuando la cafalalgia llega a su máximum, sobreviene la náusea y el vómito, que es de alimentos y bilioso. La enferma se ve obligada a permanecer quieta en una habitación obscura. Descansa de sus dolores únicamente cuando duerme, pues se siente mejor. Otras veces el dolor es tan violento, que la enferma se pone fuera de sí o busca alivio oprimiéndose la cabeza con las manos o contra la almohada. Esta es el cuadro completo de la cefalalgia que produce Sanguinaria. El medicamento no es solamente un paliativo, sino que cura.

Estudiando Sanguinaria con sus remedios concordantes, nos viene a la mente Belladonna, como que afecta prominentemente el lado derecho, tiene dolores pulsátiles, congestión cerebral e intolerancia por la luz y el ruido. Se ve que ambos medicamentos son muy parecidos. Hablando prácticamente Sanguinaria es el más útil en la cefalalgia de forma gástrica. En Belladonna casi siempre encontraremos los pies fríos y la cabeza caliente, detalle que no necesariamente puede estar presente en Sanguinaria. Además, el enfermo de Belladonna no se mejora acostándose, sino sentándose erguido, en tanto que Sanguinaria tiene mejoría acostándose. En Belladonna no es tan característica la dirección que toman los

dolores; es decir, el dolor que se inicia en el occipucio, e irradia sobre la cabeza, etc.; no es tan prominente en Belladonna como en Sanguinaria.

Melilotus, una variedad del trébol, produce congestión cerebral de las más violentas, con cefalalgia, que pone al enfermo casi frenético. Verdaderamente al enfermo le parece como si el cerebro le fuera a reventar por la frente; el dolor pulsátil es tan violento como bajo la acción de Glonoinum. A una señora que experimentó esta droga, le sobrevino esta cefalalgia congestiva con prolapso uterino y violenta palpitación cardíaca. El dolor algunas veces se mejora por la micción profusa.

Otra droga estrechamente ligada a Sanguinaria, es Iris versicolor; es de utilidad en las cefalalgias gástricas, particularmente cuando aparecen con periodicidad, presentándose por ejemplo, cada semana, el día de descanso: esto se debe a que el esfuerzo de los seis días precedentes, ha dejado de obrar y el enfermo resiente los efectos de ese esfuerzo, sobreviniéndole la cefalalgia nauseosa. Se adapta especialmente a los maestros de escuela, profesores de colegios, estudiantes, etc. Los dolores son intensos y de caracter pulsátil y supraorbitarios; frecuentemente afectan los ojos produciendo ceguera transitoria; cuando la cefalalgia llega a su máximum, se presenta el vómito, siendo las materias vomitadas amargas y ácidas o amargo-ácidas a la vez.

Deseo hacer mención de Paullinia sorbilis. Tiene su pequeña historia: hace un buen número de años que apareció en el mercado un específico en forma de píldoras para la cefalalgia nauseosa, siendo el principal ingrediente de esta preparación la Paullinia sorbilis. Resultó ser un medicamento eficaz. Lo que tengo que objetar a la dorga es que se hace necesario darla en grandes dosis, por consecuencia, no creo que tenga una verdadera relación sintomática, con la enfermedad para la cual se remendó. Se dice que su principio activo es una substancia idéntica a la Cafeína o a la Teína.

Continuando el estudio de los efectos de Sanguinaria sobre la circulación, algunas veces la encontraremos indicada en las hemorragias: es cierto que no con mucha frecuencia, sin embargo, cuando los síntomas la indican debemos tomarla en cuenta. Está especialmente indicado en la metrorragia de la menopausia; la sangre es de color rojo brillante, coagulada y con frecuencia de mal olor; especialmente debe usarse cuando la metrorragia va acompañada de la cefalalgia nauseosa ya descrita y de bochornos, tan comúnes en las mujeres en la menopausia. La cara se pone de color escarlata; este color se desvanece con el sudor y hay sensación de desfallecimiento, debilidad y náusea. En esto debemos colocar a Sanguinaria a lado de Glonoinum, Nitrito de amilo y Lachesis. La sangre de la menstruación en Sanguinaria es de color rojo-brillante, coagulada y de mal olor, después se vuelve obscura y pierde el mal olor referido.

Otro hecho más, que demuestra las irregularidades de la circulación

en Sanguinaria, es su aplicación en la tisis florida. Mencionaré también la naturaleza de la tos y la aplicación del medicamento en la tisis florida, pues los síntomas en uno y en otro caso son semejantes aunque pertenecientes a enfermedades distintas. El enfermo sufre de fiebre héctica; presentándose esta generalmente entre dos y cuatro de la tarde acompañada de enrojecimiento en las mejillas, circunscrito y brillante. La tos al principio generalmente es seca y parece provocada por cosquilleo o reptación en la laringe y parte superior del pecho, probablemente en la tráquea y tal vez en los gruesos bronquios. Hay mucho ardor y plenitud en la parte superior del pecho, como si estuviera lleno de sangre, lo que en realidad es cierto. El paciente se queja de dolores agudos y punzantes especialmente en el pulmón derecho y en la tetilla del mismo lado, muy probablemente se trata de mialgias; los músculos del pecho, naturalmente, se sienten magullados por el dolor. También hay disnea muy marcada. Sanguinaria administrada en el principio de la enfermedad, normaliza la circulación conjurando la congestión del pecho y disminuyendo la fibere héctica ; salvará al paciente de una enfermedad que terminaría fatalmente en pocos meses. En los casos de pneumonía que reclaman el uso de Sanguinaria, tenemos además de los síntomas ya citados, tos con expectoración herrumbrosa (tal como se encuentra en el estado de hepatización roja), y una disnea muy penosa; las manos y los pies arden en calor o bien sucede lo contrario, están fríos. En ocasiones y muchas veces antes de que pueda explicarse este fenómeno por la extensa hepatización, la acción del corazón desfallece, volviéndose débil e irregular; hay una sensación de debilidad y desfallecimiento alrededor del corazón, sintiéndose el enfermo también desfallecido, cubierto de sudor y con náuseas.

Las congestiones localizadas son muy frecuentes en la sintomatología do Sanguinaria. Ya hemos visto cómo produce congestión cerebral, enrojecimiento circunscrito de las mejillas, etc. También puede ser usado en la tos molesta que obliga al enfermo a incorporarse en la noche y que cesa tan pronto como arroja gases por el intestino o eructa. Asociada a esta forma de resfriados existe la sensación como de una corriente caliente que va del pecho al estómago; pudiendo esta molestia cambiarse del pecho al abdomen, terminando todo con diarrea.

Sanguinaria tiene varios medicamentos concordantes en la pneumonía; es semejante a Veratrum viride en la ingurgitación pulmonar y en la intensidad de los síntomas. La excitación arterial es más notable en Veratrum que en Sanguinaria, cuando todavía no ha tenido lugar la hepatización. Administrándose Veratrum vir. en estas circunstancias, modera el pulso, reduce la congestión y modifica la pneumonía. También se parece a Sanguinaria cuando la ingurgitación es tan profunda que amenaza de muerte al enfermo; el pulso se vuelve rápido y trémulo, la cara lívida y se presentan todos los síntomas de la parálisis pulmonar que se avecina. Cuando ya ha

tenido lugar la hepatización, Veratrum viride deja de estar indicado.

Phosphorus es semejante a Sanguinaria en la neumonía. Haré mención de sus síntomas cuando trate de este medicamento.

Antimonium tartaricum se parece a Sanguinaria, cuando la cara se pone lívida; la sangre está sobrecargada de ácido carbónico; hay tos estertorosa, etc.

Sulphur también es semejante a Sanguinaria en el período de resolución, cuando la hepatización no se modifica favorablemente y los esputos se vuelven purulentos; en estos casos pueden estar indicados Sulphur o Sanguinaria, siendo este último de preferirse cuando la expectoración es muy fétida, aún para el mismo paciente.

Volviendo a Sanguinaria para revisar su acción sobre las membranas mucosas, veremos que tiene efectos eminentemente irritantes, produciendo al principio sequedad extremada, sea que se trate de la conjuntiva, la mucosa bucal, la nasal u otra cualquiera. Alternando con esta sequedad y como síntoma indicador del medicamento en otra fase de estos mismos casos, hay sensación de desolladura con ardor, como si la membrana mucosa estuviera despojada de su epitelio. Este síntoma es bastante común en los catarros. La nariz está dolorida y desollada; el coriza es fluido y escoriante. La tos es como la que ya describí y parece originada por esta sequedad e irritación de las superficies mucosas.

Cuando está afectada la membrana mucosa laríngea, hay síntomas muy molestos; afonía y sensación de hinchazón en la garganta como si el enfermo se fuera a ahogar. Sanguinaria está indicado en el catarro laríngeo, ya sea que provenga de la tisis o de un simple resfrío por la exposición al frío.

Los casos de crup en que podemos hacer uso de Sanguinaria, son aquellos en los que puede haber formación de falsas membranas con sequedad, sensación de ardor e hinchazón en la garganta y una tos crupal, metálica, que no puede caracterizarse sino diciendo que se trata de una tos ruidosa y silbante y demasiado húmeda para ser silbante. Si esto va asociado a la sequedad, ardor y a algunos otros síntomas catarrales, Sanguinaria curará rápida y totalmente la afección.

Algunas veces hay úlceras en las superficies mucosas con las circunstancias ya mecionadas. Otro de sus efectos sobre las membranas mucosas es la formación de pólipos. Estos pueden encontrarse en la nariz u otra parte del cuerpo cualquiera. Sanguinaria está especialmente indicado en los pólipos mucosos, cuando sangran profusamente. Cuando son nasales, van acompañados del coriza a que ya se ha hecho referencia. También hay salivación profusa, lo que demuestra que irrita las glándulas salivales.

La piel se afecta bajo la acción de Sanguinaria; produce acné facial, particularmente en las mujeres cuya menstruación es escasa y están sujetas a irregularidades en la distribución de la sangre.

Finalmente, esta droga afecta también los músculos, inflamándolos y

reproduciendo un cuadro de reumatismo muscular agudo. Los dolores son erráticos, agudos y pungitivos, con sensación de magullamiento y rigidez, especialmente tratándose del dorso y del cuello. Los dolores son intensos.

Sanguinaria afecta en la misma relación al deltoides derecho, que Ferrum al izquierdo.

Esto será todo lo que digamos respecto a Sanguinaria canadensis.

Chelidonium majus

Chelidonium tiene acción sobre el hígado, los pulmones, el corazón, los ojos, los riñones, las articulaciones y el músculo diafragmático. Produce neuralgías, odontalgía, fístulas, fiebre intermitente; obra también sobre la piel. Chelidonium majus debe ser comparado con los siguientes medicamentos : Antimonium tart, Mercurius, Kali carb., Bryonia y Lycopodium.

Seré breve en mis observaciones acerca de Chelidonium, pues carecemos de tiempo para hacer un estudio detallado de la droga. Es un remedio único que posee puntos de semejanza con sus congéneres Sanguinaria y Opium y también Nux vóm., Mercurius, Phosphorus y Kali carb. La planta produce un jago acre, amarillo y amargo, que al ser aplicado localmente ocasiona inflamación e incluso vesicación. El valor principal de Chelidonium radica en su acción sobre el hígado, pulmones y riñones. El paciente está deprimido moralmente, es propenso al llanto, sin saber por qué; inquieto, necesita moverse de un lugar a otro; tiene angustia mental; cefalalgía con frialdad que se extiende del cuello al occipucio; siente la cabeza tan pesada que apenas si puede levantarla de la almohada; hay sensación de presión del occipucio a la oreja izquierda. Puede estar indicado en diferentes afecciones del hígado, desde la simple congestión hasta la inflamación real. Produce dolores en el hipocondrio derecho, desde la simple sensación de magulladuras hasta el carácter más grave de dolores agudos y pungitivos, que pasan rápidamente de la región hepática al epigastrio o bien al dorso, irradiando a la parte posterior del hígado. Hay un dolor notable en el ángulo inferior de la escápula derecha, siendo este síntoma, característico de Chelidonium en las afecciones hepáticas. Además de esto están presentes las manifestaciones habituales de la inflamación del hígado : escalofríos, fiebre, ictericia, lengua cubierta de una capa amarilla, sabor amargo, lengua con la impresión de los dientes, como sucede en Mercurius; deseo vehemente de tomar leche, que excepcionalmente sienta bien. Generalmente hay deseo de tomar ácidos y cosas agrias, como pepinos, vinagre, etc. Las deyecciones características son profusas de color amarillo brillante, diarréicas o arcillosas. Estos son los síntomas de Chelidonium, bien precisos por cierto. Permítaseme decir cómo debe aplicarse. Podemos hacer uso de la droga en el simple estado conocido como "bilioso", en la congestión o inflamación hepática y también en la pneumonía con síntomas biliosos. Los síntomas que reclaman quireclaman su uso en

esta última afección, los indicaré en seguida.

El dolor que produce Chelidonium en el ángulo inferior de la escápula derecha, nos recuerda algunos dolores semejantes que se encuentran en otros medicamentos. Chenopodium produce dolores obtusos en el ángulo inferior de la escápula derecha, pero más próximos a la columna vertebral que los de Chelidonium.

Ranunculus bulbosus tiene dolores que recorren todo el borde interno de la escápula izquierda, extendiéndose algunas veces más abajo del ángulo inferior e irradiando a través del pecho en el mismo lado.

Lobelia syphilitica produce este dolor, no abajo, sino por debajo, o sea en la cara interna del ángulo superointerno de la escápula izquierda, que empeora por llorar.

Angustura produce dolores agudos y cortantes que se irradian justamente de la parte inferior de la escápula derecha hacia el pecho hasta cerca de la tetilla.

Bryonia es muy semejante a Chelidonium en las afecciones hepáticas; los dos producen dolores agudos, pungitivos; los dos producen dolor en la parte inferior de la escápula derecha; los dos también producen inflamación del hígado. Pero Bryonia se distingue en las evacuaciones intestinales que son duras, secas y de color café, o bien si son fluídas, son pulposas abundantes y van acompañadas de un cólico semejante al que produce Colocynthis. Algunas veces las deyecciones tienen olor a queso añejo.

Lycopodium, que tiene alguna semejanza con Chelidonium, se distingue fácilmente, con especialidad por el ruido de las flatosidades en el hipocondrio izquierdo; en que el sabor de la boca es más bien agrio que amargo; en los vómitos ácidos; en la sensación de plenitud por tomar pequeñas cantidades de alimento y en la naturaleza de los dolores, que son obtusos y como de magulladura en Lycopodium y agudos y lancinantes en Chelidonium.

Podemos hacer uso de Chelidonium en la neuralgia facial; los dolores se extienden del malar del lado derecho a los dientes o a los ojos, pudiendo localizarse en los nervios supraorbitarios. Esta neuralgia no cederá a la acción de Chelidonium, a menos que los síntomas hepáticos de la droga estén presentes, pues se trata de una neuralgia que depende de desórdenes hepáticos y no de una prosopalgia idiopática.

Como he dicho ya, Chelidonium es de utilidad en la pneumonía con síntomas biliosos; también está indicado en la bronquitis capilar de los niños, cuando están presentes las ya citadas manifestaciones biliares; especialmente si la enfermedad sigue al sarampión o a la tos-ferina. En estos casos la cara tiende a tomar un color rojo-obscuro. Hay gran opresión de la respiración, lo que se revela por los esfuerzos que hace el enfermito para respirar y el movimiento en abanico de las alas de la nariz (diré de paso que este síntoma también se encuentra en Lycopodium), un pie está caliente y el otro frío, (otro síntoma de Lycopodium), hay un dolor pungitivo debajo de

la escápula derecha. Generalmente la tos es floja y estertorosa;la expectoración es difícil.

Mercurius está indicado algunas veces en la pneumonía con síntomas biliosos. En lo que más se distingue de Chelidonium es en el carácter de las deyecciones. Las de Mercurius son viscosas y van acompañadas de gran tenesmo, antes, durante y después de la evacuacón; en tanto que la evacuación es bien fácil en Chelidonium. En Mercurius es probable que la expectoración esté estriada de sangre y haya dolores agudos que se extienden a través de la parte inferior del pulmón derecho, al dorso. Este último síntoma se puede encontrar también en Chelidonium.

Antimonium tartaricum también tiene coloración amarillenta de la piel, de la orina y del vómito, etc., (en la neumonía biliosa) dolores pungitivos debajo de las falsas costillas del lado derecho, esputos espumosos, amarillos y tenaces; estertores en el pecho y sofocación; movimiento en abanico de las alas de la nariz; gran opresión y fuertes batimientos cardíacos.

Kali carbonicum es un medicamento frecuentemente olvidado en el tratamiento de la neumonía. No está indicado en el principio de la enfermedad, sino más tarde cuando hay exudado copioso en los pulmones, con notables estertores mucosos durante la tos. Hay agravación de los síntomas hacia las dos o tres de la mañana. La expectoración contiene pequeños glóbulos de pus. Incluso puede haber cianosis con abotagamiento de los párpados superiores.

Dd cucurbitaceas

1-Colocynthis cucumis.

2-Bryonia alba

3-Citrullus (Sandía) Las semillas son diuréticas

4-Cucúrbita (Chilacayote).

5-Momordica balsamum.-Produce flatulencia.

6-Elaterium momordica.-Intestinos y fiebre.

Hoy empezamos el estudio de las Cucurbitáceas. De este orden obtenemos seis u ocho medicamentos y algunas substancias comestibles; entre estas últimas se encuentra la sandía, el melón y el pepino; las semillas de algunas de estas tienen propiedades diuréticas y las de la sandía, calabaza y chilacayote, han sido empleadas contra los gusanos intestinales.

Respecto a las substancias medicinales obtenidas de este orden, se puede decir que todas tienen una acción muy marcada sobre el tubo digestivo. Una acción catártica parece ser común a todas. Probablemente obran paralizando los nervios vaso-motores del abdomen. Producen dolores calambroideos de retortijón y una diarrea acuosa y en chorro. Este último síntoma es más prominente en Elaterium.

Empecemos por enumerar estos medicamentos : el quinto en la lista es Momordica balsamum, del que sólo tenemos un síntoma característico y es la acumulación de gases en el ángulo esplénico del

colon; precisamente como sucede en Lycopodium. Es muy conveniente saber esto. Si, por ejemplo, durante el tratamiento de una enfermedad más o menos crónica el síntoma citado se vuelve muy molesto y no se quiere destruir la acción del medicamento que hemos prescrito, simplemente se puede intercalar una dosis de Momordica balsamun, que eliminará este síntoma y nos permitirá continuar el tratamiento.

Elaterium, otro miembro de este órden, en nuestra escuela se ha usado principalmente, para una forma peculiar de diarrea. Como todas las Cucurbitáceas, obra poderosamente sobre el tubo digestivo, produciendo una cantidad notable de serosidad dentro del intestino. De ahí que produzca una diarrea acuosa y abundante. Los síntomas característicos de este medicamento y que nos guiarán en su elección en el cólera infantil, son las evacuaciones acuosas de color verde aceitunado, que salen en chorro y van acompañadas de dolores cortantes abdominales. Por lo que se ve, puede compararse con Croton tiglium, Podophyllum y Veratrum album, lo mismo que a algunos otros análogos.

Se distingue desde luego de Croton tiglium, en que se adapta a los casos de evacuaciones profusas, amarillas, acuosas y se agravan por comer o beber.

Podophyllum tiene, como todos sabemos, la agravación matinal que lo distingue.

Los medicamentos restantes y que pertenecen a las Cucurbitáceas, son Citrullus (sandía); Cucúrbita (Cidracayote) cuyas semillas, así como las de calabaza, se han usado para la expulsión de la tenia; Colocynthis y Bryonia alba; estas dos últimas de gran importancia. Procedamos a considerarlas in extenso.

COLOCYNTHIS CUCUMIS

1. -Nervios Calambres.
Neuralgias
Colocynthis 2. -Intestinos
3. -Orina
4. -Gota

Colocynthis es una especie de calabaza como del tamaño de una naranja, con superficie lisa y verde de aspecto marmóreo. Seca, tiene un color cafe o moreno. No es indígena de este país, sino que procede de Siria y Turquía. Sin embargo, frecuentemente se les encuentra en el mercado mondadas y secas y de una apariencia como de bola de sesos, llena de semillas y de peso muy ligero; es inodora pero de sabor intensamente amargo.

Como los demás remedios de este grupo, Colocynthis produce una intensa irritación intestinal, con evacuaciones acuosas, en un principio, volviéndose después mucosas y sanguinolentas. Los dolores son atroces, de retortijón y cortantes, etc., pero esto no es todo. El medicamento afecta poderosamente el sistema nervioso y de ahí sus

efectos benéficos en el tratamiento de diversas neuralgías. Por lo que toca a los síntomas nerviosos, Colocynthis está estrechaménte asociado a Dioscorea villosa.

Además, este medicamento, por tanto tiempo limitado al tratamiento de los cólicos, últimamente ha efectuado curaciones en ciertas afecciones profundas del ovario, tales como tumores. Colocynthis obra directamente sobre los ovarios así como sobre el epidídimo. Es un error afirmar, como se hizo anteriormente, que Colocynthis no produce inflamación; pues en un caso de envenenamiento la autopsia reveló una aglutinación reciente en los intestinos, indicio de exudado inflamatorio. Está indicado en las afecciones ováricas con dolores pungitivos, como causados por una aguja y situados profundamente en la región ovárica derecha; hay dolores calambroideos que se mejoran por encorvarse el enfermo o por la persión.

Se han referido dos casos de tumores del ovario curados por Colocynthis basándose por su prescripción en estos síntomas.

Muy bien recuerdo de una señora que con Colocynthis curó de un cólico que había padecido durante tres años. En este caso los dolores eran calambroideos y mejoraban doblándose. No había lesiones orgánicas.

Ahora examinemos la acción de Colocynthis sobre el abdomen con los síntomas concomitantes de : gusto amargo, persistente, sed violenta, aerofagia, náuseas, vómitos alimenticios o de fluidos amargos; dolores de retortijón que obligan al enfermo a doblarse o a hacer presión fuerte sobre el abdomen. Este retortijón es el bien conocido síntoma del medicamento, ya sea de origen local o reflejo, debido a los gases, a los alimentos no digeridos o a un enfriamiento. O bien sea el resultado de emociones violentas, como lo que se ha dado en llamar cólico nervioso. Las deyecciones pueden ser fluídas, abundantes, formadas, flatulentas o pulposas; o bien viscosas o sanguinolentas precedidas de un fuerte tenesmo; pero en todo caso, habrá siempre retortijones que preceden a la evacuación y que se mejoran después de esta. Sin embargo, algunas veces el retortijón continúa después de la evacuación. Estas evacuaciones y el dolor, son provocados por tomar la mínima cantidad de alimentos o bebidas. Otras ocasiones, estos dolores de retortijón se convierten en dolores cortantes, de puñalada, que se extienden sobre todo el abdomen, irradiando hacia la pelvis. Se alivian por la emisión de gases o por la defecación. Esta presión por los gases puede molestar la vejiga; sin embargo, el alivio se siente inmediatamente después de los movimientos intestinales. La orina es fétida depositando un sedimento mucoso.

Dejaremos a Colocynthis por un momento, para compararlo con sus remedios concordantes.

Para los malos efectos de la ira, Colocynthis tiene relación estrecha con Chamomilla y Staphysagria y más lejana con Causticum. Se parece a Chamomilla en los efectos de las emociones violentas. Ambos pueden ser usados en los niños cuando estas emociones

producen calambres y aún evacuaciones biliosas. Chamomilla se distingue de Colocynthis, por la violencia de sus síntomas congestivos, sudor caliente en la cabeza, etc. El temperamento característico de Chamomilla también nos ayudará a hacer la elección.

Staphysagria debe sustituir algunas veces a Colocynthis, para los malos efectos de las emociones violentas en las mujeres y niños, cuando los intensos calambres abdominales, no cedan a la acción de Colocynthis.

En los síntomas abdominales y gastroentéricos debemos comparar a Colocynthis con Aconitum, Veratrum album, Bovistia, Croton tiglium, Elaterium y Mercurius.

Veratrum album tiene dolores abdominales que obligan al enfermo a doblarse, pero necesita caminar para sentir alivio. Tiene también sudor frío en la frente. Se aplica especialmente al íleo o invaginación intestinal.

El cólico de Bovista se alivia por encorverse después de comer; la orina es roja.

Croton tiglium tiene estos mismos dolores, con diarrea abundante y acuosa. Las evacuaciones son amarillentas, de color café o verdes y abundantes, saliendo en chorro y con una fuerza como la del agua al salir del bitoque. Hay agravación por mamar, si se trata de un niño, o por comer.

Como se ve por lo antes dicho, Colocynthis puede ser de utilidad algunas veces en las afecciones del estío y en la disentería. Se distingue de Croton tiglium que también tiene evacuaciones cada vez que el enfermo come o bebe, en que éstas son abundantes y acuosas y salen en chorro como si se tratara de una llave de agua. Elaterium cambia nuevamente el cuadro produciendo evacuaciones de color verde olivo, abundantes y en chorro. Es cierto que Croton tiglium produce evacuaciones verdes, pero son de un tinte verde café. Colocynthis se distingue de Mercurius en que el tenesmo y demás molestias cesan después de defecar en aquél. Se distingue de Nux vom., en que en éste, aunque el dolor cese después de defecar, las cámaras son escasas y hay frecuente e ineficaz urgencia de evacuar.

Los retortijones, ya descritos, de Colocynthis, no se limitan al canal intestinal; podemos confiadamente hacer uso del medicamento cuando se localizan en la vejiga en algunas formas de estranguria o en el espasmo de cuello, así como en el cólico menstrual, y sea uterino u ovárico. Sólo es necesario que el elemento nervioso predomine sobre la inflamación; que haya mejoría por encorvarse y por la presión enérgica para que pueda indicarse con acierto Colocynthis.

Transportando esta acción nerviosa del medicamento al sistema "voluntario", o sea el cerebro espinal, encontramos síntomas como los siguientes : dolores desgarrantes y calambres en el lado izquierdo después de una vejación o mortificación; dolores desgarrantes horadantes en la cabeza; pungitivos, agudos y cortantes en los

globos oculares, irradiando de ahí a la cabeza; agravados por el reposo y por inclinarse, mejorados por la presión enérgica y caminando; al inclinarse se siente como si el ojo fuera a salir de su órbita; hay lacrimeo acre y abundante. Estos síntomas sugieren el uso de Colocynthis en la gota y en la cefalalgia biliosa; así como en los dolores intensos de la iritis, en la neuralgía ciliar y en el glaucoma.

En estos casos se puede comparar con Chamomilla, Cedrón, Spigelia y Prunus spinosa.

Chamomilla tiene cefalalgía desgarrante del lado izquierdo debida a una cólera, a un estado bilioso, etc., pero la cara está más roja, hay sudor caliente, etc.

Cedrón produce dolores periódicos alrededor de los ojos; sin embargo, son generalmente supra-orbitarios, pudiendo ser de orígen palúdico.

Spigelia es muy parecido a Colocynthis. Los ojos se sienten demasiado grandes; los dolores son como de puñalada, desgarrantes e irradian; se agravan por la presión y por el movimiento, en tanto que en Colocynthis hay mejoría por pasearse en una habitación caliente y por la presión.

Prunus spinosa produce un dolor más compresivo, una sensación de como si las regiones fueran a despedazarse por la presión y dolores agudos que llegan al occipucio.

Colocynthis ha probado su valor curativo en las afecciones de la cadera, especialmente del lado derecho; hay punzadas durante la marcha, necesidad de estarse quieto, siendo esto seguido de pesantez y sensibilidad de la parte afectada; dolores calambroideos como si la región estuviera sujeta a un torno; el enfermo se acuesta sobre el lado afectado con la pierna flexionada sobre el muslo. Estudiando estos síntomas, vemos también la aplicación de Colocynthis en la ciática; dolores que se extienden por el nervio ciático hasta el hueco poplíteo e inclusive hasta el talón, agravándose por el movimiento. Los accesos dolorosos son seguidos de adormecimiento de toda la pierna y de parálisis parcial. Si el caso data de largo tiempo, la nutrición de la extremidad afectada está comprometida. Algunas veces los calambres de la pierna son tan intensos, que el enfermo siente como si la pierna estuviera ligada por cintas de hierro. Generalmente hay agravación por la noche.

Gnaphalium es muy parecido a Colocynthis en la ciática. Produce dolores neurálgicos intensos en el trayecto del ciático, que alternan con adormecimiento.

En los calambres musculares, deben compararse con Colocynthis, Nux vom., Veratrum album y Cholos terrapinae. Este último medicamento es el mejor que conozco para los calambres simples musculares.

Colocynthis puede ser de utilidad en el reumatismo, especialmente para la rigidez de las articulaciones que sigue al reumatismo agudo.

Sin embargo, si hay nudosidades en dichas articulaciones, debemos

pensar en Causticum y Guaiacum. Guiados por las propiedades constrictivas de Colocynthis, algunos médicos lo han usado en la parafimosis.
Colocynthis es antidotizado por Coffea, Camphora y Staphysagria.

Bryonia alba

Bryonia obra sobre los siguientes tejidos: la sangre, las membranas serosas, los músculos la piel. Sobre la piel produce un rash; en el sarampión, escarlatina, erupciones suprimidas. Obra también sobre las membranas mucosas y por último sobre los órganos.
Existen tres especies de Bryonia; son tan parecidas, que Allen las ha colocado todas bajo un mismo capítulo en su Enciclopedia. Bryonia es uno de los más antiguos medicamentos de la Materia Médica homeopática, así como uno de los más bien experimentados. La Bryonia alba crece en abundancia en Inglaterra y en todo el continente europeo. La tintura se prepara de sus raíces. Es un policresto que se adapta a muchas clases de enfermedades. Para mencionar todos los síntomas de Bryonia aún tratándose de los que le son característicos, necesitaría de dos o tres horas de trabajo arduo y contínuo. En el tiempo de que dispongo trataré de dar una explicación tal de Bryonia, que pueda ponernos en aptitud de emplearla en las enfermedades que alteran la sangre cuantitativa y cualitativamonte, así como a la misma circulación. Por ejemplo, está indicado en las afecciones piréticas; en la fiebre intermitente, aunque no con mucha frecuencia; en la fiebre de tipo remitente está indicado muy a menudo; algunas veces también está indicada en las fiebres sinocas y en las fiebres reumaticas, gástricas, biliosas, traumáticas y en la fiebre tifoidea. Los síntomas que caracterizan a Bryonia en las fiebres en las fiebres en general, son : aumento de la acción cardíaca, produciendo un pulso frecuente, duro y tenso, muy parecido al que encontramos en Aconitum. Hay efectivamente un aumento en la energía y el poder de la acción cardíaca. Esta acción es acrecentada por todos los movimientos del cuerpo, por consecuencia, el enfermo tiene necesidad de permanecer completamente quieto. Se encuentra también que hay casi siempre una intensa cafalalgía con estas fiebres. Esta es ordinariamente de un carácter notablemente pulsátil y puede haber fuertes dolores como de puñetazo en la cabeza; casi siempre va asociada a violentos dolores sobre los ojos o en la región superciliar. Todas estas partes tienen una sensibilidad exquisita al menor movimiento. Por ejemplo, el paciente evita mover los ojos por que esto agrava su dolor. El menor intento de levantar la cabeza de la almohada, produce una sensación de desfallecimiento y náuseas. La boca está muy seca y la lengua cargada, en las formas benignas de fiebre, como por ejemplo, en la fiebre sinoca o en el ligero tipo gástrico de fiebre. La capa que cubre la lengua es blanca, más especialmente notable en el centro. Los bordes de la lengua pueden estar perfectamnte limpios. A medida que la fiebre avanza se

aproxima más al tipo tifoideo. Los síntomas biliosos predominan. La capa blanca que recubre la lengua se vuelve amarillenta y va acompañada de sabor de la boca marcadamente amargo. Hay cefalalgía desgarrante, sensibilidad en el epigastrio, con punzadas, magullamiento y sensibilidad en el hipocondrio derecho. A medida que los síntomas tifoideos avanzan, la lengua se pone cada vez más seca, persistiendo el sarro. Si la fiebre es de tipo intermitente, se encontrará siempre el escalofrío mezclado con calor, es decir, que durante el escalofrío la cabeza está caliente, las mejillas de un color rojo-obscuro y mucha sed, generalmente de grandes cantidades y a grandes intervales. En algunos casos puede haber una sed continua. El pulso es duro, acelerado y tenso. El sudor es provocada por el menor ejercicio y tiene olor agrio o como de aceite.

Bryonia está indicado en los primeros estadios de la fiebre tifoidea y cuando están presentes los síntomas siguientes : alguna confusión mental; depresión del sensorio, pero no hay perversión de los sentidos. Durante el sueño, hay delirio, generalmente tranquilo. Al cerrar los ojos para dormir, el enfermo cree ver a personas que no están presentes sorprendiéndose de haberse equivocado al abrirlos nuevamente.

Algunas veces este delirio va acompañado o precedido de irritabilidad; el enfermo habla con precipitación, como en Belladonna. A medida que la enfermedad avanza, hay cierta pesantez durante el sueño que llega casi al estupor; el enfermo sueña con sus ocupaciones cotidianas. Frecuentemente con este delirio hay una cefalalgia frontal atroz. Si el enfermo está en condiciones de describirla, dirá que siente como si la cabeza le fuera a estallar; para mejor describir este dolor, solo se puede decir que se trata de una "cefalalgia desgarrante", siendo de carácter congestivo. La cara, por lo general, está congestionada y de color rojo-obscuro. Como los demás síntomas de Bryonia, se agrava por cualquier movimiento, presentándose con frecuencia la epistaxis. Esta epistaxis tiene tendencia especial a presentarse entre tres y cuatro de la mañana, yendo precedida a veces de sensación de plenitud cefálica. En los casos muy graves se notará que el enfermo se lleva las manos a la cabeza, apretándose la parte afectada y revelándose el padecimiento en su rostro. Sin embargo, bajo el estado de estupor no se queja, a no ser cuando ejecuta algunos movimientos automáticos. Otro detalle que se notará en la fiebre tifoidea, es la sequedad de las membranas mucosas, especialmente de la boca y el estómago, siendo esto el resultado de una secreción deficiente. En ningún caso es más notable esto que en los estados tifódicos. La boca está seca y sin embargo no habrá sed, y si la hay, es probable que tenga la modalidad descrita al tratar de la fiebre intermitente. El enfermo debe grandes cantidades a grandes intervalos. Después de tomar agua o al tratar de incorporarse el enfermo, siente náuseas mortales, llegando a veces a vomitar. Otras veces se queja de una fuerte presión en el epigastrio, como si ahí tuviera una piedra, obedeciendo esto, indudablemente, al

estado de sequedad en que se encuentra la mucosa gástrica, idéntico al de la mucosa bucal. La secreción gástrica es deficiente, por cuya razón los alimentos permanecen en el estómago largo tiempo sin ser digeridos. En los casos que reclaman el uso de Bryonia, generalmente hay estreñimiento. Cuando los intestinos llegan a funcionar, las materias fecales son duras, grandes y secas, de color café negro, siendo expulsadas con dificultad por la atonia rectal. Algunas veces, en casos bien avanzados de fiebre tifoidea que reclamen el uso de Bryonia, habrá evacuaciones blandas y pastosas. Hay otro síntoma que en ocasiones acompaña a la fiebre tifoidea al final de la segunda semana, y es la forma de delirio que presenta el enfermo, caracterizada por el deseo constante de "irse a su casa". Se imagina no estar en su propia casa, pidiendo que la lleven a ella, para que se la atienda, indicando esto a Bryonia; frecuentemente con dos a o tres tomas de este medicamento, desaparece dicho síntoma muy característico. En estos estados febriles es necesario conocer las relaciones de Bryonia con sus medicamentos concordantes. En primer lugar está Aconitum. Este ofrece relaciones íntimas con Bryonia en todos estos tipos de fiebre, excepto las fiebres gástricas, las intermitentes y las tifoideas. Aconitum no tiene de ninguna manera relación especial con estas fiebres, por más que se administre incorrectamente para disminuir la temperatura. La sintomatología de Aconitum es diametralmente opuesta en todos sentidos a la de la fiebre tifoidea. En la fiebre gástrica, puede administrarse en un principio, cuando el pulso es lleno, la piel seca y caliente y existe la inquietud del medicamento; pero a medida que la fiebre avanza, Aconitum deja de estar indicado, a menos que haya complicaciones biliares. En este último caso, Aconitum será suficiente para curar todo el trastorno. Los síntomas que distinguen a Aconitum de Bryonia, son los siguientes : en primer lugar, Aconitum precede a Bryonia y no éste a aquél : o dicho de otro modo : Aconitum está indicado en un estado menos avenzado que Bryonia. Aconitum se adapta a la hiperemia, a la congestión incluso al escalofrío que precede a la fiebre inflamatoria; Bryonia está indicado más tarde, cuando Aconitum falla. Los síntomas mentales de los dos medicamentos son tan diferentes, que no habrá peligro de confundirlos. Aconitum requiere que la mente esté excitada, que el enfermo esté inquieto, cambiando frecuentemente de lugar en su cama, que esté medroso; cree que se va a morir; en cambio, el enfermo de Bryonia, puede tener sufrimientos tan intensos como los de Aconitum, pero guarda un reposo absoluto, debido a que el movimiento agrava sus síntomas. En las primeras etapas de la fiebre tifoidea y algunas veces en la fiebre reumática, Bryonia puede estar indicado por el síntoma siguiente : el enfermo está inquieto, se bota en su cama de un lugar a otro obligado por la nerviosidad, y sin embargo tiene agravación por el movimiento. Otro medicamento más, que debe tenerse en cuenta en relación con Bryonia en estas fiebres, es Belladonna. con particularidad en el principio de la fiebre tifoidea. Ahora bien,

realmente no hay en la sintomatología de Belladonna, nada que pudiera indicar el uso de este medicamento en los casos muy avanzados de fiebre tifoidea. Solamente en el principio de esta enfermedad, puede confundirse con Bryonia; en primer lugar Belladonna tiene eretismo cerebral y delirio más violento que Bryonia; el paciente tiene subsaltos de las extremidades y estremecimiento durante el sueño; despierta saltando como espantado; tan pronto como cierra los ojos, ve personas y objetos de todas clases, desapareciendo todo cuando los abra; la cefalalgía de Belladonna es pulsátil y es probable que el enfermo se vea obligado a erguirse, más bien que a guardar quietud, para sentir alivio.

Otro medicamento que debe compararse con Bryonia es Rhus tox. Esta droga está indicada con frecuencia en la fiebre tifoidea. Ya conocemos el hecho histórico de que Hahnemann curó muchos casos de tifo con estos dos medicamentos, durante una epidemia que estalló en la guerra.

Desde la época de Hahnemann el uso de estos medicamentos en dicha enfermedad, se ha hecho universal. Recordaremos, sin embargo, que no son específicos. Los síntomas en cada epidemia pueden cambiar de tal manera. que reclamen el uso de otros medicamentos. Rhus tox., esta indicado cuando hay marcada excitación; el paciente se acuesta de un lado para en seguida voltearse del otro; por breves momentos el enfermo se siente mejor en su nueva postura; luego empieza a sentir el dolor de ese lado y nuevamente cambia al otro. Como en Bryonia, hay epistaxis que alivia los síntomas del enfermo y la cefalalgia ya descrita: "sensación de tener una tabla atada con fuerza a la frente". Hay dolores reumáticos con sensación de magulladura en las articulaciones y músculos de las extremidades. La lengua es diferente de la de Bryonia; es de color café, está seca y aun puede estar agrietada, con un triángulo rojo en la punta. siendo esto también un excelente dato para la indicación de Sulphur. En los casos de Rhus tox., frecuentemente hay diarrea desde un principio. Bryonia generalmente produce constipación.

Acabo de referirme al siguiente síntoma de Belladonna : "el paciente al cerrar los ojos, ve objetos y personas que desaparecen al volverlos a abrir". Tanto Calcarea ostrearum como China tienen este mismo síntoma. en el último medicamento, este aparece, no durante la fiebre tifoidea, sino despues de una hemorragia.

Deseo hablará en seguida de la acción de Bryonia sobre las membranas serosas, sobre las que obra intensamente produciendo inflamación. De ahí que con frecuencia se prescriba cuando las meninges cerebrales y medulares, la pleura y el peritoneo, así como las sinoviales, están inflamadas. Las indicaciones de Bryonia; en estas inflamaciones de las serosas, deben buscarse muy particularmente, cuando ya se haya producido el exudado. Hay dolores agudos y pungitivos que se agravan por el menor movimiento. La fiebre puede estar aún elevada o bien disminuida por

la acción del medicamento anterior.

Comparando de nuevo Aconitum con Bryonia, veremos que aquí se aplica la misma regla; es decir : Bryonia está indicado después de Aconitum y no antes de éste. Tomaremos como ejemplo un caso de pleuresía. En un principio, cuando la fiebre es elevada, eligiremos Acónitum, pero tan pronto como ésta comienza a disminuir y a medida que el derrame aparece, evidenciándose por los ruidos de frote, Aconitum dejará de prestar utilidad, cediendo su lugar a Bryonia, que será suficiente para afectuar la curación. Algunos médicos tienen la costumbre de dar Aconitum contra la fiebre y Bryonia contra las afecciones pleurales, al mismo tiempo, pero eso resulta inútil, pues Bryonia se adapta a la totalidad de la afeccion. Bryonia no produce la inquietud que reclama el uso de Aconitum. El enfermo experimenta mucho dolor, pero está quieto, se acuesta sobre el lado afectado.¿Por qué? porque ejerciendo presión sobre las costillas, la parte afectada se mueve menos que si el enfermo se acostara sobre el lado sano.

Bryonia es un medicamento de inapreciable valor cuando están afectadas las meninges cerebrales, pero en estos casos, sigue más bien a Belladonna que a Aconitum, salvo raras excepciones. Belladonna deja de ser el remedio indicado en la meningitis, sea o no de origen tuberculosos, cuando el derrame meningeo o ventricular comienza. Entonces cede su sitio a Sulphur en ciertos casos, a Apis en otros y a Bryonia en algunos otros. Bryonia está indicado cuando la meningitis es consecutiva a una erupción suprimida, como la escarlatina o el sarampión. El niño tiene la cara pálida o bien roja y pálida alternativamente, la lengua blanca; da gritos repentinos como si sufriera un agudo dolor, como en efecto sucede. Estos dolores son de carácter agudo y lancinante y se manifiestan especialmente al moverse el enfermo. Hay desviación marcada en uno o en los dos ojos. Regularmente hay constipación, estando el abdomen distendido y el niño tiene una depresión sensorial muy notable, preciendo aproximarse al estupor. Si despierta y se le ofrece alguna bebida, la toma precipitadamente y con avidez, justamente como sucede en Belladonna. Este último medicamento produce una rotación más notable de la cabeza.

Por razones de conveniencia, estudiaremos en seguida los catarros que produce Bryonia y los efectos de este medicamento sobre el tejido pulmonar. Bryonia está indicado en el catarro nasal, cuando hay una gran sequedad en la mucosa de este órgano con ronquera y estornudos o más frecuente, cuando la secreción es amarilla y espesa. También está indicado Bryonia, cuando, siendo la secreción de esta naturaleza, se suprime súbitamente, presentándose como consecuencia de esto, una cefalalgia sorda y pulsátil, localizada por encima de los senos frontales. Lachesis también es de utilidad para el coriza suprimido; pero no tiene tan marcada la agravación por el movimiento, ni tampoco la secreción amarilla. El tratamiento de los resfríos o catarros, es una prueba rigurosa de la competencia del

médico. Es necesario, para tratar estos casos con éxito, conocer a fondo la Homeopatía. Se trata de los casos más difíciles por lo que frecuentemente se nos consulta, por dos motivos : uno de ellos es porque el enfermo está constantemente expuesto a los elementos y el otro, porque generalmente no los vemos con la debida minuciosidad. Si se diera la oportunidad para observarlos con la debida atención y para cambiar los medicamentos a medida que los síntomas variaran, podrían ser curados con rapidez.

También podemos hacer uso de este medicamento en la neumonia; el tipo de la enfermedad a que se adapta Bryonia, es el tipo francamente cruposo. Del mismo modo que está indicado Bryonia en la pleuresía con derrame, ocupa su sitio en la pneumonía cuando ya se ha verificado el exudado fibrinoso. Generalmente, cuando Bryonia está indicado, hay también pleuresía, estando por esto indicado en la pleuro-neumonía. No es correcto darlo al principio de la enfermedad, pues el exudado no se presenta en este período, estando indicado después de Aconitum, cuando se presenta el siguiente cuadro : la fiebre continúa, pero la piel no está tan caliente, ni la cara tan roja, ni presenta tanta inquietud el enfermo, come cuando conviene el uso de Aconitum. El paciente está más sosegado, pero su rostro y sus actitudes, revelan ansiedad. Desearía que se hiciera una distinción entre este estado y el que reclama el uso de Aconitum. En este último, la ansiedad que revela el rostro, no es ansiedad mental, sino el resultado de la compresión pulmonar; esto debe tenerse siempre en cuenta. La tos que bajo la acción de Aconitum era seca y molesta, con expectoración espumosa, acaso siga siendo molesta, pero es más floja y húmeda; hay muy poca expectoración todavía, pero ésta es amarillenta o estriada de sangre. Debido a la inflamación concomitante de la pleura, se experimentan dolores agudos en el pecho, siendo más notables en el lado izquierdo; el paciente se queja de fuerte opresión, precisamente a nivel de la región esternal. El pulso es lleno, duro y tenso; la orina, de color rojo-obscuro y escasa.

Otro medicamento que se debe colocar a lado de Bryonia en la neumonía, es Antimonium tartaricum. Está indicado, cuando este padecimiento se inicia con bronquitis, extendiéndose después al pulmón. Se adapta especialmente a los casos que se inician en el lado derecho con los mismos dolores agudos y pungitivos, fiebre elevada y gran opresión de pecho, como en Bryonia; pero tadavía se adapta más a la neumonía catarral que a la cruposa. Con toda claridad se perciben en el pecho esterotres mucosos.

También debemos tener en cuenta a Sanguinaria y Chelidonium.

Hay algunos otros medicamentos aparte de Bryonia, que presentan estos dolores agudos en las paredes torácicas. Gaultheria produce pleurodinia, con dolores en el mediastino anterior.

Ranunculus bulbosus es, sin duda, el mejor medicamento para el reumatismo intercostal; produce dolores vivos y pungitivos y punto doloroso de costado, agravándose por cualquier movimiento (aún por respirar), por la presió o por el cambio de tiempo. En estos casos la

disnea es en ocasiones muy penosa.

Arnica, algunas veces es de utilidad cuando predomina la sensación de adolorimiento, como de magulladura.

Rhus radicans está indicado en la pleurodina, cuando los dolores agudos irradian al hombro.

Senega obra mejor en personas gruesas y de fibra laxa. Es de utilidad en los resfríos, cuando hay mucho adolorimiento, dolor en las paredes torácicas y gran acumulación de moco; hay ronquera; la garganta está tan seca y sensible, que duele al hablar, terminando la tos frecuentemente con estornudos.

Rumex produce dolores agudos y pungitivos a través del pulmón izquierdo; está indicado más bien en los primeros períodos de la tisis; cuando el paciente se voltea, experimenta dolores agudos y pungitivos a través del pulmón izquierdo siendo más útil en los primeros estadios de la tisis.

Trifolium pratense produce ronquera y accesos de sofocación en la noche, durante la tos. Hay rigidez del cuello y calambres en el esternocleidomastoideo, que se alivian por el calor y el frotamiento.

Actea racemosa produce pleurodinia, peor del lado derecho especialmente en las mujeres nerviosas. En la bronquitis, Bryonia está indicado cuando existe la misma presión a nivel de la región esternal; la dispnea es marcada; la tos es seca y parece tener origen en el estómago. Algunas veces arroja una pequeña cantidad de esputos tenaces y estriados de sangre. La tos se agrava después de las comidas pudiendo terminar en vómito. Mientras está tosiendo, el enfermo se oprime el pecho para mitigar sus dolores; estos mismos síntomas lo indicarán en la tosferina. El niño tose inmediatamente después de comer, vomita y vuelve a la mesa.

Volviendo al estudio de Bryonia sobre las membranas serosas, encontramos que produce sinovitis; la articulación afectada es de color rojo pálido y parece restirada. Naturalmente, hay derrame dentro de la bolsa sinovial y dolores agudos y pungitivos que se agravan por cualquier movimiento. En estos casos, está indicado Bryonia, ya sea que el padecimiento provenga del reumatismo o sea de causa traumática.

El medicamento que más concuerda con Bryonia en estos casos, es Apis, que resulta excelente en la sinovitis, con particularidad, cuando afecta la articulación de la rodilla. Los dolores agudos, lancinantes, pungitivos y el derrame articular, son otras indicaciones para el uso de este medicamento. Apis debe preferirse a Bryonia, cuando la enfermedad es de origen escrofuloso o al menos se presenta en una persona de esta constitución.

Apis también produce otra clase de inflamaciones que terminan con engrosamiento de la bolsa articular y de los tejidos y cartílagos que rodean la articulación, dando lugar al tumor blanco, bien conocido.

También debemos tener en cuenta a Sulphur en estos casos, que complementa la acción de Bryonia y de Apis acelerando su acción, cuando no obran debidamente.

En seguida estudiaremos la acción de Bryonia sobre el sistema muscular. Es de los pocos medicamentos que producen inflamación positiva en el tejido muscular; por consiguiente, es de esperarse que preste utilidad en el reumatismo muscular. Los músculos están sensibles al tacto y a veces hinchados y como es natural, hay agravación de los dolores por el menor movimiento.

Bryonia también puede estar indicado en el reumatismo articular. En estos casos la fiebre no es muy elevada y los dolores y la hinchazón no cambian de sitio, o si lo hacen, es con lentitud. La inflamación local es muy violenta, siendo esto. característico de Bryonia. Las partes afectadas están muy calientes y de color rojo-obscuro o rojo-pálido. En estos casos el pulso es lleno y fuerte y la lengua está uniformemente blanca, o lo que es más característico, seca y blanca en el centro. Hay constipación; inútil es decir que los dolores se agravan por el movimiento.

La diferencia entre Bryonia y Rhus es principalmente esta: Rhus se adapta al reumatismo que proviene de la exposición a la humedad, especialmente cuando el enfermo está agitado y sudando. Además, el enfermo de Rhus encuentra mejoría por el movimiento; ataca el tejido fibroso y las vainas de los músculos, en tanto que Bryonia afecta al tejido muscular mismo.

La diferencia entre Ledum y Bryonia puede expresarse de este modo : el primero es de utilidad en la inflamación reumática o gotosa del dedo gordo del pie y en vez de haber propensión a un derrame abundante, éste es escaso y tiende a formar nudosidades duras. En hinchazón de las articulaciones de la cadera y del hombro, deberemos tener en cuenta a Ledum como de más utilidad que Bryonia.

Actea spicata tiene afinidad especial por las pequeñas articulaciones y como síntoma característico, el siguiente : el enfermo sale a pasear sintiéndose más o menos bien, pero a medida que sigue caminando, las articulaciones le duelen y aun llegan a hincharse.

Viola odorata tiene acción específica sobre las articulaciones de la muñeca derecha.

Caulophyllum se adapta con especialidad al reumatismo de las articulaciones falángicas y metacarpianas, particularmente si se trata de mujeres.

Sabina afecta las pequeñas articulaciones; hay nudosidades gotosas y los dolores se agravan en una habitación caliente.

En Colchicum, hay marcada agravación al caer la noche, estando las articulaciones afectadas, hinchadas y de color rojo-obscuro; particularmente es útil en las personas debilitadas, o en aquellas que, a pesar de la inflamación reumática local, presentan síntomas de entorpecimiento general. El estómago casi siempre está afectado, produciendo náuseas el olor de los alimentos. La orina es escasa y roja provocando ardor a su paso por la uretra. Los dolores de carácter desgarrante o de sacudidas y se sienten como en el periostio; siendo superficiales en verano y profundos en invierno. Bryonia produce gran opresión retroesternal, agravada por el

movimiento; dolores agudos en la región precordial; derrames en el pericardio, con pulso fuerte. Colchicum tiene derrame intrapericárdico; plenitud y opresión al acostarse sobre el lado izquierdo, lo que obliga al enfermo a voltearse sobre el lado derecho. El pulso es pequeño, débil y acelerado. Los dolores de Colchicum aparecen alrededor del cuello y hombros o bien en una pequeña parte del cuerpo, cambiando rápidamente de lugar.

Guaiacum es de utilidad en las formas crónicas de reumatismo cuando las articulaciones están deformadas por nudos. Es también de utilidad en la pleuresía durante el segundo período de la tisis, con esputos mucopurulentos.

Arctium lappa puede compararse con Bryonia en el reumatismo; cura el adolorimiento de los músculos cuando los dolores son sordos y se agravan por el movimiento; la orina es de color obscuro. Todos los experimentadores de este medicamento estaban tan cansados y tan somnolientos, que no podían trabajar.

Ahora consideraremos su acción sobre el tubo digestivo. Hemos enumerado estos síntomas de Bryonia tantas veces, que ahora sólo serán mencionados de paso. Hay sequedad del revestimiento mucoso en todo el trayecto; la lengua está cubierta de un sarro blanco; la sed característica del medicamento, y sensación de como si un objeto pesado embarazara el estómago, cámaras secas y de color café, que pasan con dificultad debido a su dureza y a la atonía rectal; intolerancia para las legumbres. Todos estos síntomas se agravan en verano. Parece ser que el paciente de Bryonia no soporta el calor del sol; el hígado también está afectado, pues se advierte congestionado e incluso inflamado. Los síntomas gástricos precitados complican caso; el peritoneo peri-hepático está inflamado y por consecuencia hay puntos dolorosos agudos en el hipocondrio derecho, que se agravan por el menor movimiento y mejoran por acostarse sobre el lado afectado.

En la ictericia ocasionada por catarro duodenal, puede administrarse Bryonia, especialmente cuando la afección ha sido ocasionada por un coraje. Aunque aparentemente el enfermo está caliente, se queja de escalofríos.

Chelidonium es un medicamento admirable para cuando los síntomas son muy parecidos a los de Bryonia; hay dolores agudos en la región hepática, irradiando en todas direcciones, al pecho y al abdomen; hay dolor bien marcado debajo de la escápula, que se extiende al pecho dando la sensación de un clavo; diarrea con evacuaciones de color arcilloso o bien amarillentas; se distingue de Bryonia particularmente por el aspecto de las evacuaciones y el dolor peculiar debajo de la escápula.

También se parece Bryonia a Kali carb, que está indicado en las afecciones biliares, cuando hay dolores agudos en el hipocondrio derecho que irradian al torax; frecuentemente hay también un dolor agudo que parte del lóbulo inferior del pulmón derecho. La diferencia entre estos dolores y los de Bryonia, consiste en que en Kali carb. no

se agravan necesariamente por el movimiento.

Yuca filamentosa es un remedio admirable para los estados biliosos, con dolor que irradia de la parte superior del hígado a la espalda; hay mal sabor de la boca; las deyecciones son de carácter diarréico y contienen bilis en exceso. Hay considerable expulsión de gases porá el recto.

Chamomilla, como Bryonia, está indicado en el estado bilioso que sucede a una cólera; en esta último, es probable que haya escalofrío durante el mismo; en tanto que el paciente de Chamomilla se agita y suda.

Berberis vulgaris también produce dolores agudos y pungitivos en la región hepática, pero estos irradian de la décima costilla hacia abajo hasta el ombligo.

Como ya he dicho, en Bryonia generalmente hay constipación pero en ciertos casos sucede lo contrario. Bryonia está indicado en la diarrea, cuando esta proviene de comer legumbres o frutas cocidas y también por el calor del verano; las deposiciones se agravan especialmente en la mañana, después de levantarse el enfermo y cuando comienza a moverse, lo que le distingue de Sulphur, colocándolo a lado de Natrum sulphuricum. Otras veces el enfermo es atacado de dolores súbitos de retortijón, que lo obligan a doblarse; las evacuaciones son abundantes y pastosas, siendo éstas algunas veces de color verde obscuro debido a que están mezcladas con bilis; tienen olor a queso añejo.

En seguida estudiaremos la acción de Bryonia sobre los diversos órganos. Los síntomas mentales se han descrito con bastante detenimiento al hablar de la fiebre tifoidea. Solo diré que los enfermos son irritables y se enfadan con facilidad. Este estado de ánimo está presente con los síntomas biliosos, con la cefalalgía y en la dispepsia, de hecho es caracteristico de Bryonia.

Como ya se ha dicho, la cefalalgía de Bryonia se agrava por cualquier movimiento; aun el movimiento de los ojos agrava el dolor; éste empieza en el occipucio o bien en la frente e irradia al occipucio; se agrava en la mañana al despertar; por los accesos violentos de cólera y por agacharse. Sus causas excitantes son la exposición al calor, especialmente al calor húmedo, y la atmósfera caliente y la neblina; los resfríos, las borracheras y el reumatismo. Hay cefalalgía por planchar.

El medicamento más parecido a Bryonia en esto, es Gelsemium, que tiene cefalalgia con adolorimiento de los globos oculares y agravación por moverlos.

Natrum mur, produce cefalalgia con latidos, como ocasionada por pequeños martillazos y que se agrava por mover la cabeza o los ojos.

En la cefalalgia occipitial, Bryonia debe compararse con Petroleum que también produce cefalalgía occipital pulsátil; y con Juglans cathartica que tiene cefalalgia occipital, siendo los dolores agudos.

Carbo veg. y Nux vóm., producen dolores occipitules por un acceso bilioso.

En las partes externas de la cabeza, Bryonia desarrolla un sudor aceitoso de olor agrio.

Un síntoma parecido, pero referente a la cara, se encuentra en Natrum mur.

Bryonia es un medicamento de valor en las enfermedades de los ojos. pero no cuando están afectadas las capas exteriores de los mismos. Debe pensarse en Bryonia para las metastasis del reumatismo a los ojos. Los dolores son intensos e irradian a través del globo ocular a la parte posterior de la cabeza o hacia el vértice o la parte posterior de los mismos globos oculares. Hay una sensación de tensión, como si estos fueran estirados. También Antimonium tartaricum tiene metastasis del reumatismo a los ojos.

Por lo que he dicho, se deduce que Bryonia está indicado en la inflamación de las membranas serosas con derrame; por lo que sintomática o patológicamente, sería un remedio de valor en el glaucoma. La presión intraocular está marcadamente aumentada. Hay salida de lágrimas calientes y fotofobia y disminución del poder visual.

La odontología de Bryonia es de origen reumático y ocasionada por un enfriamento; se presenta con frecuencia en los dientes sanos, lo que nos hace suponer que es el nervio el afectado. Pueden estar invadidas varias piezas dentarias por el dolor y haber alivio momentáneo apoyando fuertemente la cabeza sobre la almohada o por las aplicaciones frías.

La odontalogía de los niños con piezas cariadas y que encuentra alivio por aplicaciones de agua fría, tiene su mejor medicamento en Coffea.

Kreosotum produce neuralgia facial con dolores urentes que se gravan por el movimiento y por hablar, con especialidad en personas nerviosas e irritable, cuyos dientes se carían rápidamente.

Bryonia puede usarse en la inflamación aftosa de la boca; el niño coge el pecho, pero luego lo suelta y llora; se nota la sequedad característica de Bryonia, pues cuando la boca se humedece por la leche, el niño sigue mamando bien. La orina característica de Bryonia es obscura, de color café rojizo, sin sedimento alguno, debiéndose este cambio a un exceso de materias colorantes.

Bryonia tiene alguna acción sobre los órganos genitales femeninos. Está indicado en los trastornos menstruales cuando el flujo es de color rojo-obscuro y abundante, pero con especialidad, cuando la menstruación se ha suprimido, presentándose lo que se ha llamado menstruación vicariante. En estos casos debemos compararla con Pulsatilla y Phosphorus. máxime si la supresión va seguida de hemoptísis o hematemésis.

Hamamelis, Ustilago y Millefolium, son útiles en la hematemésis.

Senecio está indicado en estos casos si hay tos con expectoración sanguinolenta.

Bryonia está indicado en las parturientas. Hace años que tengo costumbre de hacer uso de Bryonia en la llamada fiebre de leche.

Considero a este medicamento más indicado que ninguno otro, porque sus síntomas corresponden a los de la enfermedad. La fiebre no es muy acentuada; hay tensión de los senos con cefalalgía, dolores desgarrantes en las extremidades y la enferma está fatigada con deseo de reposo.

Bryonia está indicado cuando amenazan presentarse los abscesos mamarios y hay dolores agudos y pungitivos, tensión en los pechos y la hinchazón es de color rojo pálido.

En el principio de los abscesos mamarios, debemos comparar ante todo a Bryonia con Belladonna, que está útil cuando los síntomas son violentos; enrojecimiento con latidos que irradian de un punto central de la inflamación.

Phytolacca es un remedio excelente cuando desde un principio los senos tienden a infartarse siendo especialmente el medicamento indicado, cuando amenaza la supuración. Cuando el niño mama, hay dolor que se extiende del pezón a todo el cuerpo, irradiando hacia arriba y hacia abajo de la columna vertebral; hay secreción excesiva de leche.

Phellandrium acuaticum cuando los dolores siguen el trayecto de los conductos galactóforos entre una y otra tetada.

Croton tiglium, cuando hay dolor en el pezón que irradia a la espalda, como si se tirara de un cordón cada vez que el niño mama.

Bryonia debe tenerse presente en los casos de sarampión, estando indicado cuando la erupción tarda en presentarse. Hay una tos dura y seca que hace llorar al niño; éste se dobla como para resistir el dolor desgarrante que produce el esfuerzo de la tos. La expectoración puede ser nula o escasa. Los ojos están inflamados. En otros casos la erupción desaparece súbitamente, siendo esto seguido de síntomas cerebrales. El niño está somnoliento; tiene la cara pálida y contorsiones en los músculos de la misma, de los ojos y de la boca. Cualquier movimiento hace que el niño grito por el dolor que le ocasiona. En otros casos, en vez de presentarse estos síntomas cerebrales, hay procesos inflamatorios del pecho, bronquitis y aún neumonía.

Bryonia no está indicado con frecuencia en la escarlatina, pero en los casos que reclaman su uso, encontraremos uno o todos los síntomas siguientes que nos conducirán a su elección : el rash no es liso, como en los casos de Belladonna, sino que está esparcido entre otras erupciones de forma miliar; se presenta de un modo imperfecto y hay síntomas del tórax y los cerebrales que hace un momento mencioné. Ahora bien, si es cierto que en todos estos casos los sentidos están embotados, sin embargo, no hay verdaderas alucinaciones como en Belladonna; ni escucha el en fermo voces que le llaman, como sucede en Anacardium; ni despierta espantado abrazándose a las personas que le rodean, como sucede en Stramoninum o Cuprum.

Cuando se ha suprimido alguna erupción y como consecuencia se ha afectado el cerebro, podemos pensar en Cuprum que está indicado cuando los síntomas son violentos. El niño se estremece durante el

sueño. Hay una notable perversión de los sentidos y están presentes las convulsiones características de Cuprum.

Debemos dar la preferencia a Zincum en estos casos, cuando el niño está demasiado débil para que se desarrolle la erupción y cuando aparece, es muy escasa. La superficie del cuerpo está más bien fría. El niño yace en estado de estupor y rechina los dientes, estremeciéndose durante el sueño. Se observa estrabismo y nistagmus, habiendo una marcada inquietud de los pies y pupilas dilatadas. Cuando el pecho se afecta como consecuencia de la erupción repercutida del sarampión y hay disnea, tos, etc., debemos pensar en Ipecacuanha.

En tratándose de viruela, debemos preferir a Antimonium tartaricum y no a Bryonia.

Bryonia es complementario de Alumina.

Sus antídotos son Nux vom. Chamomilla, Pulsatilla, Rhus y Senega.

Bryonia es antídoto de Rhus tox., Rhus venenata y Chlorum.

Dd coniferas

Entre estas tenemos a Abies nigra que obra sobre el estómago; a Sabina Juniperus en el aborto; a Pinus silvestris en la atrofia infantil; a Terebenthina, que obra sobre los riñones, vejiga, etc., sobre las membranas mucosas, el útero, en los estados tifódicos y en la hidropesía renal.

Debe compararse Terebinthina con Arsenicum, Cantharis, Copaiva, Camphora, Phosphorus.

Pix líquida obra sobre los pulmones y en las erupciones.

Pix líquida debe compararse con Anisum stellatum.

Thuja occidentalis obra sobre el sistema nervioso, en la sicosis, en la sífilis, en la variola y en el marasmo.

Thuja debe compararse con Pulsatilla, Kali-bichromicum, Spigelia, Mercurius, Nitricum acid., Natrum sulphuric, Euphrasia y Staphysagria.

El orden de las Coniferas o plantas que producen conos, es muy extenso; trataremos de estudiarlo hoy. De este orden obtenemos las diferentes variedades de pino, de Cicuta y de pinos de los que se obtienen diversos destilados de trementina. Los medicamentos principales de este grupo son : Abies niegra, o sea el abeto negro; Sabina juniperus, una especie de enebro del que se obtiene el aceite de sabina, medicamento bien conocido como abortivo. Pinus silvestris, una variedad del pino. Terebinthina o trementina, obtenida de muchos de estos pinos : Pix liquida o brea y Thuja occidentalis o arbor vitae, árbol de la vida.

Abies nigra

No puede menos que mencionar un síntoma de este medicamento, síntoma que ha sido confirmado con frecuencia; me refiero a la aplicación de esta droga en la dispepsia, cuando el enfermo se queja de una sensación de como si hubiera ingerido alguna substancia

indigesta que se hubiera adherido al cardias. Este es el síntoma principal y característico del medicamento. También están presentes el abatimiento del espíritu, la hipocondriasis y la constipación originada por la dispepsia.

Sabina

También me veré obligado solamente a mencionar a Sabina juniperus, por la falta de tiempo. Es conocido como medicamento útil en el tratamiento de las enfermedades uterinas y para impedir el aborto, especialmente durante el tercer mes. Los síntomas que reclaman su uso en este último accidente, los aprenderán del Profesor de Ginecología Dr. Betts. Someramente diré cuales son : dolor que empieza en la cintura e irradia por ambos lados hacia el pubis; dolores tractivos, de magulladura, tan comunes en los casos de aborto; dolores que atraviezan desde el sacro hacia el pubis; siendo este último síntoma muy característico de Sabina. Aparte de estos síntomas, hay salida de sangre roja, rutilante y coagulada, que aumenta por el movimiento.

Puede hacerse uso de Sabina en la hemorragia post-partum con retensión de la placenta y estando presentes los síntomas ya mencionados.

Terebinthinae oleum

Terebinthina o trementina, es una droga de la que mucho se ha abusado en la antigua escuela y que también ha sido muy descuidada por los médicos homeópatas. Por los errores en que incurren en el uso de esta droga en la antigua escuela, nosotros con frecuencia la olvidamos del todo.

Sodo dispongo del tiempo suficiente para decir que Terebinthina obra sobre los riñones y la vejiga principalmente. Cuando en la metritis, peritonitis, fiebre tifoidea, escarlatina o cualquiera enfermedad grave de carácter asténico se presenten los siguientes síntomas renales Terebinthina puede actuar como remedio curativo : dolores sordos y ardor en la región renal; dolores que irradian de los riñones a los ureteres; ardor durante la micción; estranguria; orina albuminosa y como síntoma muy característico, esta es de color obscuro, de aspecto nebuloso y humoso, como ti tuviera sedimentos de sangre descompuesta, lo que en efecto sucede. El verdadero estado patológico en estos casos, no es el mal de Bright, ni el de una formación fibrinosa, sino de una congestión renal, con derrame sanguíneo lento en la pelvecilla del riñón. Cuando los síntomas urinarios citados estén presentes, podemos hacer uso confiadamente de Terebinthina, sin importarnos que nombre tenga la enfermedad. El olor de la orina es como el de las violetas, como en Cantharis, Copaiva, Osmium y Selenium.

Terebinthina frecuentemente obra con energía sobre las membranas mucosas; produce ardor en el aparato respiratorio, con expectoración delgada, muy difícil de expulsar.

Es de utilidad algunas veces en el asma húmedo con los síntomas

concomitantes ordinarios ya mencionados.

Terebinthina se ha usado para la expulsión de los gusanos intestinales. El niño se estremece y grita durante el sueño. Se escarba las narices; tiene sensación de asfixia, y una tos seca, con gargageo, pudiendo hasta haber convulsiones. El alcohol favorece la acción de Terebinthina.

Pix liquida

Pix líquida solo tiene dos síntomas dignos de tomarse en cuenta. Uno de ellos se debe a su acción sobre los pulmones. Puede darse confiadamente en los procesos supurativos que afectan el pulmón izquierdo, con dolor localizado en el tercer cartílago costal del mismo lado.

Anisum stellatum produce este mismo dolor en el hemitórax derecho; los síntomas antes citados de Pix y de Anisum stellatum, han sido comprobados repetidas veces.

Los medicamentos que producen dolor en el hemitórax izquierdo, dignos de consignarse aquí, son los siguientes : Myrtus comunis, en la parte superior; Sumbul, tiene diversos dolores; Fluoric acid, Oxalic acid., Actea racemosa, debajo del pezón; Lilium, a través del corazón o de la mama, irradiando a la espalda; Kali carb y Sulphur, que pasan del pecho a la espalda; Sarsaparilla, dolor que se extiende de la espalda al lado izquierdo del pecho; Pulsatilla nuttaliana, dolor en el lado izquierdo, debajo del brazo, cerca de la espalda; Guaiacum, dolores pungitivos en las primeras tres costillas, esputos purulentos; Theridion, Phosphorus y Silicea.

Pix líquida también produce una erupción, especialmente en el dorso de las manos, agrietándose y produciendo una comezón inaguantable por la noche; sangre al rascarse.

Thuja occidentalis

Vamos a estudiar ahora Thuja occidentalis, el último medicamento de este grupo y tendremos tiempo suficiente para hacerlo con detalle. La historia de esta droga es una pequeña novela. En cierta ocasión Hahnemann recibió en su consultorio a un paciente que se quejaba de síntomas relacionados con los órganos genitales, que eran, por lo menos, sospechosos. Se trataba de un escurrimiento uretral, espeso y purulento, acompañado de ardor durante la micción; había también pequeñas erupciones con comezón sobre el glande y algo de inflamación en las partes afectadas. Hahnemann supuso que su paciente habia contraído una gonorrea, cosa que fué enérgicamente negada por el enfermo, que por cierto era estudiante de Teología. Sin embargo, partiendo del principio que prevalece en todos los tribunales, de considerar a un hombre inocente en tanto no se haya comprobado su culpabilidad, Hahnemann optó por no dar medicamento alguno al joven estudiante, recomendándole que lo volviera a ver después de tres días. Cumplido el plazo, el enfermo volvió ya curado; esto desconcertó a Hahnemann. Interrogó

estrechamente al paciente, pero no encontró ninguna causa que pudiera explicar satisfactoriamente este fenómeno. Sin embargo, el joven recordó que habiendo estado en un jardín, pocos días antes, había masticado algunas hojas de arbor vitae. Esto indujo a Hahnemann a investigar las propiedades medicinales de Thuja, comprobando que el estudiante de Teología no había mentido.

A pesar de esto, no debemos restringir exclusivamente el uso de Thuja a la sicosis, pues tiene otra acción muy importante sobre la economía, especialmente sobre el sistema nervioso. Si es cierto que debemos tener siempre en cuenta que estos fenómenos nerviosos pueden estar ligados a la sicosis o depender de esta tara, también no debemos olvidar que pueden existir independientemente de ella. Grauvogl nos habla de la constitución hidrogenoide, sobre la cual, la acción del virus gonorreico, es de lo más pernicioso. Si un individuo de esta constitución contrae la gonorrea, tiene más probabilidades de quedar afectado por esta tara constitucional. Esta constitución puede existir aun fuera de toda tara sicósica. En la constitución hidrogenoidea, los afectos de la vacuna son muy nocivos. Cuando en la práctica encontramos individuos que padecen por los efectos de la vacuna, siendo el virus puro, podemos catalagarlos en la lista de los de constitución hidrogenoide. Tenemos dos medicamentos para los malos efectos de la vacuna : Silicea que se adapta a cualquier clase de síntomas, incluso las convulsiones, y Thuja indicado con especialidad cuando se presenta la diarrea y las pústulas de la vacuna son muy grandes. Fué por este último síntoma, por el que Boenninghausen, recomendó el uso de Thuja en la viruela. Lo aplicaba desde que las vesículas comenzaban a convertirse en pústulas, con el intento de evitar las cicatrices.

Volvamos a nuestro estudio de Thuja sobre el sistema nervioso. El enfermo se encoleriza fácilmente, es impaciente en su manera de ser; habla precipitadamente; sus movimientos son exageradamente activos y precipitados; monta en cólera con facilidad; aún las cosas más triviales excitan su ira y le ponen nervioso; se despiertan en él las emociones más nobles; por ejemplo, la música le hace llorar y le produce temblor en los pies. Hay una forma de locura o manía, en la que Thuja es el único medicamento indicado y es cuando el enfermo está obcecado en que su cuerpo está hecho de una substancia quebradiza y no permite que nadie se le acerque, por temor a que se rompa. Este síntoma no es el de Antimonium crudum; pues no es debido a la irritabilidad mental, por lo que el enfermo hace que las personas no se le acerquen y que ni aún permita que le vean, sino que es un síntoma que consiste en una obcecación creyendo que su cuerpo está hecho de vidrio. O bien puede creer el enfermo que su cuerpo está separado de su alma, o que hay una persona extraña a su lado. Otro característico singular de Thuja, es uno que fué encontrado por primera vez en una solterona; esta señorita experimentaba la sensación de como si un niño vivo estuviera dentro de su vientre; síntoma que ha sugerido el uso de Thuja en el falso

embarazo.

Con estos síntomas nerviosos que indican al medicamento en la melancolía y otras formas de locura, encontramos trastornos circulatorios, ebullición de la sangre, pulsaciones en todo el cuerpo y ansiedad precordial. Encontramos también diversas formas de neuralgias; de ahí que esté indicado en la cefalalgía conocida con el nombre de "clavo histérico", en la que la enferma experimenta una sensación de como si le introdujeran un clavo en el vértice de la cabeza o en una de las eminencias frontales. Thuja también puede ser empleado en la neuralgía que afecta la cabeza o la cara o ambos a la vez; los dolores son intensos, como de puñalada y casi insoportables. Si el enfermo se incorpora, estos dolores casi lo llevan a la desesperación, pudiendo aún llegar a la inconsciencia; por este motivo, el enfermo guarda siempre la posición horizontal. Los referidos dolores parecen iniciarse en la cara alrededor de los malares y los ojos e irradiando a la parte posterior de la cabeza. Esto puede ser originado por una erupción suprimida. Es una neuralgia que nos recuerda la que produce Spigelia, pero de la que se distingue por la dirección que toman los dolores. En Spigelia, estos empiezan en la parte posterior de la cabeza el irradian hacia adelante.

Habiendo detallado ya los síntomas nerviosos de Thuja, únicos en su género, pasaremos a ver la aplicación de esta droga en la sicosis. Hay que recordar que estos fenómenos nerviosos, pueden o no tener un orígen sicósico. Thuja es un medicamento que tiende a alterar la constitución sicósica a que he hecho referencia; modifica todas las enfermedades subsecuentes, haya o no secreción uretral.

Puede hacerse uso de Thuja en la gonorrea, cuando la secreción es delgada y verdosa; hay dolor que espalda, durante la micción y al terminar esta, se experimenta la sensación de como si se hubieran quedado algunas gotas en la uretra. Aparecen verrugas y condilomas en los órganos genitales y el ano, en el periné y en las superficies mucosas. He tratado un caso en el que las verrugas se formaron en el centro de la lengua; este caso fué curado con rapidez por Thuja. Las verrugas pueden tener un aspecto granujiento o bien la apariencia de una coliflor, tendiendo a desarrollarse en el cuello uterino. Estas escrescencias en forma de verrugas, son húmedas y dejan escapar un líquido glutinoso. Otras veces se encuentran verrugas en los genitales, que tienen aspecto chancroide; su base es de color amarillo sucio con los bordes endurecidos. Estas úlceras son características cuando parecen haber tenido origen en una verruga. Algunas veces se notan grietas profundas o surcos alrededor del ano, en el periné, en el escroto o en el glande; son bien hondas y están cubiertas de pus. El sudor de los órganos genitales es de olor dulce. Frecuentemente están invadidos los testículos, estando uno de éstos retraído como consecuencia de la contracción del músculo cremaster correspondiente e hinchado y adolorido, con sensación de magulladura. Puede haber balanorrea, es decir, inflamación purulenta de la superficie interna del prepucio y de la corona del glande.

En los órganos sexuales femeninos encontramos las excresencias en la forma de coliflor a que ya hemos hecho referencia, crecimientos fungosos de origen venéreo; condilomas con flujo verde y espeso que corresponde al flujo delgado y verde-amarillento, de la gonorrea crónica en el hombre. La cara interna de los muslos está roja y escoriada.

Además, si el flujo gonorreico es detenido por el uso de inyecciones, por un enfriamiento u otra cualquiera, pueden presentarse síntomás constitucionales que reclaman el uso de Thuja, estando especialmente indicado, cuando la complicación sea el reumatismo articular o la prostatitis. El cabello se vuelve seco, partiéndose en su extremidad; el cuero cabelludo es escamoso y cubierto de costras secas.

Thuja es también el remedio cuando la iritis aparece, especialmente cuando va acompañada de condilomas sobre el iris. Las párpados están inflamados y también de aspecto verrugoso.

El ozena puede ser una complicación adicional; cuando Thuja está indicado, el escurrimiento es espeso y verde.

Un síntoma muy común, revelador de una tara sicósica, para el cual se puede emplear Thuja, es la caries de la raíz de los dientes, conservando las coronas una apariencia normal. Otros síntomas dignos de mencionarse, son las pústulas muy parecidas a las que produce Tartarusemet, un estremecimiento con escalofrío durante la micción y la nerviosidad y agitación, tanto en el día como en la noche. Todavía más, Thuja tiene una propiedad peculiar, que es la de suavizar los tejidos duros, naturalmente duros, como las uñas. Así se explica la posibilidad de Thuja de curar las verrugas : las suaviza y provoca su absorción. Puede haber otorrea, aliento fétido y ronquera.

Thuja tiene una acción específica en la escleritis. Produce tos que se agrava durante el día; los esputos tienen aspecto de queso añejo.

Thuja es también de utilidad en la escrófula, y el marasmo. Tales casos no son necesariamente sicósicos sino que precisan las condiciones que favorecen el desarrollo de esta afección. Las evacuaciones son acuosas, gorgoteantes, expulsadas con fuerza, empeorando en el día después del desayuno, acompañadas de gran cantidad de gases ruidosos; tiña ciliar; escamas secas como de salvado; pestañas irregulares e imperfectas; los niños son ventrudos; gritan al despertar y dilatan mucho para estar completamente despiertos.

Después tenemos que considerar los medicamentos parecidos a Thuja en las condiciones antes mencionadas. Uno de estos y el más próximo a Thuja, es Pulsatilla, produciendo ozena con escurrimiento espeso y verdoso. En la gonorrea, también los dos medicamentos tienen escurrimiento idéntico, pero más espeso en Pulsatilla. En el reumatismo gonorreicó; en la orquitis, en la prostatitis, son también muy parecidos Pulsatilla y Thuja.

Kali bich, es útil en el ozena que aparece en las constituciones sicósicas; el escurrimíento es amarilloso, más frecuentemente

verdoso. Se siente la nariz seca de un modo anormal; las masas espesas y verdosas, son expulsadas por la parte posterior de la nariz.

Nitricum acid. se parece a Thuja occident, en los condilomas y verrugas : también es de utilidad en las úlceras, cuando sus contornos son irregulares, y en la hipertrofia de las amígdalas, ya sea que estas afecciones sean de origen sifilítico o gonocócico. También produce Nitricum acid. fisuras anales húmedas (que, como sabemos, también se encuentran en Thuja), balanorrea y leucorrea verdosa y delgada. Sin embargo. Nitricum acid. se distingue de Thuja occident. en que tiene más sensación de magulladura en los huesos, especialmente en las regiones desprovistas de tejido muscular como la tibia, el esternón y el cráneo.

Staphysagria se adapta a los condilomas largos y filiformes. Hay un estado pervertido del organismo, que se revela por el color cetrino de la cara, los círculos obscuros alrededor de los ojos, el estado esponjoso de las encías, el color amarillo-blanquizco de la piel y la notable debilidad. Está especialmente indicado cuando ha habido mercurialización; generalmente hay endurecimiento de uno u otro de los testículos.

Deseo hacer mención aquí de Jacaranda. Se trata de una planta de Sud-América, experimentada primeramente por Muir. Es un excelente medicamento para la balanorrea o para los pequeños chancros rojos y para los granos de aspecto chancroide, también rojos, que aparecen en el pene. Se ha demostrado, fuera de toda duda, que es un buen medicamento.

Corallium rubrum es un remedio excelente de las úlceras chancrosas, cuando son de aspecto muy rojo. Mercurius se parece a Thuja occidentalis en la iritis, en la balanorrea, en la secreción uretral verde y en el reumatismo. Las diferencias son las siguientes : en Mercurius hay agravación por el sudor, así como por el calor de la cama. Thuja tiene el siguiente síntoma que no se encuentra con mucha frecuencia, pero que sirvió de guía a Boenninghausen, para salvar la vida de un enfermo : sudor solamente en las partes descubiertas del cuerpo.

Sabina es de utilidad en los condilomas que producen comenzón y ardor, especialmente en las mujeres.

Euphrasia está indicado en los condilomas grandes, que tienen aspecto de crestas de gallo.

Cinnabaris es un excelente medicamente cuando hay una combinación de sífilis con sicosis. Las verrugas tienden a afectar la forma de un abanico; hay una fuerte comezón, con especialidad alrededor de las articulaciones.

El remedio complementario de Thuja en estas afecciones sicósicas, es Natrum sulphuricum.

Sarsaparrilla está indicado cuando las erupciones sicósicas están constituídas por pequeñas manchitas que apenas sobresalen del nivel de la piel, que con frecuencia se descaman un tanto, pero que tienen aspecto de roseola sifilítica, produciendo una comezón intolerable que se agrava en la primavera; también cuando aparece una erupción

húmeda en el cuero cabelludo y cuyo pus al escurrir, produce inflamación de todas las partes que toca. La cefalalgia sicósica se encuentra en Sarsaparrilla, iniciándose el dolor en la parte porterior de la cabeza, irradiando hacia adelante, para fijarse en la raíz de la nariz, con hinchazón de este órgano; erupciones húmedas alrededor de los órganos genitales, o entre el escroto y los muslos.

También Petroleum produce este último síntoma, además del siguiente : pequeños girones membranosos alrededor del ano.

Dd euphorbiaceas

Las Euphorbiáceas contienen un alcaloide acre, que en algunas plantas es oleoso, en otras resinoso; en este último caso se escapa de la planta como un jugo lechoso que se seca formando una goma. Estos aceites o gomas, según el caso, tienen dos propiedades; aplicadas como tópico sobre la piel, producen enrojecimiento y vesicación, llenándose estas vesiculas de una serosidad blanco amarillenta, pudiendo aun llegar a la supuración, formando costras de un color como el de la miel de abeja. Todas estas plantas obran más o menos como purgantes, produciendo diarrea acuosa acompañada de cólico, tenesmo, flatulencia, ardor, náuseas y vómito. Los medicamentos que obtenemos de este orden son : Croton tiglium, Jatropha curcas, Yuca filamentosa, Euphorbium officinarum, Euphorbia corollata, Mercurialis perennis. Hippomanes mancinella y Ricinus comunis.

Croton tiglium, produce una diarrea acuosa de color amarillento y que sale como el agua de un bitoque, con frecuencia asociada de náuseas y vómitos; la náusea es muy molesta, va acompañada de desmayos y pérdida de la visión. Hay cólico que mejora por bebidas caliéntes; las evacuaciones se presentan a cada intento de comer o beber.

El análogo más cercano a Croton, es Jatropha curcas, que produce un cuadro perfecto del cólera asiático, con gran postración, vómitos y diarrea, simultáneamente; las substancias vomitadas tienen aspecto de agua de arroz o de clara de huevo; hay también calambres en las pantorrillas y frialdad en todo el cuerpo.

El medicamento que le sigue en semejanza en Euphorbia corollata; éste, como el anterior, produce vómito y deposiciones, con sudor frío sobre todo el cuerpo; produce, de una manera más marcada que los demás miembros de este orden, el siguiente estado mental : el enfermo desea morirse.

Cascarilla tiene mejoría de sus síntomas abdominales por las bebidas calientes, pero parece ser de utilidad en estados diferentes a los que reclaman el uso de los medicamentos antes citados. Se usa cuando hay cámaras nudosas cubiertas de moco, como en Graphites, acompañadas de cólico y ardores, justamente como sucede en los otros medicamentos de este orden. Este medicamento también produce frecuentes hemorragias intestinales rojo-pálidas; no consisten en una simple salida de sangre, como sucede en la defecación en los casos de hemorroides; no es tampoco de la

naturaleza de las hemorragias intestinales ocasionadas por afecciones hepáticas, sino que se trata de verdaderas afecciones de los vasos sanguíneos.

En Yuca filamentosa predominan los síntomas bilioso sobre los gástricos e intestinales; produce cafalalgia frontal o temporal; frecuentemente hay afluencia de sangre a la cara, teniendo ésta un color amarillo o cetrino y la lengua cubierta de una capa amarilla o blanco amarillenta, notándose las impresiones dentarias. Hay también dolores sordos en el hígado, apetito escaso, distensión y sensibilidad del abdomen, dolores cólicos, tenesmo con expulsión frecuente de gases, evacuaciones también frecuentes, acuosas y amarillentas o de colon achocolatado.

Vamos a estudiar ahora la acción del medicamento sobre la piel: Cuando se hacen aplicaciones locales de Croton tiglium, se produce un eritema que pronto va seguido de formación de vesículas, casi confluentes, que producen ardor y comezón insoportables. Si la acción de la droga continúa, estas vesículas dan origen a una costra amarillenta, muy parecida a las costras de leche, en cuya afección puede estar indicado, especialmente cuando encuadra con los síntomas intestinales de Croton.

Hippomane mancinella fué experimentado por primera vez por el Doctor Muir, Su propiedad de producir vesículas se ha utilizado en la escarlatina, siendo sus síntomas los siguientes : delirio; inflamación de la garganta con imposibilidad para deglutir, debido a la constricción de la misma y del esófago; ardor en los ojos, que se agrava por cerrarlos.

Yuca produce un enrojecimiento eritematoso de la piel. En dos experimentadores produjo ardor e hinchazón del prepucio, con enrojecimiento del meato urinario. Examinando la literatura alopática, vemos que Yuca es recomendado en el tratamiento de la gonorrea.

Euphorbium officinarum se diferencía más o menos de los demás medicamentos. Como ellos, produce una erupción eritematosa y vesicular; sin embargo, su utilidad especial radica en su acción sobre los huesos; se usa en las enfermedades de éstos, cuando hay dolor quemante, principalmente debido al abuso del mercurio.

Ricinus comunis tiene la propiedad de aumentar la leche en las mujeres que lactan.

En esto se parece a Urtica ureans que resulta un excelente medicamento para la carencia de leche después del parto.

El abuso del aceite de ricino es antidotizado por dos medicamentos, usados de acuerdo con sus respectivos característicos, son Bryonia y Nux vómica; Bryonia, por la relación específica que guarda con los síntomas de Ricinus y Nux vómica, por su relación con los medicamentos drásticos en general.

Dd ranunculaceas

Aconitum, Helleborus, niger, Clematis erecta, Poeonia, Pulsatilla Hydrastis, Staphisagria, Actea racemosa, Actea spicata, Radix coptidis, Ranunculus bulbosus y Ranunculus sceleratus.

Ya tenemos la lista de las Ranunculaceas, órden de plantas que nos proporciona muchos medicamentos. Recibe este nombre por que abarca las diferentes variedades de ranúnculus. Todo este órden parece estar caracterizado por su acritud y algunos de sus miembros son ligeramente narcóticos. De ellos obtenemos Aconitum, Actea racemosa, Actea spicata, Radix coptidis, Ranunculus bulbosus, Ranunculus sceleratus, Hepática, Pulsatilla, Hidrastis canadensis, Clematis erecta, Staphisagria, Helleborus y Poeonia. Staphisagria contiene Delphinina, Hidrastis canadensis, cuando está fresco, se dice ser narcótico así como ácido. Se usa por la acción tónica que se le supone, se dice que su abuso ocasiona síntomas como los del Sulfato de quinina; tales síntomas son adelgazamiento, zumbidos, retintineo y disminución del pulso. Clematis vitalba es tan caústico, que se ha usado como substituto de Cantharis. Propiedades semejantes tiene Clematis crispa, sobre la que las cantáridas se alimentan con avidez. Clematis viorna, de cuyos vástagos se hacen resistentes tramados de papel, es también vesicante. Tendremos tiempo de estudiar solamente a los principales miembros de este órden. Antes que todos, estudiaremos Aconitum.

Aconitum napellus

Aconitum napellus es el napelo; la palabra Aconitum significa "sinpolvo". La planta se ha llamado así por el hecho de que crece sobre las rocas áridas en las que a penas si hay suficiente tierra que cubra sus raíces. Esto demuestra el vigor de la planta. Se ha llamado napelo, porque la forma de sus flores dobladas dan la apariencia de un capuchón sobre la cabeza.

Aconitum napellus contiene un principio activo llamado Aconitina, encontrádose con más abundancia en las raíces. Tiene algunos otros principios activos de composición desconocida y difíciles de aislar. De hecho, el Aconitum comercial prácticamente tiene algunas otras substancias. Las propiedades activas de Aconitum se encuentran en proporciones diferentes en muchos de los miembros de este órden de plantas. Uno de ellos es el Acido acónitico combinado con el calcio. He oído decir que los habitantes de Persia secan las cabezas del Aconitum ferox y las comen impunemente. No me atrevo a decir cómo puede ser verdad esto, aunque es sabido que esta especie de Aconitum, contiene pseudo-aconitina, que es menos tóxica que la verdadera aconitina. También se afirma (y de esto no me hago responsable) que en algunas partes de Suiza el Aconitum crece en hileras a lo largo de las calles y que sus cabezas se emplean como verduras. Quizá esto demuestre el hecho de que la planta altera sus propiedades por la aclimatación.

Cuando es tomado en dosis tóxicas, se revela Aconitum como un deprimente del sistema cerebroespinal. Produce una sensación de adormecimiento acompañada de aguijoneo y hormigueo en las extremidades, pudiendo llegar hasta la completa anestesia. También

afecta el sistema circulatorio. Después de la primera sensación que se experimenta de moderado calor difuso, sigue un intenso calor interno con abundante sudor caliente. Otras veces la piel llega a cubrirse de erupción miliar que produce mucha comezón. Secundariamente la superficie del cuerpo se vuelve fría, con sudor frío y viscoso; el pulso se vuelve débil y la muerte se presenta.

Aconitum en un principio no afecta la esfera intelectual y la emotiva. En su acción sobre los nervios, en este caso difiere de Cocculus indicus que trastorna rápidamente la consciencia. Esta droga produce en efecto, una parálisis motriz completa y no sensitiva. Difiere también de Gelsemium, Conium y Nux vóm. que muy pronto afectan la actividad motriz más bien que la sensitiva. En la que se refiere a los síntomas de colapso, se parece a Camphora y a Veratrum album; pero solamente Veratrum album tiene diarrea y vómitos característicos, con sudor frío sobre la frente. Aconitum y Nux vóm., producen convulsiones tetánicas, pero en Aconitum son solamente parciales y acompañadas de gran debilidad muscular.

Aconitum produce dos series diferentes de síntomas, completamente distintos por su caracter y tan bien separados, como si el medicamento se compusiera de dos substancias y cada una desarrollara sus propios síntomas. El segundo grupo de síntomas que es el más generalmente conocido, es la tendencia de Aconitum a producir fiebres e inflamación; esto lo produce por su acción sobre el sistema nervioso simpático. Lo encontramos indicado en las fiebres genuinamente inflamatorias del tipo llamado sinocal o esténico. Estos términos se aplican a las fiebres que no tienen caracter debilitante o asténico. Los síntomas de las fiebres que no tienen caracter debilitante o asténico. Los síntomas de las fiebres que reclaman el uso de Aconitum, son los siguientes : piel generalmente caliente y seca; pulso duro, lleno y rebotante; la fiebre va siempre acompañada de ansiedad. Hahnemann nos ha dicho que los síntomas mentales y locales son el verdadero guía que nos conduce a la elección de Aconitum. No puede ser el medicamento adecuado si no está presente la ansiedad, la agitación, inquietud y temor a la muerte. El sudor que sigue a la fiebre es generalmente crítico y produce mejoría de todos los síntomas; es abundante, tibio y aun caliente. Está demostrado que Aconitum no produce ninguna alteración en la calidad de la sangre; de aquí que no se pueda esperar que esté indicado en cualquier tipo de fiebre en que hay toxinas en la sangre, alterando este fluido, modificando los glóbulos rojos o en cualquier forma cambiando su calidad. El tipo de la fiebre que produce Aconitum, es esténico y contínuo y no intermitente o remitente. No tiene ningún síntoma en su patogenesia que lo indique en estos casos. Comienza con estremecimiento o escalofrío, produce luego calor seco y continúa hasta el sudor que trae mejoría; cuando ha terminado la fiebre, ha terminado también el terreno de acción de Aconitum. Este no reproduce la repetición típica de los accesos febriles. De aquí que no pueda prescribirse Aconitum en la fiebre

intermitente.

Es necesario grabar en la mente que algunas veces la fiebre no es la enfermedad misma, sino un síntoma necesario al desarrollo completo de la enfermedad. No se pretenderá quitar esta calentura con la administración de Acónitum, pues en este caso combatiríamos un sólo síntoma de una enfermedad dada. De aquí que cuando la fiebre no es más que un síntoma, Acónitum no debe ser dado para quitarla. Tomemos por ejemplo la escarlatina : la fiebre puede ser muy elevada, la piel puede estar caliente y seca, el pulso duro. Acónitum parece estar indicado, sin embargo se llegará al conocimiento por otros síntomas, dolor de espalda, vómitos, dolor de garganta, la existencia de otros casos de la misma enfermedad entre los vecinos, de que se trata de un caso de escarlatina. Sabemos que suprimiendo la temperatura, eliminamos un síntoma necesario para el desarrollo de la erupción característica de la enfermedad. Por lo tanto, raramente debe pensarse en Aconitum para la escarlatina. Puede haber casos excepcionales en que la temperatura revista un carácter desproporcionalmente grave y en que los síntomas mentales característicos estén presentes, pudiéndose entonces hacer uso de Aconitum; pero en nueve casos de diez, será perjudicial su administración.

Otra falta más se comete cuando se administra Aconitum en los tipos tifoideos de fiebre para disminuir el pulso y hacer bajar la temperatura. Aconitum no tiene relación de ninguna especie con la fiebre tifoidea. Es dado por la costumbre de administrarlo en la fiebre y no por un conocinuento patológico Me permito suplicarles no adherirse a esta práctica, que solo conducirá a la alternación.

En las fiebres traumáticas o inflamatorias, Aconitum debe ceder su sitio a otros medicamentos, a menos que estén presentes la inquietud y la ansiedad. Uno de estos remedios es Bryonia, que también produce pulso lleno y duro, aumentando la acción del corazón; piel seca y agravación de sus síntomas por el movimiento. El paciente yace perfectamente tranquilo. para nada agitado.

Es de importancia establecer distinciones entre Aconitum, Gelsemium y Apis en los estados febriles. Daré pues en detalle los síntomas y las condiciones que nos conduzcan a la elección de uno u otro de estos medicamentos. Si repito lo que ya he dicho, esta repetición servirá para gravar en la mente. la distinción entre dichas drogas.

Aconitum caracteriza la fiebre sinoca : Gelsemium la fiebre remitente o intermitente y Apis la intermitente y tifoidea. Aconitum produce escalofío marcado, seguido de piel caliente y seca; pulso duro, lleno y rebotante; más tarde sobreviene un sudor caliente, profuso, crítico, que produce alivio. Apis produce escalofrío seguido de calor quemante en todo el cuerpo o calor en algunas regiones y frialdad en otras. Este calor se siente con particularidad en el abdomen. La piel está caliente y seca o alternativamente seca y húmeda; hay ausencia de sudor o sobreviene por accesos. secándose rápidamente.

Gelsemium produce escalofrío parcial, que comienza por las manos, se propaga descendiendo y ascendiendo a lo largo de la columna vertebral, seguido de un calor general más acentuado en la cabeza y la cara. El sudor es gradual y moderado, pero produce siempre mejoría.

Bajo la acción de Aconitum, el pulso es como ya se ha mencionado, lleno, duro y rebotante. En Gelsemium es lleno, pero no duro; por eso se llama "pulso de martillo de agua". Bajo la acción de Apis es acelerado, lleno y fuerte; o desigual, filiforme y frecuente. Aconitum presupone que la sangre no está alterada cualitativamente. Gelsemium admite cualquier cambio que puede favorecer la depresión. Apis se adapta a la toxemia, de tipo tifoideo.

Por consiguiente, Aconitum está indicado solamente cuando la fiebre es esténica. tal como la que proviene de la exposición a los vientos fríos y secos, después de un calor excesivo : por enfriarse repentinamente cuando se está caliente y sudando, etc. En la fiebre biliosa está indicado durante las primeras etapas, cuando la calentura es esténica, especialmente porque obra sobre el hígado. También es el medicamento en la fiebre inflamatoria, sea traumática o no, cuando concuerda el tipo; es particularmente aplicable en la plétora, en las personas robustas que con facilidad sufren repentinas congestiones activas. No tiene relación con la fiebre de tipo intermitente y cuando se aplica en este tipo de fiebre, obra solamente por el predominio de su acción sobre el corazón y nunca curativamente; de aquí su no indicación homeopática. No tiene relación alguna con la fiebre tifoidea.

Gelsemium es el medicamento adecuado cuando la fiebre se desarolla en circustancias que favorecen una paresia de los nervios motores de los músculos, ya sean de fibra lisa o estriada. Corresponde a ese estado en el que los vasos sanguíneos están dilatados y llenos, pero carecen de firmeza y resistencia característica en la inflamación esténica desarrollada. Tal forma de fiebre, va acompañada de languidez, debilidad muscular, deseo de absoluto descanso y somnolencia; en estas condiciones, la congestión puede aun ser arterial, como en Aconitum, pero exhibe una pasividad que le es suficientemente característica; el pulso es lleno, pero no duro, por eso Gelsemium puede estar indicado en las fiebres de orígen bilioso, cuando el hígado sufre una congestión pasiva. Se aplica también a las formas tifoideas. pero nunca después que la languidez y somnolencia que corresponden a la relajación y congestión pasiva del cerebro, llegando a una gran postración y estupor.

Apis tiene una semejanza aparente con la fiebre esténica de Aconitum en la piel seca, pulso duro, etc., y especialmente en el principio de las afecciones erisipelatosas y más aún en la inflamación de las membranas serosas y sinoviales. Pero la tendencia de Apis es al tipo tifoideo o los derrames, no sucediendo esto jamás en Aconitum. De esta manera Aconitum puede aplicarse a la fiebre que acompaña en un principio a la meningitis, a la pleuritis o la sinovitis;

pero su poder cesa cuando, el grito encefálico, la disnea y la metitéz a la percusión, o el estado inflamatorio y pastoso alrededor de una inflamación, anuncian la aparición del derrame.

En su forma intermitente de fiebre. Apis no ofrece ningún parecido con Aconitum o Gelsemium. Aún en el tipo reumatismal, en el que Aconitum y Apis parezcan estar indicados, la semejanza es solamente superficial, puesto que Apis, o desarrolla una inflamación erisipelatosa o produce ardores aguijoneantes. picantes y exquisita sensibilidad, todo referible a los vasos sanguíneos. En los tipos más deprimidos, Apis abandona a Aconitum y sobrepasa completamente a Gelsemium. Está indicado en la escarlatina genuina, en la difteria y en la fiebre tifoidea. Hay tendencia a la desfibrinación de la sangre y en fin, a la desorganización de los líquidos. En tales casos, la agitación ansiosa de Aconitum y la irritabilidad y somnolencia de Gelsemium, son reemplazados por una inquietud agitada y por la estupefacción. La excitación y delirio de Aconitum y la semiinconsciente murmuración de Gelsemium, se tornan en delirio musitante e inconsciencia. Arreglando los síntomas respectivos de acuerdo con los requisitos del Organón, tenemos a cada remedio caracterizado como sigue : Aconitum, angustia, desesperación, inquietud durante el período febril, temor a la muerte; se desabriga; el pulso es duro, lleno y rebotante; la piel caliente y seca. Todos los síntomas terminan por. un sudor copiosos. Gelsemium : irritabilidad y sensibilidad; los niños tiene insomnio, están nerviosos, aún amenazan tener convulsiones; asoporamiento; párpados pesados; parecen como beodos; deseo de parmanecer completamente quietos. El escalofrío sube y baja a lo largo del dorso, seguido de fiebre, con aumento de somnolencia; el pulso es lleno. El sudor es moderado y gradual, pero produce mejoría. Apis, produce inquietud agitada; deseo de dormir, pero está tan nervioso, que no puede conseguirlo; delirio tranquilo, musitante; estado soporoso. El escalofrío comienza en las rodillas o en el abdomen a las tres de la tarde; calor con piel seca o en ocasiones accesos pasajeros de transpiración; deseo de desabrigarse; gran opresión de pecho; piel caliente en algunas regiones y en otras fría; pulso acelerado y fuerte o cuando el debilitamiento aparece, es débil y frecuente, intermitente o imperceptible. (Filiforme).

Belladonna es considerado como otro remedio concordante de Aconitum. Esta droga, como lo veremos más adelante, no obra primitivamente sobre los nervios vaso-motores o los ganglios del simpático; de aquí que no controle el calibre de los vasos sanguíneos. Obra primitivamente sobre el sistema nervioso cerebroespinal y por lo tanto lo encontraremos indicado en las fiebres que comienzan por síntomas cerebrales o medulares. Nos lo encontramos indicado en la fiebre que comienza con el tipo de Aconitum, pero que por extensión ha invadido el cerebro; de este modo, frecuentemente Belladonna sigue bien a Aconitum. Debemos recordar que Belladonna requiere la presencia de síntomas cerebrales, tales como estremecimiento

durante el sueño, cefalalgia pulsátil, cabeza caliente y cuerpo y extremidades frías.

Veratrum viride reemplaza a Aconitum en la fiebre que marca el principio de la pneumonía, cuando hay gran excitación arterial y congestión revelada por el pulso lleno y rápido, respiración trabajosa y difícil y más tarde, náusea al enderezarse, desmayo, pulso lento y frialdad.

Cuando la fiebre sinoca no cede con Aconitum, entonces el mejor remedio es Sulphur; los síntomas que nos conducirán a su elección son los siguientes : a pesar de la administración de Aconitum persiste el calor seco, aún cuando el sudor no aparezca o si hay algo es simplemente transitorio; el enfermo al principio insomne y agitado, se vuelve somnoliento y responde con lentitud a las preguntas que se le hacen o deja pásar un intervalo entre la pregunta y la respuesta, como si no hubiera comprendido lo que se le interroga. La lengua es seca y la palabra embarazosa. El enfermo da la impresión de haber caído en un estado tifódico debido al agotamiento continuo producido por la calentura.

Ferrum phosphoricum, del que ya he hablado en más de una ocasión, debe ser diferenciado de Aconitum; obra sobre los vasos sanguíneos produciendo una especie de estado semi-parético en el que estos se dilatan, como sucede en el segundo período de la inflamación. El pulso es lleno y más bien suave, no duro y tenso como en Aconitum; está indicado en las congestiones de cualquier parte del cuerpo, cuando el escurrimiento de esta parte está mezclado con sangre; esto puede aplicarse a la disentería, a la hemoptísis y a la neumonía secundaria.

Arsenicum album como aconitum, produce intensa fiebre con ansiedad, inquietud y temor a la muerte; pero la fiebre e inflamación de Arsenicum son de tal naturaleza, que siguen a una afección local intensa; a una inflamación que progresa hasta la destrucción de la parte afectada; a la fiebre de tipo tifódico con evacuaciones pútridas, etc.

Aconitum puede ser usado en las afecciones inflamatorias del cerebro; debemos por lo tanto distinguir entre una inflamación cerebral idiopática y la que es consecutiva a una afección profunda. Aconitum puede tener bien poca influencia sobre la meningitis tuberculosa. Pero en la meningitis o en el congestión cerebral, que sobreviene por haber sido expuesta la cabeza a los rayos directos del sol, especialmente durante el sueño, Aconitum será el remedio, siendo en esto superior a Glonoinum y Belladonna, debiéndo preferírseles en cambio, en la insolación en condiciones ordinarias. Aconitum puede estar indicado más adelante en la insolación, cuando un gran calor ha tenido efecto paralizante sobre la circulación. Al principio el corazón trabaja con más violencia; comienza en seguida a perder su fuerza y las pulsaciones son de ciento veinte a ciento treinta por minuto.

Amyl. nitri, produce un cuadro semejante. La cara está enrojecida,

los ojos saltones; hay zumbido de oídos, parálisis de los nervios vaso-motores y parálisis cardiaca consecutiva a la disminución de la presión en los capilares. Aconitum puede ser usado también cuando la congestión cerebral es el resultado de un ataque de cólera.

Puede usarse Aconitum en las afecciones de los ojos. Presta servicios en las conjuntivitis consecutivas a las operaciones quirúrgicas o que son resultado de la presencia de un cuerpo extraño en el ojo. También está indicado en las afecciones inflamatorias de los ojos, que provienen de la exposición a los vientos fríos y secos. Hay sensación de calor, resequedad y ardor. Los ojos se sienten como si estuvieran llenos de arena y excesivamente sensibles; los dolores son tan intensos que el paciente desea morir, declara que no puede resistirlos. El globo ocular se siente como obligado a salir de su órbita y duele; este dolor se agrava cuando la parte afectada se mueve o es tocada. La fotofobia es intensa, las pupilas están contraídas y hay un círculo azul alrededor de la córnea y un violento dolor en los globos oculares como en la epiescleritis. Aún el glaucoma puede exigir el uso de Aconitum, cuando en adición a los síntomas mencionados, hay dolores que bajan irradiando a la cara como en el tic doloroso, especialmente después de exponerse a un frío intenso o a los vientos frios, en pacientes reumáticos. Si, por otra parte, Aconitum no mejora inmediatamente, se debe desde luego recurrir a otras medidas urgentes, porque esta enfermedad puede hacer perder la vista a nuestro enfermo en un tiempo increiblemente corto.

Sulphur está indicado en la conjuntivitis por irritación de cuerpos extraños cuando Aconitum ha fallado.

Spigelia produce dolores semejantes a los de Aconitum. especialmente en el ojo izquierdo; pero su inflamación es menos general que en el caso de Aconitum.

Debemos recordar que dije que Aconitum tenía dos tipos distintos de acción; hemos estudiado el segundo y más conocido; vamos a hora a estudiar el otro, que es muy diferente del anterior. Los síntomas de este tipo pertenecen más al sistema nervioso cerebro-espinal. Primero hablaremos de los síntomas mentales. Encontramos que Aconitum es de utilidad en las enfermedades mentales y en la histeria, cuando hay una particular aversión a la excitación, especialmente por las calles de mucho movimiento. El paciente no se atreve a cruzar estas calles porque teme que alguna cosa le suceda; este síntoma es perfectamente normal bajo algunas circunstancias, pero cuando se extrema, denota sobreexcitación cerebral, bastante común en los enfermos histéricos. Están impacientes; no toleran la música; no pueden suportar ningún ruido, por-que tienen demasiado sensibles los oídos. Se imaginan que alguna parte de su cuerpo está deformada, por ejemplo, los miembros fuera de su lugar, los labios muy gruesos, las facciones deformadas; se imaginan que todos su pensamientos proceden del estómago. Algunas veces los pacientes, durante el ataque de su mal, tienen crisis en los que predicen la hora de su muerte. Podemos encontrar este síntoma en la fiebre

puerperal. Argentum nitricum y Coffea también producen el mismo síntoma, prediciendo la hora de la muerte, principalmente el último durante el parto.

Además, Aconitum produce parálisis, una parálisis que puede fácilmente ser recordada por dos o tres síntomas subjetivos; parálisis acompañada de frialdad, adormecimiento y hormigueo. A menos que haya hormigueo en la parte afectada, raras veces se encontrará indicado Aconitum; la paraplejía puede ceder al uso de Aconitum, si hay esta frialdad característica de los miembros y el hormigueo. Podemos hacer uso de Aconitum en las diversas formas de parálísis local, como la parálisis facial, cuando va asociada a los síntomas antes mencionados, y cuando se atribuye a la exposición a los vientos frios y secos. Pero esta parálisis nunca es de orígen orgánico.

Sulphur es el antídoto principal cuando la parálisis resulta por las excesivas dosis de Aconitum. Se debe pensar en Cannabis indica y Staphysagria en la parálisis con hormigueo en las partes afectadas; Rhus tox., Sulphur y Causticum, son de preferirse más tarde, especialmente en las parálisis debidas al frío.

La neuralgía en que Aconitum está indicado, es producida por la exposición a los vientos fríos y secos; será de mayor utilidad cuando hay violenta congestión de la parte afectada, que generalmente es la cara; ésta se enrojecerá e hinchará; los dolores llevan al paciente casi hasta la desesperación; hay generalmente hormigueo en la región afectada. En esto puede compararse con Spigelia, que es de utilidad en la prosopalgia del lado izquierdo con intensos dolores quemantes y punzantes. El paciente manifiesta un intensa excitación y gran intolerancia a los dolores.

Colchicum está igualmente indicado en la prosopalgia del lado izquierdo; los dolores van acompañados de una debilidad paralítica de los músculos, pero carecen de la intensidad de los producidos por Spigelia y la excitación e intolerancia al dolor, característica, es mucho menos notable en Colchicum.

Amyl. nit. puede ser más necesario que Aconitum. en la prosopalgia con intensa congestión local.

Aconitum es un medicamento muy importante en el tratamiento de las afecciones cardiacas. Los síntomas que lo indican en estos casos, son numerosos e importantes. y necesariamente tan importantes, ya que Aconitum perturba la circulación de la sangre ejerciendo una acción especial sobre el carazón y sus nervios. Hay congestión a la vez del corazón y los pulmones; palpitaciones con ansiedad, opresión cardiaca, pudiendo llegar hasta el síncope. La palpitación empeora por caminar; dolores punzantes y lancinantes sobrevienen impidiendo al enfermo asumir una postura recta o hacer una inspiración profunda. Los accesos de dolor intenso irradian del corazón al brazo izquierdo y van acompañados de adormecimiento y hormigueo en los dedos.

En la hipertrofia cardiaca, Aconitum está indicado cuando está presente este adormecimiento y hormigueo de los dedos. Se trata

solamente de una hipertrofia cardiaca sin complicaciones, en la que sea necesaria la prescripción de este medicamento. En la hipertrofia por lesiones valvulares, Aconitum puede causar grave daño. En esto, debe compararse Aconitum con Arnica, Aurum metall., Rhus tox. y Cactus grandiflorus. Kalmia y Rhus también tienen adormecimiento y hormigueo en el brazo izquierdo, en afecciones cardiacas.

Aconitum puede ser usado en el primer período de la neumonía, cuando la temperatura es alta y ha sido precedida de escalofrío; los síntomas de la congestión pulmonar están presentes. La tos es generalmente dura y seca y bastante dolorosa; la expectoración es serosa o aguada y un poco manchada de sangre, pero no espesa. El enfermo está necesariamente lleno de ansiedad.

Veratrum vir., como ya se ha indicado, compite con Aconitum en el principio de la pneumonía. Obra admirablemente cuando la congestión pulmonar es grave; hay palpitaciones cardíacas violentas; pulso lleno y rápido; náusea, desmayos al levantarse, lengua roja en su centro.

Bryonia entra a ocupar el lugar de Aconitum, especialmente cuando la hepatización ha comenzado. La tos es todavía dura y penosa y la expectoración es más gruesa. La angustia es referible ahora a la opresión respiratoria y no a la fiebre. El paciente prefiere más bien estar acostado que moverse. Aconitum puede también estar indicado en la pleuresía, muy al principio, antes de que se presente la exudación; hay agudos dolores punzantes en uno o en otro lado del pecho, con escalofrío seguido de estado febril. Se puede en este caso pensar en Aconitum, particularmente cuando la molestia proviene de la interrupción de la transpiración o por la exposición al aire fresco.

En el crup, sea catarral o membranoso, debe darse Aconitum, cuando este padecimiento ha sido determinado por exponerse a los vientos fríos y secos del noroeste. El enfermo despierta por largos ataques de sofocación. La tos es seca, dura, perruna y puede dejarse escuchar en toda la casa. Hay gran dificultad para respirar, ansiedad y temperatura elevada.

Se puede hacer uso de Spongia cuando la respiración produce un ruido como de aserradura; la tos es áspera, dura y rasposa; está indicado especialmente en los niños de tez blanca y de ojos azules cuando la molestia empeora hacia la media noche.

Debe darse Hepar cuando la tos empeora por la mañana o por descubrirse y va acompañada de ruido de moco. Debe recurrirse a Sambucus cuando hay espasmo de la glotis; la respiración es difícil, de carácter silbante y empeora después de la media noche o por acostarse con la cabeza baja.

En la hemoptísis se requiere el uso de Aconitum, cuando la sangre es de un color rojo encendido; esta molestia va siempre asociada de inquietud y la temperatura, sin excepción, está presente. En la hemoptísis se puede comparar Aconitum con los siguientes medicamentos :

Millefolium en la hemoptísis con salida profusa de sangre roja y

brillante, pero sin fiebre. Ledum, en la hemoptísis de los borrachos y en las personas de diátesis reumática. La sangre es de color rojo encendido y espumosa.

Cactus grandiflorus en la hemoptísis con fuertes palpitaciones cardiacas, acompañada de constricción como si una banda comprimiera el pecho, aunque tiene menos ansiedad y fiebre que Aconitum.

Aconitum es de uso frecuente en las enfermedades abdominales, especialmente de origen inflamatorio. Puede usarse en la gastritis o catarro gástrico, cuando los síntomas concomitantes están presentes, cuando la molestia ha sido causada por un enfriamiento y también por el entorpecimiento de erupciones agudas o por un repentino enfriamiento del estómago, causado por tomar agua helada. Hay pesantez en el estómago como si se tuviera una piedra fría, persistiendo aun después del vómito repetido. Compárese con Colchicum, Arsenicum, Elaps, etc. También puede hacerse uso de Aconitum en el cólico inflamatorio, cuando los dolores obligan al paciente a encogerse, sin obtener mejoría por esto, ni por ninguna otra posición. Este síntoma es inapreciable en el principio de un proceso inflamatorio abdominal y también en algunos casos de dismenorrea ovárica. Puede compararse con Colocynthis en este caso. Esta última droga falla en la inflamación; sin embargo, el paciente encuentra alivio por la presión y por encogerse. Aconitum puede ser usado en la disentería que especialmente tiene lugar en el otoño, cuando los días calurosos son seguidos de noches frías; las evacuaciones son escasas, sanguinolentas y viscosas, con mucho tenesmo. En este padecimiento, Aconitum es seguido muy bien por Mercurius.

La diarrea de Aconitum es de orígen inflamatorio. Las evacuaciones son acuosas, mucosas y sanguinolentas. Aparecen ordinariamente en el verano, como resultado del abuso de bebidas frías o por interrumpir la transpiración.

El cólera infantil exige el uso de Aconitum, cuando las evacuaciones tienen el aspecto de espinacas despedazadas y existen los síntomas inflamatorios ya mencionados.

Es necesario también recordar a Aconitum en la hernia estrangulada, cuando la inflamación se desarolla en el intestino comprimido, con dolor quemante en la parte afectada; hay también vómitos biliosos, gran ansiedad y sudor frío.

En el principio de la nefritis, ya se trate del mal de Bright o no, Aconitum ha mejorado cuando el paciente se queja de dolores agudos cortantes, que de la región renal irradian en círculo alrededor del abdomen o por encima de los huesos iliacos.

Si estudiamos los órganos genitales, nos encontramos que algunas veces Aconitum está indicado en la dismenorrea, que parece ser el resultado del engrosamiento peritonal por encima de los ovarios. El cólico característico descrito hace un momento, está presente.

Durante el embarazo, Aconitum puede ser administrado para ciertos

síntomas mentales, como el temor a la muerte, temperamento excitable, etc. Se puede también emplear en el aborto inminente producido por la cólera.

Durante el trabajo del parto, se puede administrar cuando los dolores son desproporcionalmente violentos y frecuentes. La enferma se queja de no poder respirar, de no poder soportar sus dolores. Está agitada ansiosa y el cuerpo se cubre de un sudor caliente.

En la fiebre de leche, se debe dar Aconitum, cuando los senos están calientes e inflamados y la piel está caliente y seca. Estos síntomas van acompañados de agitación y ansiedad.

La supresión de los loquios es una indicación para Aconitum, cuando es causada por un emoción violenta y va acompañada de fiebre elevada, sed y ansiedad. Los senos estan laxos y el abdomen distendido y sensible al tacto.

Aconitum no está indicado con frecuencia en las fiebres puerperales, porque generalmente son de origen séptico; pero para otra forma, es el único remedio capaz de yugular en unas cuantas horas todas las molestias. Puede ser por descuido de la enfermera. por enfriamiento de la enferma después de un trabajo molesto, por asearla con agua demasiado fría o por el cambio de ropas sin las precauciones necesarias. en seguida aparece la fiebre elevada, la sed, etc., los ojos están brillantes, de aspecto fiero y con expresión aguda de ansiedad; el abdomen está distendido y sensible al tacto, los senos colgantes y sin leche; en estos casos, es necesario prescribir Aconitum.

Aunque Aconitum no está indicado en la escarlatina, puede ser usado durante esta enfermedad, después del estado de descamación, cuando el niño sufre algún enfriamiento y de ello le resulta la nefritis aguda. Sobresaltado despierta el niño de su sueño con angustia agónica; con sudor frío en la frente y los miembros, especialmente las piernas. Hay también hidropesía.

En el sarampión es de utilidad Aconitum en el principio del caso, cuando hay temperatura elevada, rubicundez de la conjuntiva; tos dura; seca, inquietud; comezón y ardor en la piel. Precede en su uso a Pulsatilla y se puede confiar en él tanto tiempo como dure la calentura. La erupción es miliar y áspera.

Gelsemium difiere de Aconitum en que produce más somnolencia y hay deseo de permanecer quieto. En el coriza agudo, se encontrará indicado Aconitum cuando la mucosa nasal está seca y caliente, y cuando hay una violenta cefalalgia pulsátil, que mejora por el aire. O el coriza puede ser fluente y caliente con frecuentes entornudos. Todos los músculos del cuerpo se sienten doloridos de manera que el estornudo, obliga al enfermo a detenerse el pecho. Hay calentura, inquietud, y los síntomas concomitantes. Todo esto es provocado, no por el tiempo húmedo; no por cualquier estado atmosférico capaz de producir un enfriamiento o catarro, sino por el aire frío, por los vientos fríos y secos o por una transpiración interrumpida.

Puede compararse con Nux vóm, en los catarros producidos por el tiempo frío; la nariz está inflamada y seca y la garganta se siente

áspera como si entuviera desollada.
Belladonna estará indicada si la cabeza está notablemente caliente, la garganta roja y las amígdalas inflamadas.
China será útil si hay cefalalgia por la supresión del coriza, dolores que empeoran al aire libre, en vez de mejorar como sucede en Aconitum.
En las enfermedades de la piel, Aconitum está indicado algunas veces. No es un remedio indicado para la escarlatina, pero sí para el rash escarlatiniforme con fiebre elevada, ansiedad y los demás síntomas indicados.
Sulphur es el remedio apropiado cuando se ha abusado de Aconitum.
Ranunculus sceleratus
Actea racemosa. Tenemos en la Materia Médica Homeopática, dos variedades de Actea : Actea racemosa y Actea spicata. Esta última puede ser tratada en pocas palabras: Obra sobre las articulaciones, especialmente las pequeñas, como las de las manos y pies. Es de utilidad en el reumatismo que afecta a estas partes, especialmente, si las manos y las muñecas están afectadas.
Actea racemosa obra sobre el sistema nervioso cerebro-espinal y especialmente sobre los nervios motores. Parece tener una influencia marcada sobre los nervios destinados a los músculos, produciendo un cuadro perfecto de mialgía.
Actea racemosa es también de valor por sus síntomas nerviosos reflejos. Produce neuralgia en cualquier parte del cuerpo, como síntoma reflejo de una afección uterina u ovárica. Uno de sus síntomas más importantes que proviene de esta causa es la sensación calor quemante sobre el vértice de la cabeza y hacia atrás de este centro. Los otros síntomas que pueden notarse en la cabeza, son una sensación de como si la tapa del cráneo fuera levantada, dolores agudos y lancinantes y de forma neurálgica en, y sobre los ojos; dolores supraorbitarios, que irradian al vértice de la cabeza. Estos síntomas indican a Actea racemosa en algunas enfermedades peculiares de la mujer y en las enfermedades propias de los ojos. En todas las enfermedades de los ojos, cuando hay dolores del carácter antes indicado, Actea es uno de los primeros remedios en los que es necesario pensar.
Spigelia tiene dolores semejantes; bajo la acción de este medicamento, la neuralgía aparece y desaparece con el sol, es decir, alcanza su máximum de intensidad hacia el mediodía aliviándose por la tarde. El dolor de Actea empeora por la noche más bien que durante el día. El dolor de Spigelia se indicia en el occipucio irradiando hacia adelante, para localizarse sobre alguno de los ojos. Este medicamento también produce una sensación de como si los globos oculares estuvieran enormemente crecidos; pero cuando este último síntoma es atribuible a desarreglos uterinos, es de preferirse el uso de Actea.
Cedrón es un inestimable remedio en las afecciones de forma neurálgica, cuando los dolores atacan el nervio supraorbitrario y son

peores en el lado izquierdo. El ojo arde como si tuviera fuego. Los dolores se presentan con regularidad cada día a la misma hora.

Hay otro remedio que mencionar a este respecto y es Kalmia latifolia, que produce neuralgia supraorbitaria, peor en el lado derecho.

Actea puede también ser de utilidad en la cefalalgía acompañada de una sensación de como si el paciente se fuera a volver loco. Con especialidad es de valor cuando los síntomas uterinos están presentes. También está indicado cuando hay dolor en la región inframamaria, dependiente de desarreglos uterinos.

Veamos ahora cuál es la acción de Actea sobre los órganos sexuales femeninos. Está indicado en el parto o en el aborto inminente, cuando los dolores cruzan el abdomen de lado a lado. Licopodium del derecho al izquierdo; Ipecacuanha de izquierdo al derecho y asociado de náuseas. Los dolores parecen obligar al paciente a doblarse. Puede ser usado también en los primeros meses del embarazo, para los dolores que se presentan en las paredes abdominales, tan molestos a la enferma. Cuando hay demasiado magullamiento abdominal, la aplicación local de una solución de Hamamelis es un buen recurso.

Los dolores del parto parecen ir asociados a ataques de desfallecimiento, crisis de angustia, siendo demasiado intensos.

En los entuertos es de utilidad solamente cuando son intensos, cuando la enferma es excesivamente sensible y no puede tolerarlos y cuando son peores en las íngles.

También se puede usar Actea racemosa en la manía puerperal. La enferma declara que se volverá loca y en todas sus acciones parece indicar que así es. Es suspicaz; su plática es disparatada y sin embargo, a ella le parece estar consciente de lo que está haciendo y dice que no lo puede evitar; otras veces ve visiones de ratas, etc. Estos síntomas también pueden indicar a la droga en el delirium tremens.

En esto puede compararse con Lachesis que "despierta de su sueño y se arroja fuera de su cama no solamente con fuerza notable, sino poseído de gran terror".

Arsenicum frecuentemente sigue a Lachesis, cuando el paciente no quiere que la dejen sola. Calcarea ostrearum tiene visiones de ratas y ratones tan pronto como cierra los ojos.

Otro síntoma que nos encontramos indicando a Actea en el parto es el "escalofrío nervioso" en los primeros dolores. Gelsemium también es de utilidad en esta condición.

Actea racemosa no produce la tisis, sin embargo, puede ser uno de los primeros medicamentos indicados, cuando la enfermedad no es de origen hereditario, especialmente si ha sido adquirida por un enfriamiento o en todo caso, cuando esté bien definida la tos de Actea. Esta tos es seca, molesta más en la noche; hay poca o ninguna expectoración y generalmente va asociada a la pleurodinia.

En la pleurodinia que acompaña a la tuberculosis, encontramos que Guaiacum es un medicamento que raramente falla.

Puede hacerse uso de Actea en la angina pectoris, cuando los dolores irradian a todo el pecho y van asociados a una congestión cerebral y estado de inconsciencia. La cara está lívida y el brazo izquierdo se siente como si estuviera ligado fuertemente al torax.

Otro uso que podemos hacer de Actea, es en el estado conocido como irritación espinal. Está especialmente indicado cuando las vértebras cervicales superiores e inferiores, sobre todo, las últimas son sensibles a la presión; de ahí que el paciente no se apoyará en el respaldo de la silla, por la incomodidad que esto produce. Este síntoma de Actea, es generalmente reflejo de irritación uterina.

Tenemos varios remedios semejante a Actea en la irritación espinal. Uno de estos es Natrum mur. que también produce sensibilidad entre una y otra vertebra. El principal característico es que la enferma encuentra mejoría por acostarse sobre el dorso aún cuando haya desviación uterina. Otra indicación de Natrum mur., es en la parálisis parcial por debilidad de la médula. Está indicado especialmente cuando estos síntomas provienen de un pesar, coraje, etc.

Fhysostigma o haba de Calabar, desarrolla un cuadro perfecto de irritación espinal; produce toda especie de sensaciones de hormigueo y dolores agudos referibles a la columna vertebral, con adormecimiento de pies y manos y otras regiones del cuerpo, calambres en las manos y repentinas sacudidas en los miembros, especialmente las piernas, al quedarse dormido; los músculos del dorso llegan a ser rígidos y aún puede sobrevenir un estado tetánico.

Agaricus muscarius también produce un cuadro perfecto de irritación espinal con hormigueo y picazón bien marcada en al espalda; comezón y ardor en la piel como la que se experimenta por la acción del hielo; contraciones nerviosas de los músculos, especialmente de los párpados, y sensación en diferentes partes del cuerpo de como si le introjeran agujas de hielo.

Esta irritación espinal, puede desarrollar una parálisis parcial, en cuyo caso podemos echar mano de otros remedios. El primero es Zincum metallicum, que produce un cuadro perfecto de irritación espinal con dolor de espalda localizado en la última vértebra dorsal, que se acentúa más cuando está sentado que cuando intenta caminar o acostarse. Acompañando a este síntoma hay una debilidad de las piernas, especíalmente al medio día, cuando el paciente tiene hambre. También debe recordarse que los síntomas espinales de Zincum se empeoran por tomar vino.

El segundo medicamento es Cocculus indicus. Se usa en las mujeres que tienen debilidad medular, cuando hay dolor con parálisis en la cintura. La enferma siente como si a penas pudiera caminar. Junto con estos síntomas hay una sensación de vacío en el abdomen, que se siente como si estuviera hueco.

En el hombre no encontramos estos síntomas, salvo como resultado de excesos sexuales, en cuyo caso Nux vóm. es el medicamento.

Cobaltum debe ser empleado en la irritación espinal, cuando es originada por excesos sexuales cuando hay dolor de espalda que

empeora cuando se está sentado y hay debilidad de las piernas.
Ranunculus sceleratus obra sobre la lengua y la piel.
Debe compararse con Natrum mur., Arsenicum, Taraxacum y Rhus tox.
Ranunculus sceleratus es más iritante en su acción que Ranunculus bulbosus; actuando sobre la piel produce una erupción vesicular, con flujo delgado, amarillo, acre, algo semejante al de Ranunculus bulbosus, también desarrolla de un modo notable, ámpulas grandes, aisladas; cuando éstas revienta, se forma una úlcera cuya secreción es acre e irrita sus contornos. En la estomacace y algunas veces en la difteria y en la fiebre tifoidea, se encontrará indicado Ranunculus sceleratus, por la presencia de placas denudadas sobre la lengua, estando sarroso el resto de su superficie; de este modo tenemos el estado conocido con el nombre de lengua en carta geográfica o "mapeada". Natrum mur., también tiene este síntoma, así como Arsenicum, Rhus tox., y Taraxacum, pero ninguno de ellos tiene tanto ardor y el estado cruento que Ranunculus sceleratus. La acridez de la droga, la diferencía de todas las demás.
Como Ranunculus bulbosus, Ranunculus sceleratus puede estar indicado en los catarros ordinarios, con estornudos, coriza fluente, dolor en las articulaciones y ardor al orinar.

Ranunculus bulbosus

Ranunculus bulbosus obra sobre las membranas serosas, los músculos, la piel, y en los efectos del alcohol.
Debe compararse con Aconitum, Arnica, Cactus, Bryonia, Rhus tox., Arsenicum, Mezereum.
Tenemos que considerear dos variedades de Ranunculus: bulbosus y sceleratus. Las dos plantas tienen una savia que irrita con exceso la piel. Cuando se aplica localmente, produce eritema seguido más tarde de una erupción que al principio es de carácter vesiculoso, acompañada de ardor intenso y comezón. Si los síntomas aumentan en razón de la intensidad de la acción del medicamento, puede llegar hasta la ulceración y gangrena de las partes afectadas, con fiebre y delirio. Este es un cuadro extremado y sin embargo, puede producirse como consecuencia del uso prolongado de algunas especies de Ranunculus.
Estudiaremos ahora a Ranunculus bulbosus en relación con su acción sobre las membranas serosas. Podemos pensar en Ranunculus bulbosus en la inflamación de estas membranas, particularmente de la pleura o el peritoneo, cuando hay dolores agudos hirientes en el pecho, en el caso de pleuresía, con efusión serosa en una o en otra cavidad, según el sitio de la inflamación. Acompañado a este derrame, encontramos gran ansiedad, disnea y angustia, producida en parte por la acumulación del líquido y en parte por los dolores mismos. Estos son síntomas no comunmente conocidos entre los médicos, sin embargo, se encontrará que aquí Ranunculus prestará

tan grandes servicios como Apis, Bryonia o Sulphur y en ocasiones mejor que estos, si los dolores son del carácter descrito.

El segundo capítulo es la acción sobre los músculos. Nos encontramos que Ranunculus obra como un agente curativo. Está indicado especialmente en el reumatismo muscular en particular cuando los músculos afectados son los del tronco. El reumatismo intercostal cede mucho más rápidamente a este medicamento que a cualquier otro. Hay generalmente gran sensibilidad al tacto y en los músculos una sensación de magulladura, como si hubieran sido golpeados. Tengo entendido que Aconitum, Arnica y Bryonia, se dan frecuentemente cuando Ranunculus es el indicado.

Aconitum puede ser el medicamento indicado en la pleurodinia cuando hay temperatura elevada, (lo que no es frecuente) especialmente si puede atribuirse la molestia a la exposición al frío después de haber tenido demasiado calor.

Ranunculus bulbosus puede también ser usado en el caso de las personas sujetas a sufrir puntos dolorosos en el pecho en cada cambio de tiempo. Puede también ser empleado en los puntos dolorosos que quedan en el pecho después de la neumonía. La sensación característica que acompaña a los dolores de Panunculus es de ulceración subcutánea, puramente subjetiva. Este síntoma también es característico de Pulsatilla.

Nuevamente nos encontramos a Ranunculus bulbosus indicado en los dolores torácicos consecutivos a adherecias después de una pleuresía.

Los dolores reumáticos de Ranunculus empeoran por el tiempo húmedo y particularmente por el cambio de tiempo.

Aun el dolor de cabeza, teniendo esta agravación, puede ser curado por Ranunculus.

También lo podemos encontrar indicado en la inflamción del músculo diafragma, cuando hay dolores agudos partiendo de los hipocondrios y epigastrio con irradiación a la espalda.

Otro medicamento que he encontrado de utilidad en este padecimiento, es Cactus gradiflorus, que resulta excelente en los dolores agudos del diafragma, en particular, si hay una sensación de como si una banda estuviera atada fuertemente alrededor del talle, marcando justamente las inserciones del diafragma o el reborde costal.

Es necesario recordar a Ranuncudus bulbosus como un remedio para los malos efectos de los excesos de la bebida, en el hipo, y aun en los ataques de forma epiléptica y el delirium tremens. Ranunculus bulbosus es útil en el herpes zoster o zona. Las vesículas aparecen sobre la piel, están llenas de serosidad y arden, algunas veces tienen un aspecto negro-azulado; el dolor es marcado. Está indicado Ranunculus con especialidad cuando el padecimiento sigue el curso de los nervios supraorbitarios o intercostales y va acompañado de dolores agudos y punzantes. En este caso puede ser comparado con Rhus tox., Arsenicum y Mezereum.

Ranunculus también puede producir pénfigo; se forman grandes ámpulas que al reventar dejan la superficie cruenta.

Nuevamente podemos hacer uso de Ranunculus en el eczema que va acompañado de engrosamiento de la piel y formación de escamas callosas y duras. En esto es semejante a Antimonium crudum las que produce Ranunculus son planas y van acompañadas de dolores aguijoneantes. El escurrimiento es icoroso.

Finalmente, haremos mención de la forma en que actúa Ranunculus sobre las mebranas mucosas. Es uno de los medicamentos últiles en la fiebre de heno. Se verá que hay comezón en los ojos; los párpados arden y se sienten irritados; la de nariz y de hormigueo y picazón en la cavidad; algunas veces esta sensación ataca los orificios posteriores de las fosas nasales, obligando al enfermo a desgarrar, a tragar y a esforzarse en cualquier forma para rascarse la parte afectada. Arsenicum y Silicea tienen también este síntoma. Se notará también que hay en este catarro anual, ronquera, dolor muscular irritante generalizado y probablemente muy agudos dolores alrededor del pecho. El cuello vesical puede estar afectado, produciendo algún ardor en el momento de orinar. Sulphur no sigue bien a Ranunculus bulbosus Ambronia artemise folia debe ser comparado con Ranunculus en este catarro anual. Las experimentacionas hechas por el Dr. Holman contienen los siguientes detalles : ensanchamiento de la nariz y el pecho; dolor opresivo en el lado izquierdo del mismo ; necesita el paciente sentarse para respirar con comodidad; agravación por la tarde hasta la media noche; despierta repentinamente como con tos ferina; la cara está de color rojo-obscuro; los ojos congestionados; comezón; flujo acuoso; nariz roja e hinchada.

Sulphur no sigue bien a Ranunculus.

Dd helleborus niger y staphysagria

Helleborus niger

produce depresión sensorial e hidropesias. Debe ser comparado en la depresión sensorial con Spiritus dulcis., Phosphoric., acid., Opium; en las hidropesias, con Apis, Digitalis, Zincum y Terebinthina.

Me propongo considerar primero a Helleborus niger; también llamado "Rosa de Noche buena", porque florea en la mitad del invierno; tiene su raíz de color café-obscuro y contiene en ella dos principios activos : la Helleborina y la Helleboreina. Se dice que el último da origen a las propiedades venenosas de la planta; es un activo veneno cardiaco; también obra como violento purgante produciendo vómitos, dolores abdominales y finalmente colapso. Esta acción purgante se asemeja a la de Veratrum album y en el colapso a Camphora, Carbo v. y China. Veratrum album no tiene la apatía de tiene los pies y las rodillas frías, raramente inconsciencia; Camphora tiene frialdad más prominente, algunas veces acompañada de sensación interna de calor, obligando al paciente a desabrigarse.

Helleborina es, ya inactivo, o según algunos autores ejerce una influencia narcótica y produce paresia a la vez sensitiva y motriz.

La acción de Helleborus ha sido esbozada en el principio de este capítulo, obra sobre el sensorio entorpeciéndolo, produciendo sopor, síntomas tifódicos, parálisis musculares, colapso y finalmente hidropesías. Antes de seguir adelante quiero aclarar que por colapso no quiero significar simple debilidad, sino un estado en el que hay positiva disminución de la temperatura, de tal manera que el termómetro en vez de registrar 37 grados, puede marcar 35.5 o menos todavía, según la intensidad del colapso.

En su acción sobre el sensorio. encontramos que Helleborus entorpece o deprime la actividad sensorial; este estado se manifiesta por diversos síntomas; por ejemplo, se nota una disminución del poder de la mente sobre el cuerpo; el paciente es lento en contestar las preguntas, como si no las hubiera entendido; ve de un modo imperfecto o parece que no comprende lo que ve; el oído es imperfecto; el gusto está abolido o muy disminuído; tiene deseos de trabajar u ocuparse en algo, pero carece de fuerzas musculares para hacerlo; por esto veremos que todos los sentidos se entorpecen bajo la acción de Helleborus. Aún el sentido muscular está afectado. Los músculos no obedecen a la voluntad a menos que la mente les obligue con imperio; si por ejemplo, el paciente está sosteniendo algo en sus manos y se le habla, distrayendo de este modo su mente, los músculos se relajan y deja caer lo que sostenía. El músculo cardiaco no escapa a estos efectos paréticos siendo su acción muy lenta. El enfermo experimenta una pesantez u opresión en todo el cuerpo. Hay una apremiante cefalalgia de carácter entorpecedor. Algunas veces hay una sensación de como si el contenido del cráneo se agolpara a la frente y los ojos. Por esto veremos que Belladonna no es el único remedio que produce esta sensación, de como si el cerebro estuviese siendo empujado hacia la frente. La cara revela el estupor del enfermo afectado.

Podemos encontrar a Helleborus; indicado en la fiebre tifoidea o en otras condiciones en las que esta opresión sensorial y los síntomas ya enumerados están presentes. En estos casos también se observarán los siguientes síntomas : manchas negras como de hollín en las ventanas de la nariz, las que también están secas; la lengua amarillenta y seca, con los bordes rojos; el aliento es horriblemente fétido; las bebidas "ruedan" hasta el estómago de modo que pueden percibirse; la fiebre que acompaña a estos síntomas es más notable por la tarde de las 4 a las 8 p.m. ; la cara a veces está pálida y fría; el pulso ténue, débil y casi imperceptible; existe también el significativo tirar de los labios y de las ropas.

En esta depresión sensorial Helleborus es semejante a Phosphoricum acid., Spiritus dulc. nitr. y a Opium. Como Phosphoric acid., tiene depresión sensorial, apatía y completa indiferencia; el enfermo en completamente indiferente a su suerte; no le importa que viva o muera. La diferencia entre estos medicamentos es que bajo la acción

de Phosphoric acid. hay somnolencia de la que el paciente fácilmente despierta y vuelve a su perfecto estado de consciencia; este no es el caso de Helleborus, que produce un estado casi aproximado al estupor de Opium. Phosphoric. acid. carece de la completa relajación muscular que produce Helleborus; no hay tampoco las manchas negras tan marcadas en las ventanas de la nariz.

Epirit. dulc. nitr., es un medicamento recomendado por Hahnemann en los casos de fiebre tifoidea, cuando el detalle más importante de todo el caso es la apatía sensorial, no estando naturalmente, presentes los síntomas que indiquen otro medicamento. El paciente parece estar bajo una especie de estupor, del cual puede, por un esfuerzo, volver en sí, pero vuelve inmediatamente a caer en la misma indiferencia. En estos casos, Hahnemann disolvía unas cuantas gotas de la droga pura en medio vaso de agua y la administraba a cada dos o tres horas, hasta que la reacción se manifestaba u otro medicamento aparecía necesario. Se encontrará que el Espíritu dulce de nitro y Phosphoricum acid., difieren de Helleborus solamente en grado; el Espíritu dulce de nitro y produciendo apatía más ligera; Phosphoric acid., le sigue; en tanto que Helleborus la produce más marcada.

Verán que Opium, la última droga de la lista, es semejante a Helleborus La congestión cerebral es más profunda bajo la acción de Opium; la respiración es fuerte y estertorosa, síntoma no marcado en Helleborus. La cara es obscura, de un rojo que tira a café o con frecuencia azul; bajo la acción de Helleborus la cara es pálida, frecuentemente fría o al menos más fría de lo natural, a veces lívida y cubierta de sudor frío; el pulso ayudará a distinguir estos dos medicamentos: es lleno y lento en Opium; pequeño, débil y casi imperceptible en Helleborus.

También debe pensarse en Arnica montana, como en un medicamento que produce este estado de estupidez y somnolencia y del cual el paciente puede temporalmente volver en sí.

Hydrocianicum acidum y Cina, tienen el síntoma de que "las bebidas llegan hasta el estómago produciendo un ruido que puede oirse"'. Cina lo tiene en la tosferina; pero se escucha cuando es eminente la parálisis de los pulmones y del cerebro en que Hydrocianicum acid. es el mejor remedio. Phosphorus lo tiene en los estados tifódicos. Cuprum produce gorgoteo en el esófago al beber.

En el agotamiento muscular debemos comparar a Helleborus con Muriaticum acid., Opium, Gelsemium, Saponin., Conium, Curare y Kali carb.

Se recurre a Helleborus en la meningitis cuando la exudación ha tenido lugar. Estarán presentes todos o algunos de los síntomas de la apatía sensorial ya mencionados, mostrando el estado de depresión de la economía; además, habrá dolores agudos en la cabeza. Si el paciente es un niño, naturalmente será incapaz de describir este último síntoma, pero se notará el grito repentino y el llanto que producen estos dolores; el niño hunde la cabeza en la almohada, ésta

está caliente y la frente arrugada en el entrecejo, por la contracción muscular. Hay movimientos automáticos de un brazo y de un pie. Estos movimientos pueden presentarse a intervalos regulares. Recuerdo un caso en el que la cabeza del niño cada tres minutos era tirada hacía un lado y el brazo lanzado hacia la cabeza, profiriendo un grito lastimero, volviendo otra vez a aquietarse. En el caso de Helleborus, los globos oculares giran hacía arriba, de tal manera que dificílmente se puede ver a la pupila; la cara llega enrojecerse y después gradualmente se pone pálida. Cuando se le ofrece agua, el niño toma el vaso con avidez como si estuviera sediento; esto lo hace, no solamente por la sed, sino debido a la nerviosidad. Generalmente hay constipación intestinal, o si hay alguna evacuación, ésta es obscura, escasa y como gelatinosa. La orina es obscura, disminuída y cargada de albúmina.

Podemos desde luego imaginar que la fiebre del heno, en algunos casos, demandará el uso de Helleborus, si estos síntomas están presentes. Además, la boca puede estar irritada, haber salivación, escoriación nasal, etc.

El remedio más próximo a Helleborus en la meningitis tuberculosa es Apis; este tiene muy claro el grito encefálico y produce más excitación e irritabilidad que Helleborus que tiene característicamente la depresión sansorial. En Apis encontramos a menudo espasmos de los músculos flexores, de tal manera que los dedos gordos del pie están flexionados, lo que no ha sido notado bajo la acción de Helleborus.

Digitalis es muy semejante a Helleborus en la hidropesía del cerebro; ambos medicamentos producen gran depresión del sensorio; ambos se adaptan a la hidropesía post-escarlatinosa y los dos producen meningitis con derrame. Se optará por Digitalis cuando la orina sea escasa, albumisosa y el pulso característicamente lento, pudiendo ser más lento que los latidos cardiacos; además de estos síntomas, hay sudor frío en la superficie del cuerpo.

Zincum es de utilidad en los casos en que las erupciones han sido interrumpidas y no se han desarrollado bien. El organismo del niño está tan enervado, que no tiene la fuerza suficiente para desarrollar la erupción. Despierta como aterrorizado y los pies están constantemente agitados. Otras formas de hidropesía en las que Helleborus está indicado, es en la hidropesía general o anasarca y especialmente cuando hay ascitis. Aquí se puede prescribir Helleborus, cuando el trastorno ha sido consecutivo a una nefritis post-escarlatinosa. La orina es obscura y escasa o de color ahumado por estar mezclada con sangre descompuesta. Por el reposo deposita un sedimento parecido al café molido. Las evacuaciones contienen moco con aspecto de jalea y son expulsadas con mucho esfuerzo.

El medicamento más parecido a Helleborus en esto, es Terebinthina, que cura la hidropesía producida por congestión renal, revelada por dolores sordos en esta región y por el color ahumado de la orina.

En la hidropesía, debe conpararse también a Helleborus con

Arsenicum y Apocynum.
Como par demostrar más claramente la depresión de Helleborus, puedo mencionar su empleo con éxito en un caso de shock por un golpe sobre la cabeza. Arnica había fallado, el paciente había llegado a un estado somnoliento; una pupila estaba más dilatada que la otra; el enfermo contestaba a las preguntas con lentitud, como si su comprensión fuera imperfecta; arrastraba una pierna al caminar; el número de pulsaciones, difícilmente era de cincuenta por minuto; el paciente empeoraba entre cuatro y ocho p.m. Helleborus curó el caso.

Staphysagria
debe compararse con Colcynthis y Causticum. Obra sobre la sangre, en la sicosis y el escorbuto; es de utilidad en la pérdida de fluidos; obra también sobre los órganos. Es semejante a Nux vóm., Mercurius, Thuja Cistus canad., Colocynthis y Chamomilla.
Staphysagria está indicado en primer lugar en los pacientes de apariencia pálida; que están agotados y estenuados, especialmente en lo relativo al sistema nervioso. Cerebro y médula espinal están debilitados bajo su influencia; la cara está bastante demacrada; la nariz afilada y puntiaguda y los ojos hundidos y con círculos azulosos. Mentalmente, el enfermito de Staphysagria es bastante impetuoso e irritable, recordando esto con mucha razón a Chamomilla. El enfermo adulto de Staphysagria, está hipocondriaco. Puede haber numerosas causas que producen este estado mental, cuando el remedio está indicado. Primero : excesos sexuales : Staphysagria es requerido para estos estados hipocondriacos después de la masturbación o cuando este estado mental sobreviene en los jóvenes o en las jóvenes, como resultado de permitir a la mente esparcirse demasiado en asuntos sexuales. Debido a este mal hábito, el niño llega a hacerse apático, melancólico, con la expresión de hundimiento de la cara ya descrito. El enfermo más bien prefiere la soledad y teme al sexo opuesto. Localmente se notará una irritabilidad en la porción prostática de la uretra. Este estado es algunas veces el resultado del exceso de relaciones sexuales.
Platina ha sido recomendado por Grauvogl como un medicamento capaz de curar los espasmos y las convulsiones, la extenuación y el conjunto de síntomas producidos por el abuso de los órganos sexuales antes de la pubertad.
Otro medicamento es Caladium en el que se debe pensar cuando como consecuencia de la masturbación el pene está tan flácido como un trapo Cuando el prepucio es levantado hacía atrás, ahí queda, pues carece de la contractilidad necesaria para recobrar su sitio. Las poluciones nocturnas se presentan con o sin sueños y éstos no son sobre asuntos sexuales.
Otros medicamentos indicados en este estado, son Dioscorea y Gelsemium y el bien conocido grupo a que ya me he referido en una conferencia anterior : Nux vóm., Sulphur, Calcarea ostr., y

Lycopodium. Entre los nuevos remedios se ha hablado bien de Natrum bromat. y Kali bromat.; yo he observado que dan resultado cuando hay depresión mental y debilidad de las piernas después de la masturbación.

En la mujer, en quien la masturbación no es tan frecuente, se encuentran síntomas ováricos resultantes de este hábito. Staphysagria será el remedio cuando estos órganos estén en un estado de irritabilidad, especialmente en las mujeres nerviosas y excitables. También puede ser usado en mujeres de este tempramento, cuando estos síntomas se presentan en la ausencia prolongada del esposo. Cuando el prurito vulvar se presenta, Caladium ayuda con frecuencia.

Staphysagria tiene otra serie de síntomas mentales de un tipo diferente al de los ya mencionados; el enfermo con facilidad monta en cólera, es sensible a la menor impresión y se ofende por el menor motivo real o imaginario.

Nos encontramos indicado Staphysagria en lo que ya he llamado cólico mental; esto es, calambres abdominales que siguen a un acceso de cólera, justamente como los que encontramos en Chamomilla y Colocynthis. Chamomilla está indicado en estos casos, cuando acompañando al cólico hay cara caliente, mejillas rojas y transpiración también caliente. Colocynthis en los violentos dolores que obligan al enfermo a doblarse, para encontrar mejoría.

Staphysagria es aquí complementario de Colocynthis, que viene a completar la curación cuando Colocynthis es insuficiente.

Staphysagria también está indicado en las enfermedades de la piel y de los huesos. Este medicamento por largo tiempo ha sido empleado en lavados locales para destruir los piojos y otros plagas pediculares. Podemos usarlo al interior cuando aparece sobre la piel una afección eczematosa. Esta puede aparecer en la cabeza o en la cara y en otras regiones del cuerpo, pero especialmente en las dos primeras.

La erupción es ordinariamente seca y forma costras muy gruesasque producen comezón violenta. Este último síntoma es una indicación para la aplicación local de Staphysagria. La particularidad de esta comezón es que al rescarse, cesa la comezón apareciendo en otro lugar. Otras veces estas costras son húmedad, de color amarillento y muy fétidas, favoreciendo la producción de piojos. Por esto se verá que Staphysagria está indicado en las costras de leche o eczema capitis. Nuevamente este medicamento puede estar indicado en los niños débiles y deprimidos como resultado de una herencia sifilítica o sicósica; en tales niños se encontrará casi siempre que los dientes se gastan rápidamente. Apenas los dientes de leche han salido, se vuelven negros, manchados y se despedazan. En este caso Staphysagria es un rival de Kreosotum, al que ningún remedio iguala en su eficacia para la carie precoz de los dientes de leche, cuando se ponen amarillos, después negros y finalmente se desmoronan.

En Thuja, como se recordará, los dientes se destruyen en el borde de las encías.

Al lado de estos medicamentos se puede pensar en Antimonium crudum y en otros todavía, como Coffea y Chamomilla.

En el enfermo de Staphysagria, las encías están afectadas, hinchadas esponjosas, sangran fácilmente al contacto de los alimentos o del dedo, yendo acompañado este estado, de una inflamación dolorosa de los ganglios submaxilares. Está indicado especialmente después del abuso del Mercurio. Staphysagria es de utilidad en los niños que sufren inflamaciones de los ojos, particularmente de los párpados, con orzuelos endurecidos.

Para esos pequeños tumores quísticos que se forman en los párpados entre la mucosa y la capa subyacente. Graphites en el remedio indicado Baryta carbónica, también cura los tumores en los cartílagos tarsos.

Los enfermitos de Staphysagria tienen una erupción eczematosa en las orejas, formada por costras amarillas; la exudación es sanguinolenta y parece producir desolladura en la piel. Todavía pordemos encontrar a Staphysagria afectando los huesos; produciendo inflamación del perióstio con la supuración subsecuente.

También produce sobre la piel, verrugas o condilomas generalmente pediculados; este síntoma cataloga a Staphysagria entre los remedios sicósicos. Por esto debe juzgarse como concomitante de Thuja. siendo de preferirse cuando está presente la forma de erupción ya mencionada, la caries dentaria y los condilomas pediculados.

En algunos casos lo encontramos indicado en la ulceración sifilítica después del abuso del Mercurio, siendo el pus delgado y acre; una exploración con estilete revela que el hueso está afectado.

Tenemos varios medicamentos semejantes a Staphisagria en las afecciones óseas, ya sean de orígen sifilítico o escrofuloso. Uno de ellos es Stillingia, de gran aplicación en las afecciones sifilíticas de los huesos largos, tales como el fémur, la tibia, el húmero, etc., en la periostitis o en la osteitis, agravándose los dolores por la noche y por el tiempo húmedo. Además de esto casi siempre se encontrará un coriza excoriante y el bien conocido ozena sifilítico.

El otro medicamento es Mercurius y aún tenemos todavía a Kali hidroiodicum, especialmente en los casos en que hay combinación de sífilis y argirismo.

Strontiana carb. se adapta más a las constituciones escrofulosas. Está indicado en la osteitis, particularmente del fémur con úlceras, cuyo escurrimiento contiene mayor o menor cantidad de secuestros. Con esta afección ósea hay propensión a padecer diarreas profusas y debilitantes, parecidas a las que se producen en la fiebre héctica.

Otro medicamento es el Cloruro de oro y de platino, que es de utililidad en la caries o en la necrosis.

La sal de Gettysburg, que debe su eficacia al carbonato de litio que contiene, es útil especialmente en la caries de las vértebras y de las articulaciónes de la cadera.

Staphisagria también encuentra aplicación en la gota. No es útil en los accesos agudos, sino cuando la gota se vuelve constitucional;

cuando el urato de sodio, en vez de ser eliminado por los riñones se deposita en diversas articulaciones y órganos, produciendo nudosidades artríticas.

También está indicado en la oftalmia artrítica; los ojos arden y se sienten muy secos, no obstante que hay comezón y lacrimeo profuso. Los dolores irradian de los ojos a los dientes. En estas afecciones gotosas de los ojos, Colocynthis es también un buen remedio.

Sobre el estómago e intestinos, Staphysagria parece obrar produciendo relajación gástrica, de tal manera que el órgano parece colgante, fláccido y débil. Este mismo síntoma nos lo encontramos bajo la acción de Ipecacuana y Abrotanum. En Staphisagria hay deseo de tomar aguardiente, vino o cualquier estimulante. Estos enfermos son propensos a sufrir cólicos que se parecen notablemente a los que produce Colocynthis.

También debe recordarse a Staphisagria como un buen medicamento en el cólico que sigue a las intervenciones quirúrgicas abdominales. Es eficaz para cuando una herida, ya sea quirúrgica o accidental, se inflama y está hipersensible.

En la diarrea está indicado, cuando en los niños el desorden va acompañado de una forma particular de estomacace; la lengua y encías están blancas y esponjadas, al mismo tiempo que hay dolores cortantes antes y después de la evacuación, con marcado tenesmo rectal durante la misma y escape de gases ordinariamente calientes y de olor a huevos podridos, (en esto se parece a Chamomilla) las evacuaciones se presentan por cualquier intento de tomar alimentos o bebidas. En su acción sobre los órganos femeninos, Staphysagria produce prolapso uterino, yendo casi siempre asociado a un estado de flaccidez gástrica. Todo el abdomen, contenido y paredes, se siente como si se fuera a caer, tal es el estado de relajación; si se quiere investigar la causa de esto se verá que un amor frustrado o el permitir a la mente elucubrar sobre asuntos sexuales, ha favorecido esta relajación. La leucorrea que acompaña a este estado, es amarilla y escoriante.

Pulsatilla pratensis

Pulsatilla obra sobre los vasos sanguíneos, las membranas mucosas, sinoviales y sobre los órganos.

Debe ser comparado con Bryonia, Nux vóm., Antimonium crudum, Ipecacuanha, Sulphur, Sulphuricum acid., Arsenicum., Colchicum, Kali bichromicum. Caulophillum, Ignatia, Actea racemosa, Helonias, Hamamelis y Sepia.

Nos toca hoy estudiar a Pulsatilla; la especie que estudiaremos es la Pulsatilla de Hahnemann, Pulsatilla pratensis y no la planta americana, Pulsatilla nuttaliana; hay una pequeña diferencia en la acción de una y otra. La pratensis ha sido mejor experimentada. Los remedios concordantes de esta droga son numerosos. Esto se debe a que es un medicamento bien estudiado y con frecuencia indicado. Sus

remedios complementarios son Sulphuricum acidum y Lycopodium. Sus antídotos son Chamomilla, Coffea, Ignatia y Nux vóm.

Las relaciones de Pulsatilla con Sulphuric. acid., requieren atención particular. El último medicamento sigue al primero en las afecciones gástricas. Pulsatilla también antidotiza a Sulphuric. acid., cuando éste ha sido usado para curar el hábito alcohólico; Pulsatilla ha sido propuesto como el mejor remedio, para la diarrea que sobreviene con este motivo.

Pulsatilla pratensis es una hermosa florecilla, perteneciente a las Anémonas. Ha sido llamada "flor del viento" y su nombre armoniza con sus síntomas, porque son tan variables como el mismo viento. El cambio de los síntomas es característico de la droga. Este cambio es notable especialmente en las hemorragias, que por momentos parecen detenerse, presentándose algunas horas después. En la diarrea también se presenta este caracter, cambiando las evacuaciones continuamente de aspecto; unas veces son verdes, otras amarillentas y en otras ocasiones mucosas.

Los síntomas mentales son igualmente cambiables; el enfermo está a veces irritable, otras, lloroso y otras apacible y agradable. Estos detalles ilustran la inconstancia descrita.

Pulsatilla parece adaptarse especialmente al organismo femenino, aún cuando afecta a los hombres también.

Es uno de los medicamentos que nos pone en condiciones de elegirlo por la predominancia de sus síntomas mentales. Está indicado con especialidad en los enfermos de carácter lloroso y apacible, poseedores, más bien, de un temperamento flemático; nunca están irascibles, aunque a veces mal humorados. Así, en el caso de un niño, con algún achaque gástrico. Pulsatilla puede ser el medicamento indicado, cuando está malhumorado, pálido, con escalofríos y que nada le contenta. Este no es el estado de Nux vóm., ni tampoco el Chamomilla, pues ambos remedios tienen mucho de violencia como enojo.

La paciente de Pulsatilla es llorosa, fácilmente se desalienta. Algunas veces está llena de ansiedad con presentimiento de algún desastre inminente. Esta ansiedad parece originarse en el epigastrio y muy frecuentemente va asociada de indigestión. A este estado acompaña un castañeo de dientes, taquicardia y bochornos. Estos son los síntomas principales de Pulsatilla. Están presentes más o menos todos, en las enfermedades en que está indicado este medicamento.

En caso de presentarse estos síntomas mentales, debe hacerse la comparación de Pulsatilla con Sepia, que como se recordará, tiene un estado mental semejante, pero difiere en que siempre hay irritabilidad y enojo. Hay también indiferencia a los quehaceres domésticos, a los que anteriormente era dedicada.

Natrum mur. también da origen a un carácter lloroso, semejante al de Pulsatilla; pero en aquél, los consuelos agravan, en tanto que el paciente de Pulsatilla los desea.

Stannum metall, produce también la disposición llorosa; la enferma

está completamnte desanimado o bien se queja de sus síntomas torácicos. Teme ponerse más mala.

La paciente de Ignatia está triste pero oculta sus pesares a los demás.

Pulsatilla está especialmente indicado en las mujeres anémicas o cloróticas, cuando constantemente se quejan de una sensación de escalofrío, pero a pesar de esto, encuentran mejoría de sus síntomas al aire libre. No pueden permanecer en una habitación cerrada. Los dolores que les aquejan, parecen ir acompañados de escalofrío, el cual es más marcado mientras más intensos son los dolores. Los síntomas mentales ya mencionados están presentes. Estará especialmente indicado Pulsatilla, cuando la clorosis se ha complicado por el abuso del hierro y la quina. Los cloróticos que nos lleguen del campo alopático, después de haber sido atacados por el hierro y la quina, nos harán pensar que estos remedios no son aplicables al caso presente y encontraremos para ellos su primero, si no es que su único remedio, en Pulsatilla. Estos datos nos serán con frecuencia de utilidad en la práctica, no solamente en la clorosis, sino en otras afecciones originadas, no tanto por una lesión local, sino por un estado defectuoso de la nutrición general; todo el sistema está agotado; todos los tejidos relajados; la mujer sufre de desviación del útero; las reglas son tardías, escasas, obscuras, coaguladas y de carácter variable. Pulsatilla no siempre cura después del abuso de hierro; pero hay con esta substancia la mismo relación que tiene Nux vóm. con el abuso de los purgantes drásticos y Camphora con el de la cantárida.

Para comprender cómo produce fenómenos Pulsatilla en las mujeres, en las que se encuentra indicado con más frecuencia, aún cuando excepcionalmente también en los hombres, es necesario recordar que el medicamento obra sobre el sistema vascular, especialmente sobre el corazón derecho y sobre las venas y los capilares. De este modo nos encontramos que cualquier debilitamiento en el sistema venoso, cualquier obstáculo al retorno de la sangre al corazón, puede provocar justificadamente los síntomas que indican el uso de Pulsatilla. Sabemos, por ejemplo, que una habitación cerrada y caliente, producirá estos síntomas. Si se coloca a un individuo en una pieza cerrada, en donde la temperatura es muy elevada, veremos que las venas se vuelven tortuosas, habrá opresión del pecho, retardo de la acción cardiaca. Cuando estos síntomas se presentan revelando un estado patológico, sugieren el uso de Pulsatilla. Obra más marcadamente sobre el corazón derecho que sobre el izquierdo; en consecuencia, a pesar del escalofrío que proviene de la anemia, el aire libre, obrando como un estimulante de la circulación venosa, mejora los síntomas originados por la paresia circulatoria de las venas.

Se encontrarán en todo el cuerpo, muchos síntomas que demandan el uso de Pulsatilla, cuando hay desarreglos circulatorios venosos. En el pecho se experimenta una sensación de dolor que se refiere a la

región subclavia derecha o izquierda, o al vértice de uno u otro pulmón, dolor que se experimenta cuando el enfermo se recuesta sobre este lado, o comprime el lado izquierdo del tórax. Esta sensibilidad parece invadir el tejido muscular del hombro y aún el brazo del lado afectado. Este síntoma revela una congestión venosa o al menos una circulación lenta a través de la parte superior de pulmón. Ha sido este un síntoma de mucho valor para muchos médicos en el principio de la tuberculosis, especialmente en las mujeres de temperamento de Pulsatilla. Al mismo tiempo que se presenta este dolor, puede haber tos con expectoración. Aun cuando estos síntomas no indiquen necesariamente el principio de una tuberculosis, tendremos otros que nos revelen el origen de la enfermedad. Pulsatilla ha curado varios de estos casos.

Encontramos a Pulsatilla indicado en las venas varicosas, ya sea de los miembros, especialmente de las piernas, o del testículo (varicocele). Las partes afectadas están azulosas y molestan al enfermo por la irritación y los dolores punzantes y de magulladura que ocasionan.

La epistaxis de Pulsatilla es de carácter pasivo. La sangre sale constantemente, pero no es de color rojo encendido y no sale con violencia, como sucede en los casos de lesiones arteriales. Frecuentemente se trata de una epistáxis vicariante, que se presenta en lugar de la menstruación. Lo mismo sucede en la hemoptisis que va asociada a una congestión pulmonar pasiva o a una menstruación suprimida.

Pulsatilla tiene un análogo importante que es Hamamelis, cuando se presentan estos síntomas venosos.

Antes de que Hamamelis fuera experimentado, Pulsatilla era el único medicamento con que contábamos para los síntomas mencionados. Hamamelis es de preferirse en las venas varicosas, a no ser que los síntomas constitutionales indiquen a Pulsatilla, especialmente en los casos de varicocele. Hamamelis en aplicaciones locales y tomado al interior, ha curado el varicocele. La gran característica de este medicamento y que hace acertada su indicación, es la irritación de la parte afectada. Se trata de una irritación que no es exactamente la sensación de magulladura que produce Arnica, tampoco la irritable sensibilidad de Lachesis, ni la irritación punzante de Apis, sino la irritación que produce la congestión venosa. Se puede aplicar Hamamelis con éxito, en cualquier estado en que esté presente esta condición. Frecuentemente he usado esta droga en el embarazo, cuando las venas varicosas aparecen sobre el abdomen y cuando la enferma no puede hacer ningún movimiento, sin experimentar una sensación dolorosa de magulladura. Hamamelis no es el panacea en que los drogistas quisieran hacernos creer; éste no cura todo; las torceduras, las quemaduras, etc., sino solamente los estados ya mencionados.

Otro medicamento concordante de Pulsatilla es Lilium tigrinum, que como el primero, afecta el lado derecho del corazón, produciendo

estancamiento venoso; con mejoría al aire libre, menstruaciones escasas y sabor de sangre. Pero difiere de Pulsatilla en la marcada tendencia al prolapso uterino, con pesantez del abdomen que mejora por sostenérselo o por cruzar las piernas. Difiere también en el estado mental que es de irritabilidad e inquietud, con deseo constante de apresurarse. Además, cuando Lilium está indicado, un agudo dolor se extiende del pezón izquierdo a través del pecho, hasta la espalda.

Otro medicamento análogo es Sepia, que tiene muchos de los síntomas de Pulsatilla. Está indicado en la anemia y clorosis; también tiene un temperamento dócil y lloroso, pero hay diferencia en sus síntomas mentales. En Sepia, puede haber irritabilidad y a veces vehemencia.

La enferma de Sepia tiene completa aversión a los deberes acostumbrados en su casa.

Vamos a considerar ahora la acción de Pulsatilla sobre las membranas mucosas. Esto será fácil retenerlo. Produce una inflamación catarral de las membranas mucosas, que termina con la producción de un moco blanco-amarillo o verde-amarillento; aquí tenemos un detalle que puede ser aplicado a cualquiera membrana mucosa.

La conjuntivitis requiere el uso de Pulsatilla cuando el flujo es espeso, amarillo, o verde amarillento y blando; de aquí se deduce que no está indicada en el comienzo de la enfermedad, sino más tarde, en su curso o en la madurez de la misma. Es un medicamento de mucho valor en la oftalmía después del sarampión, en la oftalmía purulenta y en la oftalmía neonatorum, sea o no de orígen gonorréico, cuando el flujo es del carácter antes descrito. Su análogo en este as Argentum nitricum que tiene los mismo síntomas en grado más marcado y se utiliza después de haber fallado Pulsatilla. Este último, parece algunas veces despertar la acción de Argentum nitricum.

Mercurius corrosivus se acomoda a los casos en que a pesar del uso de Argentum nitricum, hay amenaza de úlcera o perforación de la córnea. Estos no son de ningún modo los únicos síntomas que en los ojos produce Pulsatilla. El Dr. George S. Norton de New York, publicó hace algunos años en el Hahnemann Monthly, un artículo sobre el uso de este medicamento en las enfermedades en los ojos, que contiene algunas seis o siete páginas. Además de la inflamación conjuntival antes descrita. Pulsatilla produce obscurecimiento de la visión, con vértigo y náuseas; diplopia, aparición de estrellas, círculos de fuego, etc. (siendo estos generalmente síntomas reflejos); pústulas sobre la cornea con poca fotofabia; pero con lacrimeo que empeora al aire libre; dolores presivos y punzantes en el ojo; inflamación de los párpados y orzuelos, con mejoría al aire libre; los bordes de los párpados están inflamados pero sin excoriación.

Pulsatilla es también un excelente medicamento en las pequeñas úlceras centrales de la córnea, sin desarrollo vascular, especialmente

cuando esto sucede en los sujetos escrofulosos. Puede también ser empleado en el lacrimeo por enfermedad del canal lacrimal, cuando existen los síntomas antes enumerados. Generalmente este lacrimeo empeora al aire libre.

Pulsatilla también afecta las mucosas nasales, produciendo síntomas que la indican en los estados avanzados de un catarro; no debe ser dado en el comienzo, a menos que el temperamento y otros síntomas lo decidan, porque el estornudo y el flujo seroso excoriante, no son síntomas característicos de Pulsatilla. Pero cuando se trata de una catarro nasal "maduro" esto es, cuando el flujo nasal es grueso, muco purulento, amarillento o verde-amarillento, y nada excoriante, se tiene un cuadro perfecto de Pulsatilla.

En el catarro nasal crónico; puede darse Pulsatilla si el flujo es del carácter mencionado. Se debe dar este medicamento con frecuencia y persistentemente, a fin de curar. Además de los síntomas ya mencionados, hay todavía otro; la pérdida del sabor y del olfato. Hay otro medicamento, Cyclamen, que es muy semejante a Pulsatilla en su sintomatología; parece adaptarse al catarro nasal cuando hay pérdida del sabor y del olfato; el flujo es grueso, justamente como en Pulsatilla pero tiene además estornudos espasmódicos y aversión al aire libre.

Penthorum sedoides es de utilidad en el comienzo del coriza cuando hay desolladura en la nariz y garganta; el enfermo se queja de una constante sensación de humedad en las fosas nasales, pero sin catarro; más tarde hay un flujo grueso y purulento, justamente como en Pulsatilla.

Spigelia es uno de nuestros mejores remedios para el catarro de las fosas nasales posteriores; los síntomas que lo indican son descargas profusas de moco por las ventanas posteriores; el moco nasal solamente por ahí puede ser expulsado. Este medicamento ha logrado algunas buenas curaciones en manos del Dr. Aug. Korndoerfer, quien también recomienda Theridion para este padecimiento.

Hydrastis cariadensis también se adapta al catarro nasal posterior; el flujo es acuoso, delgado y se acompaña de mucho ardor y desolladura, con una sensación mismo tiempo, de como si hubiera un pelo en las fosas nasales.

Pulsatilla es un medicamento de inestimable valor en las afecciones de los oídos. En la otitis externa, puede usarse, cuando el pabellón de la oreja está caliente, rojo e hinchado; hay dolores punzantes que atormentan como dardos, empeorando en la noche.

En la otitis media, también es de utilidad, cuando hay flujo grueso, amarillo o verde amarillento.

Pulsatilla es uno de nuestros remedios más importantes en la otitis catarral; hay sordera, con sensación de como si los oídos estuvieran tapados; con ruidos impetuosos, isócronos con el pulso. Silicea es el medicamento más cercano a Pulsatilla en la otitis catarral.

Belladonna y Mercurius tienen una acción más profunda que

Pulsatilla sobre el tejido celular.

Chamomilla es semejante a Pulsatilla en los síntomas de los oídos, pero los dolores son más violentos y van acompañados de mejillas rojas; el paciente no puede soportar el dolor.

Se debe pensar en Plantago major, cuando el dolor del oído va asociado a odontalgias.

Tellurium produce catarro en el oído medio, que puede propagarse a las células de la mastoides y dar ahí origen a la formación de un absceso, pudiendo aún invadir el oído interno y el cerebro. El pus se forma en el oído medio y finalmente, perforando la membrana del tímpano, escapa. El flujo resultante es delgado y acre, produciendo ampollas en las partes que toca y despidiendo un olor como a salmuera.

En el catarro de la garganta se encontrará a Pulsatilla indicado algunas veces, aunque no con frecuencia. Aquí se indicaría por el aspecto de la región afectada : color rojo marcado en las tonsilas; un estado varicoso de los vasos sanguíneos; las fauces tienen un tinte rojo-oscuro o purpurino; hay también dolores punzantes (que nos recuerdan a Apis), que empeoran generalmente al deglutir la saliva o después de tomar alimento.

Dejando la faringe, llegamos al estómago donde encontramos a Pulsatilla indicado en los estados catarrales. La lengua está cubierta de un sarro grueso, áspero y blanco; la boca se siente seca y sin embargo no hay mucha sed; la falta de sed es un característico del remedio. También hay náusea y algunas veces vómito, pudiendo ser de alimento, mucoso y aún bilioso. El alimento vomitado puede haber sido ingerido, largo tiempo antes, indicando que el medicamento produce una digestión débil. Hay una sensación de plenitud y pesantez en el estómago, después de comer; algunas veces asociada a una sensación de desolladura en el mismo estómago, como de ulceración. Esto último es solamente un síntoma subjetivo, común de Pulsatilla. Generalmente hay diarrea con evacuaciones viscosas o aguadas, que empeoran después de media noche. Acompañando a estos síntomas gástricos, está la acedía y algunas veces, aunque raramente, pituitas. Cuando las pituitas reclaman el uso de Pulsatilla hay sabor pútrido en la boca en la mañana que mejora después de beber.

El paciente desea tomar limonadas; puede quejarse de que tiene la boca seca, sin embargo, parece tener abundante moco. Otros síntomas que se experimentan son : sensación de peso en el epigastrio una hora después de comer, mejorando en algunas ocasiones por volver a comer; hay una sensación en el esófago, como si el alimento se hubiera detenido ahí (lo mismo sucede en China y Abies); latidos en el epigastrio; mucha flatulencia con movimiento, produciendo dolores aguijoneantes y ruido contínuo; agravación al despertar o justamente después de la cena. Ahora bien, estos son los síntomas que reclaman a este medicamento en el catarro gástrico. ¿Cuales son las causas excitantes? La primera de todas es la más

importante. Se hace uso de Pulsatilla cuando las molestias han provenido por tomar alimentos grasos o pasteles. Se requiere también en los catarros gástricos originados por tomar alimentos pesados, como pavo, legumbres, café, etc., especialmente si esto ha sido en la noche; también después de un enfriamiento gástrico por helados, agua refriagerada, con especialidad si el estómago está caliente. Todavía en otros casos puede estar indicado después de haberse mojado, con particularidad por mojarse los pies, cuando a esto sigue la supresión de los menstruos.

Vamos ahora a diferenciar este remedio de los otros comunmente usados en estos síntomas dispépticos. Los medicamentos más importantes, además de Pulsatilla que tiene agravación por tomar alimentos grasos, son Ipecacuanha, Thuja y Carbo vegetabilis. Arsenicum y Carbo veg. tiene agravación por tomar helados; Nux vómica e Ipecacuanha, por una alimentación variada, o cuando hay agravación por comer en la noche; en este trastorno, puede también pensarse en China; cuando hay deseo de tomar limonadas, debe compararse con Cyclamen, Sabina y Belladonna; en la náusea por pensar u oler el alimento, particularmente si es rico o grasoso, con Sepia y Colchicum; en el vómito de los alimentos, largo tiempo después de haber sido ingeridos, con Kreosotum.

Bryonia produce catarro gástrico con la lengua cubierta de una capa blanca, sabor pútrido en la boca y sensación como de una pesada carga en el estómago; puede estar indicado en el catarro gástrico producido por enfriamiento del estómago, aún cuando es más adaptable cuando ha sido ocasionado por la temperatura calurosa del verano. Bryonia generalmente, de cualquier modo, produce estreñimiento como síntoma concomitante, o si hay diarrea, ésta no es verde-amarillenta o aguada; en vez de esto, las evacuaciones son pulposas y tienen un olor pútrido, como de queso añejo.

Nux vómica se asemeja a Pulsatilla. Los dos prestan servicios en el catarro gástrico originado por comer demasiado o por alimentos variados. Especialmente está indicado Nux vómica después del abuso de las bebidas alcohólicas. La sequedad de la boca con poca o ninguna sed y una sensación molesta en el estómago, se encuentran bajo la acción de Nux vómica; hay constipación intestinal. Hablando en un modo comparativo, podemos decir que la pirosis es más característica en Pulsatilla y las pituitas en Núx vómica. Los síntomas mentales de los dos remedios, difieren ampliamente y por ellos será más fácil distinguirlos.

Antimonium crudum se asemeja a Pulsatilla, pero la lengua, bajo la acción de este medicamnto está cubierta de blanco uniformemente, como si hubiera sido cubierta del cal. El vómito predomina sobre los demás síntomas. Una ligera cantidad de alimentos produce náuseas y vómitos. Este es un excelente remedio en los niños.

Ipecacuanha es un remedio de primera clase en los catarros gástricos producidos por el enfriamiento del estómago por el agua helada o por tomar pasteles (se entiende en demasía), dulces u otras

substancias indigestas. Generalmente la lengua está limpia; rara vez tiene la capa gruesa que produce Pulsatilla o Antimonium crudum y la náusea predomina sobre todos los demás síntomas.

Arsenicum es complementario de Pulsatilla, cuando el catarro gástrico proviene por enfriamiento del estómago, por tomar helados o agua refrigerada.

Bajo la acción de Pulsatilla hay una sensación como de una piedra en el epigástrio. Se encontrará un síntoma semejante en Abies nigra, que se ha usado con éxito en los trastornos del estómago cuando el paciente experimenta una sensación como de un huevo duro (cocído), en el estómago después de comer.

Podemos hacer uso de Pulsatilla en el estreñimiento que se presenta en las mujeres embarazadas, o después del abuso de la quina y sus preparaciones. Las cámaras son grandes, con mucha urgencia y dolor en la espalda, o son escasas; y por último, consisten, no en otra cosa, más que en moco amarillento. Puede hacerse uso de este medicamento en la diarrea, cuando las evacuaciones son de color amarillo-verdoso o muy variables. La molestia es generalmente causada por tomar alimentos variados en la noche anterior, y se agrava el enfermo después de la media noche.

En esto puede compararse con Iris versicolor, que es uno de los mejores medicamentos que poseemos para el cólera morbus, agravándose generalmente entre dos y tres de la mañana; hay vómitos de alimentos y biliosos y ácidos corrompidos acompañados de diarrea. Difiere de Veratrum album en la ausencia de frialdad y los síntomas de colapso.

En la cistitis o catarro de la vejiga, encontramos indicado a Pulsatilla, cuando hay frecuente deseo de orinar, con sensación de presión en la misma, como si estuviera demasiado llena; hay dolor en la uretra; la orina misma, frecuentemente está enturbiada por el moco. Clínicamente no encontramos en Pulsatilla un remedio de primera clase en la cistitis, sino siempre como un remedio adaptado a los síntomas vesicales que acompañan al embarazo. En la cistitis, cede su lugar a Cantharis, Equisetum y Dulcamara.

En la gonorrea se recurre a Pulsatilla cuando el escurrimiento espeso, amarillo o verde-amarillento. Generalmente hay dolores en la región inguinal, cuando esta droga está indicada y he observado también dolores que cruzan el epigastrio de lado a lado; síntoma que algunas veces ha sido producido por Pulsatilla. Después de haberla dado en estos casos, el enfermo regresa quejándose de dolores de estómago; cuando se presenta este síntoma, es necesario prolongar los intervalos entre las dósis, o bien retirar el medicamento por completo.

En la supresión de la gonorrea, Pulsatilla está indicado en la orquitis o más aun en la epididimitis que se presenta como consecuencia de esta supresión. El testículo está retraído, aumentado de volumen, muy sensible al tacto y de un color rojo-obscuro; hay dolores agudos y tirantes a lo largo del cordón espermático. A menos que otros

síntomas lo contraindiquen, Pulsatilla volverá a restablecer el flujo y aliviará el angustioso dolor, pero el enfermo necesita guardar reposo y el escroto ser levantado por un suspensorio. En algunos casos he usado aplicaciones locales calientes, como un coadyuvante. A medida que parece aumentar la hinchazón, mejora el dolor. En algunos de estos casos parece no haber síntomas de carácter subjetivo; todo lo que se puede observar es que el testículo está inflamado y excesivamente sensible al tacto. El flujo gonorréico casi está suspendido. En estos casos, Hamamelis será el medicamento indicado. Clematis es un excelente remedio en la orquitis gonoréica, cuando el testículo está indurado, "tan duro como una piedra".

Rhododendron también es un remedio útil cuando la orquitis llega a hacerse crónica y el testículo está indurado, exactamente como en Clematis. Bajo la acción de Rhododendron, no obstante, el testículo tiende a atrofiarse. Hay también una sensación en la glándula como si estuviera siendo triturada.

En la induración del testículo, podemos comparar a Pulsatilla con Conium, Arnica, Staphysagria, Spongia y Aurum metall., además de los remedios ya mencionados. Puede hacerse uso de Acidum oxal., cuando los dolores neurálgicos son terribles en los cordones espermáticos, que se agravan por el más ligero movimiento y aun por pensar en ellos.

Ustilago y Hamamelis también producen dolores neurálgicos en el testículo.

Será necesario hacer uso de Mercurius, cuando la glándula está hinchada y cuando el escaso flujo restante es verdoso, y hay fimosis.

Pulsatilla es empleado en la hipertrofia de la próstata. Está indicado por el síntoma mecánico : "las evacuaciones cuando son expulsadas, son grandes y planas."

El hidrocele, especialmente de forma congénita, puede ceder por el uso de Pulsatilla.

Vamos a estudiar ahora a Pulsatilla en su acción sobre las membranas sinoviales. No tiene afinidad por las verdaderas serosas, como sucede en Aconitum y Bryonia, sino que obra sobre las bolsas sinoviales, que son ligeramente diferentes de las serosas clásicas. Se encuentra indicado Pulsatilla, en el reumatismo articular, en la gota, y en la sinovitis gonorreica y traumática. La articulación, naturalmente, está hinchada; los dolores son de un caracter agudo y punzante; van acompañados de una sensación de ulceración subcutánea, a nivel de la articulación afectada; los dolores son generalmente erráticos, presentádose en distintos lugares; son lacerantes y obligan al paciente a mover la parte enferma; mejoran por el presión; irradian hacia abajo, hasta la pierna; van acompañados de sacudidas, probablemente por la irritación de los nervios musculares, y se mejoran por el movimiento lento. Insisto sobre estos dolores, porque frecuentemente exigen el uso de Pulsatilla. Ordinariamente empeoran por el calor y se mejoran por el frío. Igualmente empeoran por la tarde.

Pulsatilla compite con Apis en la sinovitis, pero esta última droga produce mayor derrame que la primera y está indicado cuando hay un edema notable en la articulación.

Ledum y Lac caninum tienen dolores que empeoran por el calor moderado; en el primero, irradian hacia abajo y en el último, van de un miembro o otro, estacionándose donde se iniciaron.

En el reumatismo con dolores erráticos, puede compararse Pulsatilla con Kali bichromicum, Sulphur y Bryonia.

Kali bich. está indicado en el reumatismo gonocócico; los dolores mejoran en una habitación caliente.

Chamomilla produce dolores punzantes que van de un lugar a otro, son más intensos en las rodillas y en los maleolos, pero van acompañados de entumecimiento y de una sensación de debilidad.

El temperamento es totalmente diferente.

Por razón de su acción sobre el aparato digestivo, Pulsatilla llega a ser de valor en la gota o en la diátesis gotosa, especialmente cuando la molestia ha sido despertada por una indigestión. Si la enfermedad persiste a pesar su aplicación, Colchicum le sigue bien.

Consideremos ahora la acción de Pulsatilla sobre diversos órganos. Hemos estudiado ya sus síntomas mentales. Ahora hablaremos de las cefalalgias. Podemos resumir diciendo que son sobre todo frontales y supraorbitarias; generalmente de origen uterino, neurálgico, reumático o gástrico; se agravan por el trabajo mental o por el calor moderado; generalmente empeoran en la tarde, aunque los síntomas gástricos tienen su agravación por la mañana. Cuando son de origen reumático, los dolores son agudos y parecen irradiar de la cabeza a la cara, volviendo casi laco al enfermo, por su intensidad.

En otros casos pueden ser erráticos, saltando a distintas partes de la cabeza. En algunos, la cefalalgia va acompañada de supresión menstrual; la cabeza está caliente; el dolor mejora al aire libre y a menudo va acompañado de epistaxis.

En la cefalalgia, debe compararse Pulsatilla con los medicamentos siguientes :

Renunculus bulbosus cefalalgia sobre el vértice, como si la cabeza fuera a estallar; empeora por la tarde y por ir del aire frío al caliente o viceversa.

En Ranunculus sceleratus los dolores se localizan en el vértice en un pequeño punto, siendo roedores.

Cocculus indicus tiene dolor en el occipucio, como si se abriera y cerrara.

Spigelia producen sensación en la cabeza, de como si se estuviera abriendo en su vértice.

Carbo animalis, tiene sensación sobre el vértice de como si fuera a abrirse, viéndose obligado el enfermo a detenérsela.

Veratrum album, tiene presión en el vértice con dolor en el estómago; la cabeza mejora por la presión y se agrava por el movimiento.

Menyanthes produce cefalalgia compresiva en el vértice y sensación,

cuando sube escaleras, como si llevara un fardo sobre el cerebro; mejora por la presión y va acompañada de manos y pies fríos.

Phellandrium produce dolor como de pesantez sobre el vértice de la cabeza; dolor y ardor en las sienes y sobre los ojos, que que se encuentran congestionados; hay lacrimeo; no puede soportar ni la luz ni el ruido.

Los síntomas oculares de Pulsatilla y algunos del oído, ya han sido mencionados. Procederemos ahora con los síntomas restantes de los oídos. Pulsatilla ha sido reconocido por largo tiempo, como un medicamento para la otitis externa : los dolores son muy intensos, lo que es explicable por la naturaleza compacta del conducto, rodeado, como está de hueso. La parte exterior del oído está hinchada y roja; los dolores, generalmente empeoran por la noche. La inflamación puede terminar con otorrea, que será del carácter ya descrito.

Vamos ahora la acción de Pulsatilla sobre los órganos femeninos. Es aquí donde Pulsatilla ha conquistado muchos laureles. Lo encontramos indicado en las niñas, en la edad de la pubertad, cuando el flujo menstrual no se ha establecido con normalidad o no ha aparecido; es en este tiempo, precisamente, cuando pueden encontrarse dolores en los vértices pulmonares que indican a Pulsatilla y es exacto que, a menos que se corrija este síntoma y se establezca el flujo menstrual, nuestra enfermita se volverá tísica. Cuando la menstruación se ha establecido y es propensa a ser muy tardía y escasa; el flujo es de carácter caprichoso, unas veces aparece, otras se suspende; a veces está constituído por sangre obscura, coagulada otras, por agua casi incolora.

Va precedida de cólico menstrual; los dolores son de carácter calambroideo y cortantes y tan intensos, que la enferma difícilmente puede soportarlos. Casi se asfixia si la habitación está cerrada. Tiene el temperamento de Pulsatilla bien marcado. La amenorrea puede exigir el uso de Pulsatilla, cuando tiene lugar durante la época de actividad genital; cuando proviene por mojarse los pies y hay epistaxis vicariante, substituyendo a las reglas. En algunos de estos casos, una sola dosis hará aparecer el flujo menstrual; en tanto que en otros, estamos obligados a dar el medicamento repetidamente.

Durante el embarazo, puede encontrar aplicación Pulsatilla. En el adolorimiento uterino y de las paredes abdominales, puede ser necesaria, lo mismo que Hamamelis.

Puede aun corregir los vicios de posición fetal en el útero, si la causa no es mecánica. Sé que al hacer esta exposición me estoy metiendo en un terreno descutible. Yo no quiero decir que Pulsatilla removerá el feto, sino que Pulsatilla obrará sobre las paredes musculares uterinas, estimulando su desarrollo. Algunas veces el útero, durante el embarazo, se desarrolla más de un lado que del otro; de este modo, hay irregularidad en su desarrollo y el feto tendrá que tomar su posición conveniente.

Durante el trabajo del parto, está indicado cuando los dolores son lentos, débiles e ineficaces. Pueden aún encontrarse dolores

espasmódicos e irregulares, pudiendo producirse aún el desfallecimiento, como en Nux vómica. La enferma se siente como si se estuviera asfixiando y pide que le abran las ventanas.

Nuevamente podemos encontrar necesario a Pulsatilla después del parto, cuando la placenta permanece adherida. En estos casos, no solamente producirá el desprendimiento de la placenta, sino que tonificará el útero, evitado de este modo la hemorragia post-partum. Cantharis y Gossypium son también de utilidad en este estado.

Pulsatilla será muchas veces el medicamento adecuado en la simple retención de la placenta, aliándose con Sepia, Sabina, secale y Caulophyllum.

Pulsatilla puede también ser de utilidad en los dolores que siguen al alumbramiento, cuando está presente el temperamento de la droga. Estos dolores sin embargo, requieren más frecuentemente el uso de Chamomilla, Caulophyllum y Xanthoxylum. Los dos últimos medicamentos son útiles con particularidad.

Cuprum metall., es un buen remedio para los entuertos intensos, calambroides, en mujeres multíparas.

Puede también hacerse uso de Pulsatilla en los loquios escasos o suprimidos.

Con frecuencia estará indicado, como Hamamelis, en la flegmasia albadolens.

Las glándulas mamarias son afectadas por Pulsatilla, antes, durante y después del embarazo. Estará indicado, cuando la irritación mecánica, por ejemplo, cargar objetos debajo del brazo, excita el flujo de leche. Puede darse aún después del parto este remedio, cuando los senos están hinchados y doloridos y la leche es escasa o no existe, estando la enferma melancólica y llorosa. En conexión con esto, puede hecerse mención de varios medicamentos más importantes que Pulsatilla. Entiendo que Urtica urens es el mejor de todos, para la no aparición de la leche, sin otros síntomas, sin ninguna razón aparente que justifique la agalaccia.

Tenemos otro medicamento, Ricinus communis o aceite de castor. Este medicamento en aplicaciones locales, ha favorecido la aparición de la leche. Puede también ser de utilidad dado al interior en bajas diluciones.

Agnus castus es de utilidad en la agalaccia, cuando mentalmente está muy deprimida la enferma.

Causticum está indicado en las mujeres de diátesis reumática; la cara está generalmente de color cetrino y la enferma melancólica y deprimida.

Pulsatilla, en relación con las enfermedades propias de la mujer, tiene un gran número de medicamentos aliados. El primero de todos es Actea racemosa o Cimicífuga. Este medicamento se asemeja a Pulsatilla porque obra sobre el útero. Ambos favorecen el parto normal. En esto, Actea es probablemente superior. Se asemeja también a Pulsatilla en su acción durante el parto, estando indicado en los dolores intensos que producen sensación de angustia. De

cualquier modo, los síntomas no son intermitentes, sino más bien contínuos. En lo que se refiere al temperamento, encontraremos a Actea racemosa, diferente de Pulsatilla. Por ejemplo, está indicado en un grado extremado de nerviosidad durante el trabajo del parto y fuera de él cuando la mujer está en un estado horrible de aprehensión. Teme que le suceda alguna cosa que espera día tras día. Otras veces tiene temor de emprender algún quehacer, aun cuando se trata de una ocupación habitual. Actea racemosa está indicado en la desviación del útero, cuando hay dolores agudos, cortantes, a través del hipogastrio, de un lado a otro. Puede también emplearse en la neuralgia refleja originada por irritación uterina, ya sea que los nervios de la cabeza, del pecho o de los miembros sean los afectados.

Hay otro medicamento que debe ser comparado con Pulsatilla, es Caulophyllum. Es un remedio que usamos desde hace pocos años y ya es de tanta utilidad, que de ningún modo podremos pasarlo por alto. Su principal característica es la intermitencia de sus dolores. Si son neurálgicos y reflejos, procedentes de un desorden uterino, son de carácter intermitente. Son ordinariamente agudos y calambroideos, y aparecen en la vejiga, en las ingles y las extremidades inferiores. Durante el trabajo del parto. Caulophyllum está indicado cuando hay una extremada atonía uterina; los dolores pueden ser también más intensos que nunca y sin embargo no aparece el esfuerzo expulsivo. Está frecuentemente indicado en las mujeres nerviosas, en las que el dolor parece ser intolerable. Los dolores son espasmódicos y cambian de un lugar a otro; unas veces a las ingles, otras el abdomen, otras el pecho, pero no tienen la dirección de los dolores normales. La enferma parece debilitada. Hay gran debilitamiento en toda la economía; apenas puede hablar por momentos, como si su voz estuviera apagada. Estos son los síntomas que reclaman el uso de Caulophyllum. Ha sido usado en esto, por muchos médicos, a bajas dosis, aunque todas las diluciones pueden ser empleadas. Puede también estar indicado durante las últimas semanas del embarazo, cuando la enferma experimenta falsos dolores, que consisten en una sensación de pesantez dolorosa en el hipogastrio. Yo he visto que una sola dosis los ha corregido, cuando habían durado varias horas.

Voy a hablar ahora acerca de Helonias dioica del orden de la Liliáceas Se trata de un medicamento nuevo que se ha revelado como digno de tener su sitio al lado de la bien conocida Pulsatilla. Presta servicios en las mujeres cuyo sistema nervioso está deprimido, que se fatigan fácilmente por cualquier trabajo y se quejan de dolores en los riñones; un dolor de espalda con cansancio que parece extenderse a los miembros inferiores. Parecen dejarse sentir con más intensidad al comenzar cualquier trabajo. Esto no es el estado que produce Rhus toxicodendron. Esto no es ocasionado por la debilidad de las articulaciones rígidas, como sucede en este último medicamento. La razón que explica este síntoma, es que el desfallecimiento desaparce

al mismo tiempo que la enferma continúa sus trabajos. El dolor de espalda se sitúa generalmente en la región lumbar, justamente a nivel de los riñones, pudiendo aparecer más abajo afectando la región sacra. El dolor en uno u otro de estos sitios, puede ir acompañado de desarreglos uterinos. Puede también encontrarse que Hamamelis es de utilidad en la supresión de los menstruos (en esto tiene notable semejanza con Pulsatilla), cuando hay congestión renal. Parece como si esta congestión periódica, en vez de efectuarse, como debiera, en los vasos uterinos, se extendira a los riñones, dando origen a la albuminuria. La orina es escasa y turbia.

Nuevamente encontramos que Helonias está indicado después del parto cuando hay tendencia al prolapso o a otros defectos de posición uterina; la enferma se queja de pesantez y sensación de reptación en la región pélvica. Hay una sensibilidad que ha sido expresada "como una consciencia de la existencia del útero". Sabemos que no tenemos consciencia de nuestros órganos internos; se mueven y desempeñan sus respectivas funciones, sin ninguna sensación consciente de nuestra parte. Cuando nuestras sensaciones nos indican que tenemos estómago o hígado, es que estos órganos comienzan a estar enfermos. Acompañando a estos síntomas de prolapso y de sensibilidad uterina, existe la propensión a que los loquios tengan una duración muy prolongada, si es permitido usar de este término. Con exactitud se diría que hay un flujo sanguinolento, que continúa por muchas semanas después del parto. Puede recordar un caso que traté en uno de los inviernos pasados. Se trataba de una señora que dió a luz un niño muy grande; sufrió después de prolapso uterino; le di varios medicamentos sin que mejorara, por lo que después de tres meses, permanecía en el mismo estado. Después de este tiempo, comenzó a quejarse de presión toráxica, tos y algunos esputos sanguinolentos. Su madre había muerto de tuberculosis pulmonar, después de haber tenido unos gemelos; la señora también tenía una seria afección pulmonar. Phosphorus no dió resultado; Nux vóm., tampaco. Observé más detenidamente el caso; la paciente me dijo que sentía como si tuviera una carga pesada sobre el pecho a nivel del esternón y una sensación de como si el pecho hubiera sido comprimido por una prensa, con la molestia dolorosa consecutiva. Esto le incomodaba al despertar en la noche. Estos síntomas han sido anotados cuando Helonias se experimentó en los hombres; no obstante di este medicamento, habiendo curado completamente estos síntomas torácicos y el prolapso. En fin, bajo la acción de Hellonias nos encontraremos frecuentemente una tendencia a la inflamación de la vulva y la vagina con formación de pus. También puede hacerse uso de esta droga, en la ulceración del cuello uterino. Al mismo tiempo hay una leucorrea de mal olor y el más insignificante ejercicio tiende a producir un flujo sanguíneo. Con estos síntomas hay casi siempre comezón persistente en los genitales, con o sin formación de vasículas o úlceras. Durante el parto mismo, sabemos poco o nada acerca del valor de Helonias.

Un medicamento que se coloca al lado de Helonias, es Senecio aureus. Este medicamento produce inflamación en las membranas mucosas; de aquí que preste utilidad cuando hay tendencia al catarro nasal, faríngeo, laríngeo o pulmonar, particularmente en las mujeres. Con especialidad se acomoda a las mujeres nerviosas, excitables, . que sufren con frecuencia insomnios referibles a la irritación uterina, como prolapso o alguna flexión. La enferma tiene menstruación escasa y es propensa a llorar; hay tos seca y molesta con dolores torácicos punzantes y esputos con estrías de sangre. La vejiga participa de las afecciones uterinas; causa mucho dolor en el cuello provocando ardor y tenesmo. Después de iniciarse el flujo menstrual, los síntomas del tórax y la vejiga llegan a modificarse o a desaparecer, demostrando ento cuán íntimamente ligados están a la dismenorrea.

Otro medicamento es Aletris farinosa. En una de las más amargas substancias conocidas; en una aliada muy próxima de Senecio y Helonias. En lenguaje alopático, es un tónico. Es de utilidad especialmente en las mujeres, que, además de padecimientos uterinos y leucorrea, sufren una constipación extremada, necesitando de gran esfuerzo para efectuar una evacuación intestinal; hay gran acumulación de saliva espumosa. Aletris es también útil en la debilidad digestiva; el alimento daña al enfermo, produciéndole una especie de pesantez en el estómago.

Cyclamen es semejante a Pulsatilla; ambos se adaptan a las mujeres cloróticas y producen la misma molestia con indigestión e intolerancia a los alimentos grasos. Las irregularidades y anémícas y cólicos menstruales, son casi idénticos en los dos medicamentos; la misma especie de melancolía es común es ambos. Cyclamen puede ser distinguido de Pulsatilla por los siguientes síntomas. Generalmente, no siempre, tratándose de Cyclamen, el enfermo experimenta más sed; el paciente de pulsatilla se mejora al aire libre, el de Cyclamen no. Los enfermos de Cyclamen sufren una torpeza peculiar, tanto mental como corporal, acompañada de languidez; no pueden pensar; se sienten mejor cuando se levantan y son obligados a hacer ejercicio. Algo como sucede en Helonias; cuando se levantan por la mañana, se sienten tan pesados y lánguidos, que creen difícil desempeñará sus ocupaciones habituales, pero tan pronto como dan principio al trabajo, pueden tolerarlo muy bien hasta en la noche. Este es Cyclamen, por cierto muy semejante a Helonias. Los enfermos sufren también de una depresión sensorial, con fluctuación ante los ojos, se encontrará muy a menudo esto en las mujeres anémicas; van variados colores ante los ojos, como en Santonina, Conium, Kali bich, etc; algunas veces padecen hemiopía; la indigestión que les afecta, tiene lo siguiente como característico : formación de gases que producen cólicos en la noche, obligando al enfermo a levantarse y caminar hasta que el gas es expulsado, experimentando de este modo mejoría.

Réstame hablar todavía de Hydrastis canadensis. En un

medicamento que obra más poderosamente sobre las membranas mucosas que Pulsatilla. Produce catarro en la mucosa nasal, gástrica, intestinal, vesical, uterina y vaginal; el flujo, de cualquier modo, es más acre que bajo la acción de Pulsatilla y de apariencia, gruesa, amarilla o sanguinolenta. En las afecciones uterinas, Hydrastis está indicado en el prolapso con ulceración del cuello. La leucorrea es a veces aguada, otras gruesa, amarillenta y excoriante; este estado va asociado a una débil sensación de vacío en el epigástrio y palpitación cardiaca bien marcada. La lengua está húmeda y cubierta de una capa de color amarillo-sucio, con las impresiones dentarias marcadas. La cara está hinchada, los ojos, hundidos y rodeados de círculos obscuros. Hay propensión a la constipación intestinal, siendo los evacuaciones cubiertas o mezcladas con moco.

Por último, puede hacerse mención de Lilium tigrinum que presta ayuda en los padecimientos uterinos, cuando hay dolores agudos que atraviesan al abdomen de ilio a ilio; además de esto, hay dolores de pesantez notables, que obligan a la enferma a cruzar las piernas. Coloca la mano sobre la vulva para soportar las vísceras.

Pulsatilla está indicado en la fiebre con los siguientes síntomas: la cabeza está ardiente y los labios secos; lame la enferma constantemente sus labios para humedecerlos, sin sed; Puede también hacerse uso de este medicamento, en la fiebre intermitente, sobre todo, después del abuso de la quinina, cuando la sed aparece entre dos y tres de la tarde; el escalofrío se presenta sin sed; hay ansiedad y opresión debida a la congestión venosa del tórax; la enferma está somnolienta, no pudiendo dormir a pesar de esto. Algunas veces una mano está caliente y la otra fría.

Pulsatilla obra sobre la laringe produciendo ronquera que aparece y desaparece de un modo caprichoso. Esta ronquera frecuentemente merece el término de "resfrío" y Pulsatilla puede evitar que llegue a hacerse crónico. También cura la ronquera puramente nerviosa que aparece después de cada emoción.

Nuevamente encontramos en el tórax síntomas de naturaleza catarral. Bronquitis con expectoración gruesa y amarillenta; tos seca, con cosquilleo e irritación de la tráquea: empeora por la tarde y al acostarse; por exponerse al aire seco, produciendo una sensación de aspereza y raspadura, ocasionalmente hay disnea o constricción del pecho.

Debo advertir que no hay que hacer uso de Pulsatilla, a menos que se esté seguro de que todos los síntomas del caso lo indican. Frecuentemente la tos se recrudece, más bien que mejorarse; la expectoración sanguinolenta ya se ha mencionado; esta puede ser vicariante o manifestación de una consunción incipiente; en el último caso, puede haber una irritación torácica más acentuada por debajo de las clavículas; ardor en el pecho especialmente en la región precordial; dolor punzante en los costados.

Pulsatilla nuttaliana produce dolores agudos bajo la axila, cerea del dorso.

En la tos seca, nocturna, compárece con Hyosciamus, Conium, Actea racemosa. Laurocerasus, Bryonia, etc.

Pulsatilla está indicado en el sarampión. pero creo que con frecuencia se da equivocadamente. Está indicado cuando los síntomas catarrales son prominentes; hay coriza, lacrimeo profuso: la tos generalmente es seca en la noche y blanda en el día; el niño se sienta para toser. Puede también ser de utilidad en la otalgia. No está indicada Pulsatilla en el comienzo, cuando la temperatura es elevada; sería necesario empezar con Aconitum y Gelsemiun; la erupción puede brotar con todo su desarrollo o puede tener un aspecto obscuro.

Kali bich. debe ser empleado cuando en lugar de un simple catarro ocular, se forman pústulas en la córnea; la garganta está hinchada y los dolores irradian de ahí a los oídos; las glándulas salivales están inflamadas y hay sordera catarral.

En la neuralgia, Pulsatilla está indicado cuando los dolores son calambroides, erráticos y paroxísticos, volviéndose más y más insoportables.

La irritación espinal es también una indicación de Pulsatilla. El cuello y a veces todo el cuerpo se siente tan rígido como una tabla. En la parte inferior del dorso se siente como si estuviera fuertemente vendado. Hay dolores en la región sacra, que empeoran por sentarse o por doblarse hacía atrás. Las articulaciones están débiles, sintiéndose como si fueran a dislocarse. El descanso mejora todos estos síntomas, de aquí que enfermo se siente mejor después de dormir. En el dolor de espalda que empeora por sentarse, podemos pensar en Zincum, Cobalt, Sepia, Cannabis indica, Agaricus, Berberis, Rhus tox., Valeriana, etc.

Los síntomas del sueño en Pulsatilla, son muy caractrísticos. El sueño es inquieto, con despertar frecuente, sueños molestos; al despertar el enfermo, está embotado e indiferente.

En los síntomas del sueño, Pulsatilla y Nux vómica difieren considerablemente; mientras que en Pulsatilla está bien despierto por la tarde y lleno de ideas, en Nux vóm., sucede lo contrario. En Nux vóm., el enfermo despierta entre tres y cuatro de la mañana sintiéndose fatigodo; vuelve a dormir después y despierta a la hora de costumbre sintiéndose peor.

Cocculus tiene insomnio por actividad mental. El dolor de corazón, nauseoso aparece por la más ligera privación del sueño.

En Sulphur "el más ligero ruido de la noche despierta al enfermo."

Dd rubiaceas

Este orden comprende las siguientes drogas: Cinchona, Ipeca, Coffea, Rubia tinctoria, Galium, Mitchella y Gambier.

Señores: Hoy consideramos un grupo de plantas del cual se derivan tres medicamentos de mucho valor: China, Ipecacuanha y Coffea. Este órden también nos proporciona a Gambier (medicamento no

usado en nuestra Materia Médica) y a Mitchella, además de varios otros, como los famosos Madder y Galium.

El nombre de este orden, deriva de que todas sus tinturas tienen un color rojo.

La primera de todas es Cinchona, frecuentemente, aunque con impropiedad, llamada China en nuestra nomenclatura. Procederemos ahora a su estudio,

Cinchona rubra tiene relación con Ipeca, Arsenicum, Ferrum metallicum, Veratrum album y carbo veg.

Con Phosphoricum acidum, Phosphorus, Rhus tox., Bryonia y Pulsatilla.

En la fiebre intermitente, tiene concordancia con: Nux vóm., Podophyllum, Eupatorium perf., Natrum mur., Chininum sulph., Aranea diad., Lachesis, cornus florida y Eucaliptus.

Sus antídotos son: Pulsatilla, Arsenicum, Ipecacuanha y Veratrum album. Sus antagónicos son: Selenium y Digitalis.

Cinchona obra en la pérdida de fluídos vitales, en la anemia, en los malos efectos de las enfermedades repentinas y agudas, en las hemorragias, en las fiebres malárica, intermitente y héctica, sobre los órganos digestivos, en el reumatismo y en las neuralgías.

Cinchona es ciertamente una droga maravillosa, maravillosa por la variendad de sus especies, maravillosa en su composición y maravillosa en sus efectos. También tiene un valor histórico para los homeópatas, ya que este medicamento indujo a Hahnemann al descubrimiento de nuestra Ley terapéutica y le permitió fundamentár la Homeópatía como una ciencia fija. No es poco singular que los indígnas del Perú sobre todo en los primeros tiempos, no permitieran que se tocara el árbol de la Cinchona, a la vez que lo consideraban como venenoso, y cuidado por dioses especiales. Por lo tanto se sorprendieron grandemente cuando los europeos llegaron a ocuparse en el trabajo de quitar la corteza a los árboles a fin de enviarla al viejo mundo. La industria de la Cinchona ha alcanzado ahora tan enorme extensión, que se han impuesto ciertas restricciones en su recolección y exportación a fin de que la especie no se extinga. Ahora los árboles se replantan continuamente conjurándose de este modo el peligro del exterminio de la especie.

Hay varias especies de corteza de Cinchona, de las que mencionaré solamente tres: la corteza pálida, la Calisaya o corteza amarilla y finalmente la corteza roja o Cinchona rubra; hay además otras treinta o cuarenta especies conocidas.

Un médico del Oeste, cuyo valor de sus experimentos me inclino a dudar, pretende haber descubierto en Cinchona rubra, cierto específico contra la intemperancia o el hábito de los licores. Da la corteza en dosis ponderables y asegura que en un tiempo, que varia de una a cuatro semanas, curará al vicios más inveterado de su pernicioso deseo.

Al publicar el resultado de sus observaciones en las revistas, dijo que

había sido conducido a este descubrimiento al tratar a un viejo libertino, a quien jamás había conocido un solo día en su juicio, hasta el momento en que se le presentaron escalofríos y fiebre, que fueron curados por la corteza roja.

Cinchona contiene una cantidad de alcaloides o de principios activos relacionados íntimamente a su composición química: muchos de ellos son isómeros y van asociados a varios ácidos orgánicos peculiares del grupo.

Los alcaloides más importantes de Cinchona son estos: Chinchonina, Cinchonidina, Quinina, Quinidina, Quinamina, Acido quínico, Acido cincho-tánico, Acido quinóvico y varios otros.

Réstanos ahora estudiar los efectos generales de la droga antes de proceder a la consideración de su sintomatología.

Obra como antiséptico destruyendo las bacterias e infusorios; destruirá también las toxinas en muchas enfermedades contagiosas, como la fiebre puerperal. la escarlatina. etc. Puede hacerse uso de esta propiedad para cepillarse el pelo y lavarse las manos con una solución de quinina al atender enfermos contagiosos. evitando así todo peligro, no resultando esto molesto y sí, por el contrario, favoreciendo el crecímientp de pelo.

La Quinina y sus sales cuando son aplicadas en una superficie cruenta o en una mucosa, obran francamente como irritantes.

También tiene la Quinina una acción tóxica sobre el protoplasma, muy activa; destruye el movimiento amiboideo, que como se sabe, es característico de los leucocitos. Esta es una razón por la que los médicos alópatas la han empleado para prevenir la inflamación. La Quinina retarda también los cambios en los tejidos, siendo esto una explicación de su efecto tónico. Veremos que esta propiedad de retardar la destrucción, es todavía más marcada en Coffea.

La Quinina también obra sobre el tejido cardiaco debilitándolo, disminuyendo de este modo la circulación. Otro efecto de la Quinina; cuando se emplea en inyecciones subcutáneas en cantidades notables, es disminuir el poder oxigenador de la sangre. Este es un efecto al que los médicos alópatas atribuyen el poder de reducir la temperatura en las enfermedades febriles. Esta propiedad parece desarrollarse principalmente por su acción directa sobre los centros productores del calor.

También tiende a obrar sobre el bazo, produciendo congestión, inflamación y aumento de volumen de esta viscera.

La Quinina tiene además otra propiedad que es bueno recordar y es su poder de abolir los reflejos, siendo tomada en grandes cantidades.

Permítaseme ahora dar los síntomas del cinconismo, esto es, las manifestaciones que suceden al empleo abusivo de la Quinina. Marcadamente se encontrará entre estos síntomas, un notable aumento del apetito, como resultado de estimular la digestión ; pronto la náusea y el vómito aparecen y aún la diarrea se presenta como consecuencia de las perturbaciones gástricas. Entonces la cabeza llega a afectarse; hay una peculiar sensibilidad a las

impresiones externas, a los ruidos, a la luz brillante o cualquier fenómeno capaz de producir irritabilidad al paciente. Se presenta una forma especial de cefalalgia que se caracteriza por un dolor sordo y otras veces por latidos en la cabeza. Hay sonidos rugientes o de campanilleo en los oídos, efecto caracteístico de Cinchona. Más adelante, el vértigo complica el caso y si el abuso de la droga continúa se presenta la sordera. En estos casos se trata de una especie de intoxicación por la Cinchona, que no difiere de la producida por el alcohol. Esta es seguida de delirio, pupilas dilatadas; después completo estupor con respiración difícil y finalmente convulsiones producidas por la anemia de los centros nerviosos y no por la congestión, como en el caso de Belladonna. En los casos extremados, el Colapso y la muerte se presentan, debido a la parálisis cardiaca, dando fin a la vida del paciente.

Estos son también los efectos generales de Cinchona, cuando la droga es dada en dosis progresivas y a pequeños intervalos. Puede variar en intensidad desde un simple tintineo, hasta el cuadro de envenenamiento completo.

Hahnemann nos ha enseñado que Cinchona es útil solamente cuando la debilidad o la anemia provienen de la pérdida de fluídos. En la escuela alopática se usa en todas las formas de debilidad; dada, ya sola, o en combinación con el hierro ya vino jérez. Pero como he dicho antes, hemos aprendido de Hahnemann que es de utilidad solamente en la anemia que resulta de la pérdida de fluidos, de aquí que puede usarse para las consecuencias de una hemorragia, ya sea que esta provenga de la boca, de los pulmones o del útero. Podemos emplearla cuando una diarrea persistente ha agotado al enfermo. Puede ser empleado cuando el estado llega a más lejos que una simple debilidad, y que se ha presentado la hidropesía.

En tales casos, cuando Cinchona es el medicamento, el niño presenta los siguientes síntomas: después del cólera infantil violento, que ha tenido larga duración, llega a ponerse somnoliento; las pupilas pueden estar dilatadas; la respiración es muy rápida y superficial; la diarrea puede haber cesado o las evacuaciones ser involuntarias; la superficie del cuerpo está más bien fría. especialmnte los puntos salientes de la cara, las orejas, la nariz, la barba. Justamente en casos como este, Cinchona volverá la salud al paciente si aún resta alguna vitalidad.

Si falla, puede recurrirse a Calcarea phosphorica, medicamento semejante, pero de acción más profunda.

Al aplicar Cinchona en estados de debilidad resultantes de los excesos sexuales, recuérdese que es solamente curativa, en la debilidad consecutiva a la excesiva pérdida de semen. Si hay desarreglos constitucionales, no solamente no sirve, sino que es perjudicial.

Vamos a detenernos a estudiar la relación que China tiene con otros medicamentos aplicables a la debilidad y estados anémicos.

Ferrum está indicado en la anemia esencial, con apariencia de

plétora.
Arsenicum es el medicamento para la debilidad que resulta de un trabajo exagerado de los músculos, como el que sigue al prolongado trabajo, a la ascensión a las montañas, etc.

Phosphorus está indicado de preferencia en la postración que se presenta de un modo repentino, cuando el sistema nervioso está agotado. De aquí que podamos hacer uso de esta droga en una variedad de enfermedades; en la escarlatina, sarampión, difteria, y de hecho en cualquiera enfermedad en la que el sistema nervioso parezca haber sufrido un repentino golpe. Recuérdese que este no es el caso de Cinchona.
Phosphoricum acidum es algo diferente de Phosphorus. Se debe pensar en él en la debilidad de origen nervioso, cuando no está relacionada con algún dolor; excepto quizá un simple ardor en la espina o en los miembros. La mente está más bien apática y el enfermo es propenso a amodorrarse y a la somnolenica. La característica de esta somnolencia es que el paciente con facilidad vuelve en sí y despierta.
Zincum es de utilidad cuando el cerebro llega a estar afectado en el curso de las enfermedades nerviosas, en la escarlatina, en los padecimientos gastrointestinales del verano, en los niños. Es útil con especialidad en la escarlatina, cuando el niño carece de la fuerza suficiente para desarrollar su erupción.
Puede emplearse Cinchona para las hemorragias, y aquí difícilmente podemos actuar sin este medicamento; la hemorragia puede presentarse por un orificio natural cualquiera del cuerpo; la sangre tiende a ser obscura y coagulada; el flujo es tan profuso, que amenaza dejar exangüe al enfermo; hay frialdad de la cara, y de hecho en todo el cuerpo; las facciones revelan el aspecto de colapso; la respiración es difícil y desea el enfermo ser abanicado; esto no es por refrescarse, sino por la necesidad instintiva de tener más oxigeno, que el abanicamiento produce removiendo las capas de aire viciado. Cinchona está indicado frecuentemente en las hemorragias antes del parto y después de él; en tales casos, no debe darse una sola dósis, sino repetidamente y a cortos intervalos, hasta que las consecuencias de la hemorragia hayan desaparecido.
Hay otro estado en el que deseo recomendar el uso de Cinchona, y es cuando habiendo retención placentaria acompañada de hemorragia Pulsatilla no ha dado resultado. Sé bien que se recomienda en estos casos la intervención manual para extraer la placenta, pero mi práctica ha sido administrar Cinchona hasta que el útero ha recobrado su tonicidad, extrayendo entonces la placenta. El medicamento más cercano a Cinchona en estos síntomas es Ipecacuanha, que presta utilidad cuando hay un flujo sanguíneo rojo y brillante, profuso, generalemente acompañado de náuseas y algunas veces de respiración difícil y trabajosa. Se experimenta escalofrío en la piel, que está cubierta de sudor frío. Es uno de

nuestros mejores medicamentos en la hemoptisis de la tuberculosis incipiente. Belladonna es de utilidad cuando la hemorragia es de sangre brillante, que se coagula con rapidez, produciendo calor en las regiones que toca.

Trillium controla la hemorragia cuando el flujo es ya rojo encendido u obscuro y tiene lugar en las mujeres después de cada parto.

Millefolium se adapta al flujo profuso, rojo encendido, no acompañado de dolor; muy parecido a Aconitum, pero carente de la inquietud, ansiedad y fiebre de este remedio; también en la hemorragia continua después de un golpe, puede usarse Millefolium.

Se hace uso de Sabina, cuando el flujo es rojo-encendido, con coágulos y que empeora por cualquier movimiento. La hemorragia va acompañada de un dolor que se extiende del pubis al sacro y de dolores en las piernas.

Carbo vegetabilis se aplica cuando la hemorragia es obscura, continua (pasiva). La enferma desea ser abanicada. La piel esta fría y azulosa y el pulso rápido y débil.

Se dice que Secale responde sobre todo en las mujeres delgadas, huesosas; el flujo sanguíneo es pasivo; va acompañado de hormigueo en los miembros, aunque la superficie del cuerpo está fría, la enferma experimenta con persistencia un deseo de desabrigarse.

Se dice de Erigeron que es útil en la hemorragía profusa, semejante a la de Sabina, pero asociada a una irritación de la vejiga y el recto.

Hamamelis está indicado en las hemorragias venosas, especialmente cuando el orificio de donde procede el flujo sanguíneo, está sensible y magullado.

Acalypha indica, es útil en la hemoptisis después de un ataque de tos seca.

Cinnamomum produce hemorragia profusa por una torcedura o un paso en falso.

Cyclamen también produce hemorragia profusa, con vértigo y obscurecimiento de la vista, como si hubiera neblina. Esto es diferente del síncope natural que resulta de la hemorragia excesiva y repentina; puede seguir a una pérdida ligera de sangre en las mujeres de constitución delgada con debilidad cerebroespinal.

Debe compararse también a Cinchona con Ledum, Vinca minor y Phosphorus, si la hemorragia es producida por un pólipo uterino.

Cuando se ha presentado la reacción después de la hemorragia, puede darse todavía Cinchona, si hay cefalalgia con latidos violentos de las carótidas. Esto no es lo mismo que sucede en Belladonna; aquí se trata de una indicación de anemia, en tanto que en Belladonna este síntoma es de hiperemia.

Es una característica general de Cinchona producir eretismo nervioso con síntomas de debilitamiento. Este hecho se aproxima más a Arsenicum, que al entorpecimiento de Carbo veget. La mente está exageradamente activa aun cuando carente de resistencia. Las ideas vienen en profusión desordenada, impidiendo el sueño. Al cerrar los ojos, ve personas y figuras. La superficie del cuerpo es muy sensible

al tacto. Esta susceptibilidad es más imaginaria que real. Si el paciente tiene un ligero dolor, le parece insoportable y teme hasta el intento de que se le aproximen por miedo a que lo toquen; sin embargo, la presión enérgica o el frotamiento, le producen mejoría. Arnica tiene un síntoma semejante en la gota; Spigelia una verdadera sensibilidad en toda la superficie, el menor tacto le produce un choque repentino en todo el cuerpo. En China sin embargo, una presión enérgica o el frotamiento, le producen alivio. Muestra una sensibilidad semejante por las corrientes de aire, que le agrava siempre. Estas manifestaciones son propias de los dolores neurálgicos y algunos otros.

Se tendrá que hacer uso de Cinchona para curar la astenopía, pero solamente cuando sobreviene como resultado de una hemorragia o por la pérdida de cualquier fluído. Un exámen con el oftalmoscopio, revela la papila pálida y anemiada. Las pupilas son propensas a dilatarse; los globos oculares duelen al intentar moverlos, lo mismo que al leer o escribir y los objectos aparecen borrosos. Vamos ahora a estudiar la acción de Cinchona sobre el aparato digestivo. Es muy útil en la dispepsia que tiene lugar especialmente después de la pérdida de fluidos. La digestión es tan débil que el enfermo no puede tolerar absolutamente ningún alimento. Si cena más trade que de costumbre, es seguro que sufrirá como consecuencia de esto. El estómago está dilatado por los gases; el eructo no mejora, o si lo hace, es momentáneamente. La más pequeña cantidad de alimento que tome, aumenta la distensión; de tal manera que se siente tan lleno después de haber tomado una insignificancia de alimentos, como si hubiera tomado una enorme cantidad. Se queja frecuentemente después de comer, de una sensación de como si tuviera una bola detrás del esternón, como si los alimentos ahí se detuvieran. Esta sensación se experimenta en un sitio más alto que la que produce Abies nigra, del "huevo duro, hervido". Pulsatilla tiene la misma sensación en el mismo sitio. Este estado de cosas, cuando Cinchona es el remedio indicado, con frecuencia es el resultado de la pérdida de fluídos, de beber té con exceso, cerveza o tomar frutas, etc. El apetito frecuntemente es voraz, cuando no caprichoso; hay sed de agua fría bebe poco y a menudo; desea cosas ácidas, aguardiente, confituras; hay zumbidos de oídos.

Aconitum produce ansiedad mejorada por el agua muy fría. o el hielo. Veratrum album, deseo de agua fría, helada. Los siguientes medicamentos también producen deseo de agua helada: Pulsatilla, Plumbum, Scilla.

Cinchona es un excelente medicamento en los trastornos gástricos infantiles, cuando el niño está constantemente pidiendo golosinas, rehusando los alimentos que debe tomar. Al despertar por la mañana, están malhumorados e irritables; tienen mal sabor de la boca y la lengua está cubierta de una capa blanca.

Cinchona es de utilidad en algunas afecciones intestinales, especialmente cuando van asociadas a marcado timpanismo. El

abdomen está enormemente dilatado; al percutirlo, se produce un sonido como ruido de tambor. Esta indicado con más especialidad, cuando este timpanismo se presenta al comienzo de la enfermedad; entonces Cinchona será el remedio Este síntoma es revelador de una debilidad prematura; más tarde, en el curso de la enfermedad, cuando es el resultado de una descomposición, Cinchona es menos útil; será necesario recurrir entonces a otros remedios, tales como Terebinthina, Colchicum, etc.

La diarrea de Cinchona es muy caracteréstica; las evacuaciones son de carácter lientérico; el enfermo empeora en la noche y después de comer; va acompañada de depresión rápida con postración. Las evacuaciones pueden ser de apariencia amarilla, aguadas, cafés y muy mal olientes. Cinchona es uno de nuestros mejores medicamentos para la diarrea cuando se presenta por la temperatura cálida, después de comer frutas.

Los aliados más cercanos a esta droga, son Ferrum metallicum, Arsenicum album, Phosphoricum acid. Oleander, Iris versicolor y Podophyllum.

Arsenicum y Ferrum, producen diarrea profusa y lientérica, frecuentemente durante o después de la comida.

Phosphoricum acid. difiere de Cinchona, en que mientras las evacuaciones son frecuentes y copiosas, no van acompañadas de mucha debilidad.

Iris versicolor está indicado en la diarrea de verano; las evacuaciones son copiosas y van acompañadas de vómito; el paciente empeora entre dos o tres de la mañana; difiere de Veratrum album en la ausencia de frialdad.

Podophyllum debe ser empleado en la diarrea profusa que aparece en la mañana; con más frecuencia durante el día que por la noche; las evacuaciones pueden contener alimentos no digeridos y frecuentemente en los niños, depositan un sedimento farinoso.

La diarrea de Oleander es también lientérica; el paciente arroja en las evacuaciones, alimentos que ha tomado la víspera.

Cinchona, como se sabe, es un medicamento valioso en el tratamiento de "los fríos"es de utilidad en las fiebres de tipo terciano o cuartano; el escalofrío no va acompañado de sed; pero se presenta antes o después de este. Durante el escalofrío el enfermo se acerca lo más posible al fuego o se arropa muy bien a fin de calentarse; pero el calor así obtenido, no produce ningún alivio. El escalofrío es seguido de un calor de larga duración, durante el cual el enfermo desea descubrirse; generalmente entonces está sin sed; su cara roja, y a menudo está delirante. El sudor que sigue es profuso y debilitante, con sed intensa. El período apirético, no está de ningún modo libre de síntomas; la cara está de un color amarillo manchado, por las complicaciones biliares; el bazo está aumentado de volúmen; hay una sensación dolorosa en la región esplénica y una pérdida total del apetito o bien hambre canina. Los pies llegan a ponerse edematosos con frecuencia, por la alteración de la composición sanguínea, pero

sobre todo por los desarreglos de la circulación hepática o esplénica. El sueño está notablemente perturbado y el paciente tan pronto como cierra los ojos, ve visiones.

El Sulfato de quinina tiene estos mismos síntomas, presentándose además el escalofrío con la regularidad de un cronómetro, generalmente a las tres de la tarde; las uñas se ponen azules y hay dolor en las vértebras dorsales. Pero ambos medicamentos pueden estar indicados en un tipo de fiebre que cada vez se adelanta en su aparición. El período de calor va acompañado de sed intensa y cara roja; le lengua está amarilla en el centro, y en sus bordes pálida. Gradualmente se presenta el sudor, que produce mejoría. El enfermo se encuentra muy débil entre uno y otro acceso. Se ha abusado tanto de la Cinchona y sus preparaciones en el tratamiento de la fiebre intermitente, que es necesario diferenciarla cuidadosamente de sus remedios concordantes.

El primero que hay que mencionar, es Cornus florida; éste produce somnolencia mucho tiempo antes del escalofrío; el enfermo experimenta una sensación de escalofrío, pero al tacto está caliente. La temperatura va acompañada de somnolencia y seguida de un sudor profuso.

Menyanthes resulta excelente cuando el escalofrío predomina, acompañado de una frialdad helada en las extremidades de los dedos; todas las partes periféricas del cuerpo están frías.

En Capsicum el escalofrío comienza por la espalda, acompañado de sed; el enfermo se siente mejor por las aplicaciones calientes en la espalda por abrigarse; justamente como sucede en Ignatia.

Eupatorium perfoliatum es de utilidad cuando el escalofrío se presenta en la mañana, o en la mañana en un día y en la trade al día siguiente; pero ordinariamente se presenta a las nueve de la mañana. El escalofrío es frecuentemente precedido de sed y vómitos amargos; al tomar agua, experimenta el enfermo una sensación de escalofrío. La temperatura generalmente va seguida de muy ligero sudor.

Puede hacerse uso de Lachesis después del abuso de la Quinina, cuando los accesos se presentan en la primavera.

Canchalagua está indicado en la fiebre intermitente de la primavera, precedida de escalofrío intenso; la piel de las manos está arrugada, como si se hubiera mantenido mucho tiempo en el agua.

Eucaliptus es un medicamento que ha sido altamente recomendado en la fiebre de orígen malárico, pero debo decir que se poco o nada acerca de él.

Ipecacuanha presta utilidad en la fiebre intermitente, cuando se ha vuelto atípica por el uso de la Quinina. No se puede obtener un cuadro claramente definido del caso; todo es confuso. Ipecacuanha parece tener la propiedad de desarollar los síntomas y curar el caso, o de proporcionarnos suifcientes datos que nos capaciten para seleccionar el medicamento indicado. El síntoma característico de Ipecacuanha durante el paroxismo, es el escalofrío corto seguido de

un período largo de fiebre. Generalmente nos encontramos síntomas gástricos, preponderando la náusea.

También se debe pensar en Sepia, en los casos vueltos atípicos por la Quinina o por la administración poco juiciosa de remedios homeopáticos.

Otro medicamento que puede ser utilizado para curar los malos efectos de la Quinina, es Arsenicum album; está indicado cuando los paroxismos tienen lugar con más o menos periodicidad; la sed es notable. El bazo está hipertrofiado; los síntomas hidrópicos aparecen; hay paroxismos neurálgicos en la cara, que se presentan con regularidad. Arsenicum puede estar indicado casi siempre, cuando una enfermedad cualquiera toma tipo malárico. En estos casos nos encontraremos que los remedios ordinarios no son de ninguna utilidad, cualesquira que ellos sean.

Todavía disponemos de otro medicamento en los casos graves y es de Carbo vegetabilis. Este nos presta servicios especialmente después del abuso de la Quinina, cuando hay sed durante el escalofrío; cuando el cuerpo está frío, helado, se nota especialmente esta frialdad de las rodillas para abajo; está también indicado cuando falta la reacción. Nos sorprenderemos al ver con qué exactitud, un caso aparentemente desesperado, cura con uno u otro de estos remedios.

Hay una constitución desarrollada por los miasmas de los pantanos, para la cual es necesario emplear remedios que tengan una acción profunda. El primero entre estos, es Aranea diadema. Este medicamento se adapta a las personas que no tienen un tipo claro de fiebre, pero que sufren en cada cambio de tiempo frío o húmedo. Los síntomas parecen estar mal definidos. Los enfermos unas veces se sienten dispépticos; otras veces, están adoloridos de todo el cuerpo; pero en todos los casos, la tara constitucional es la causa original de estas molestias. Aranea diadema cambiará de tal manera el tipo de la constitución, que el enfermo escapará a todas estos trastornos a pesar de exponerse a la humedad. Malaria officinalis puede ser también empleado en este estado.

En algunos casos se tendrá que hacer uso de Ferrum metallicum como antídoto de la Quinina, especialmente cuando sobreviene la anemia disfrazada peculiar de este medicamento. La cara fácilmente se sonroja y los vasos sanguíneos laten. El bazo está aumentado de volúmen y los síntomas hidrópicos, se manifiestan con particularidad en los pies.

Cinchona, para seguir refiriéndonos a este, medicamento es también de utilidad esencial en el tratamiento de los tipos de fiebre héctica, tales como los que produce un estado supurativo de larga duración. El cirujano es llamado a actuar muy frecuentemente, cuando después de la abertura del abceso, los síntomas de la fiebre héctica se desarrollan. Las mejillas están rojas; el enfermo excesivamente nervioso; La irritabilidad nerviosa está en completa desproporción con las energías del paciente. Está el enfermo tan postrado por la fiebre, que le es difícil levantar la cabeza se agrega la diarrea a su

debilitamiento; abundantes sudores nocturnos también le debilitan. A lado de Cinchona en este estado de cosas, deberemos pensar en sus análogos, sobre todo en Arsenicum y Carbo vegetabilis. Nos encontraremos con frecuencia con un caso grave en el que Cinchona detiene el curso y no produce ya más mejoría. Entonces, deberemos elegir entre Arsenicum y Carbo vegetabilis.

Carbo vegetabilis, al igual que Cinchona, debe ser recordado como medicamento para impedir el colapso que sigue a la abertura de un absceso frío, como sucede en la caries vertebral. Los síntomas de los dos medicamentos son casi idénticos y su elección puede ser difícil si no encontramos otros síntomas que los individualicen.

Psorinum, como Cinchona, presta utilidad en ciertos casos de sudores nocturnos; está indicado cuando los sudores profusos sobrevienen después de una enfermedad aguda, como la fiebre tifoidea, etc. El enfermo está muy desalentado, sin esperanza de curación; está postrado, con temblor de manos y debilidad del dorso y las articulaciones. Sulphur, se le parece mucho.

Hay otra forma de supuración en la que podemos hacer uso de Cinchona, es la supuración pulmonar, particularmente en los bebedores, cuando la afección va acompañada de fiebre héctica.

Podemos también recurrir al empleo de Cinchona en los estados de desorganización, ya sea de los tejidos exteriores o del parenquima pulmonar; en este último caso, está indicado por los síntomas hécticos y por la fetidez del aliento. En esto, Cinchona rivaliza con Arsenicum, Secale y Lachesis.

No se debe confundir la respiración fétida que se acaba de mencionar, con la que se presenta en ciertas formas de bronquitis en las que la expectoración es largo tiempo retenida y comienza a descomponerse en los bronquios; hay tiempos en que el enfermo respira tranquilamente y no se nota ningún olor extraordinario; cuando tose fuerte, el aliento se vuelve horriblemente fétido. Esta variedad de tos exige el uso de Capsicum, que quizá pueda seguir en importancia Sanguinaria candensis.

Nos encontraremos a Cinchona frecuentemente indicado en el reumatismo inflamatorio, no en el principio de la enfermedad, sino más tarde, cuando la fiebre toma un carácter intermitente. Las articulaciones están aun hinchadas. Los dolores característicos en estos, casos, son punzantes y presivos; el enfermo no nos permitirá acercarnos, gritando de dolor si le tocamos las partes afectadas; tal es de exquisita la sensibilidad superficial; Chininum sulph., es útil en estados parecidos.

Cinchona es también un medicamento neurálgico. Responde con especialidad cuando se trata del nervio infraorbitario de cualquier lado, cuando los síntomas son típicos en su aparición y cuando el más ligero tacto o corriente de aire frío, produce agravación. Si la neuralgia es de orígen malárico, Cinchona estará indicado con mayor razón.

En esto podemos compararlo con Cedrón que es aplicable a la

neuralgia de origen malárico, ordinariamente supraorbitaria, cuando los accesos se presentan con regularidad cronológica.

En la ictericia debemos hacer uso de Cinchona cuando la superficie del cuerpo y la esclerótica están amarillentas. El hígado está inflamado y sensible al tacto; hay una sensación como de ulceración subcutána en el hipocondrio derecho; las evacuaciones son blanquizcas y van acompañadas de gases fétidos, o bien puede haber diarrea. Está indicado especialmente en la ictericia que proviene por excesos sexuales por la pérdida de fluídos humorales por el abuso del alcohol y por el catarro gastro-duodenal.

Los antídotos de Cinchona son: Arsenicum, Ipecacuanha, Carbo vegetabilis, Lachesis, Pulsatilla, Ferrum y Veratrum album. Las indicaciones de la mayor parte de estos medicamentos ya han sido dadas.

Cinchona y Morphina son antagónicos por sus síntomas cerebrales.

Cinchona y Belladonna son antagónicos en sus síntomas cardiacos y por su temperatura.

Ipecacuanha

Ipecacuanha tiene relación con Bryonia, Pulsatilla, Nux vómica, Cinchona, Antimonium crudum y Tabacum.

En otras afecciones se relaciona con Arsenicum album, Antimonium tartaricum, Veratrum album y Lobelia inflata.

Su complementario es Cuprum metall.

Ipecacuanha cephaelis es un pequeño arbusto que crece en el Brasil. Es amargo, acre y nauseoso; posee un olor especial que en algunas personas produce estornudos y aún el asma; en muchos casos la conjuntiva está inyectada con hinchazón de los párpados inferiores, coriza profuso y tensión de los globos oculares.

Ipecacuanha contiene como principio activo una sustancia llamada Emetina que comunica a la droga la propiedad de producir vómitos; también contiene un ácido llamado ipecacuánico y pequeña cantidad de un aceite volátil fétido. Este último constituyente, con toda probabilidad influye en la acción que la droga tiene sobre el pneumogástrico y de ahí su uso, en el tratamiento del asma. Ipecacuanha es un medicamento fácil de estudiar; obra sobre los nervios (especialmente los pneumogástricos) y sobre las mucosas. Ha sido empleado por los alópatas, como antiespasmódico en el asma y en los catarros pulmonares. En esta última clase de padecimientos se emplea para producir vómitos, logrando con esto, por supuesto, una mejoría temporal.

Ipecacuanha parece tener una afinidad especial por las mucosas, principalmente del revestimiento bronquial y del tubo digestivo; uno de los rasgos característicos de este medicamnto, es su propiedad de producir náuseas y subsecuentemente vómitos. Tan prominente es este síntoma que lo encontramos en casi todos los casos en que Ipecacuanha está indicado.

Si se estudia con más detalle encontramos que Ipecacuanha está

indícado en los enfermos fácilmente irritables, llenos de deseos, sin saber lo que realmente quieren. Si se trata de un adulto está irritable y malhumorado, menospreciándolo todo. Si de un niño se trata, éste grita y se queja continuamente.

Nos encontramos a Ipecacuanha indicado en la cefalalgia de orígen reumático. La sensación característica de esta cefalalgía, es la de como si los huesos de la cabeza estuvieran magullados o rotos, sensación que parece descender hasta el tronco de la lengua; yendo acompañada de náuseas y vómitos.

Ipecacuanha puede también ser empleado en las jaquecas unilaterales con náusea mortal; en estos casos generalmente la cara está pálida, hay círculos azules alrededor de los ojos y la expresión de la boca revela la intensidad de la náusea. Sin embargo, estos síntomas no están necesariamente presentes en el adulto como en el niño; las comisuras de la boca en el niño se verán contraídas y una línea que se extiende de las alas de la nariz a las comisuras labiales dan al niño una expresión de náusea, sugiriendo desde luego en la mente a medicamentos tales como Ipecacuanha, Antimonio tartárico y Acthusa cynapium.

Para la cefalalgia violenta y desgarrante de Ipecacuanha, es necesario establecer comparaciones con Veratrum album que tiene la sensación de magulladura en distintos puntos del cerebro. También hay otro medicamento que tiene este síntoma, es Ptelea.

Los síntomas gástricos de Ipecacuanha, además de los ya mencionados son de tal naturaleza, que indicarían al medicamento después del abuso de alimentos ricos, como pasteles, carne de cerdo, frutas, bombones, helados, etc. La náusea es constante en todos los padecimientos; vómitos biliosos; los vómitos se presentan inmediatamente después de comer (como sucede en Arsenicum); vómitos después de haber tomado alimentos ricos e indigestos; vómitos de moco; náusea matinal. Generalmente la lengua está limpia, síntoma que diferencia a Ipecacuanha de Nux vómica, Antimonium crudum, etc. Sensación penosa en el estómago, este se siente relajado como si estuviera colgando (Staphysagria, Theina, Lobelia y Tabacum.)

Los síntomas gástricos de Ipecacuanha deben ser comparados con los de otros tres medicamentos, de los cuales el más importante es Pulsatilla. Al instante reconoceremos las semejanzas entre estas dos drogas. Los dos son de mucha utilidad en los desarreglos gástricos causados por el abuso de los alimentos pesados, pasteles, helados, carne de cerdo, alimentos grasosos, etc. Pulsatilla debe ser considerado como el mejor en el comienzo del desarreglo, cuando el alimento, causa del daño, aún está en el estómago; en tanto que Ipecacuanha es de preferirse cuando el estómago está vacío y permanecen solamente los efectos del abuso. La mejor diferenciación que podemos hacer entre estos dos medicamentos, es el estado de la lengua; en Ipecacuanha, como antes se indicó, la lengua está limpia o ligeramente sucia; en tanto que en Pulsatilla está casi siempre

blanca o amarilla y hay un sabor desagradable en la boca.

Arsenicum debe seguir o reemplazar a Ipecacuanha, cuando el catarro gástrico real ha sido producido por un alimento indigesto, especialmente después de un repentino enfriamiento gástrico por la nieve o el agua helada; hay vómitos, ardores en el estómago, diarrea, inquietud, etc.

Antimonium crudum, como Ipecacuanha, es adaptable al catarro gástrico consecutivo a una comida pesada en la que ha habido pasteles, etc. La lengua está cubierta de una gruesa capa blanca, como si hubiera sido pintada con una pasta blanca.

Ipecacuanha puede estar indicado cuando, en el caso de los niños, el exceso de un alimento rico ha producido convulsiones; puede aún prestar utilidad en las convulsiones de la dentición o en las que siguen a erupciones suprimidas, enfriamiento, etc. Son de forma tetánica, rígida. Algunas veces la rigidez alterna con la relajación de los brazos o de sacudidas de un brazo contra otro. Pueden presentarse cólicos de carácter calambroideo. El dolor puede estar situado alrededor del ombligo o como si una mano comprimiera con violencia los intestinos; o bien el cólico consiste en dolores cortantes que cruzan rápidamente el abdomen de izquierda a derecha. Las evacuaciones, bien son vérdes, como en la diarrea infantil, o amarillas y líquidas y cubiertas de moco y sangre; algunas veces tienen apariencia de fermentadas y se parecen a la melaza. Esta es la mejor comparación que puedo hacer; las evacuaciones se parecen exactamente a la melaza burbujeante; otras veces son negras por la mezcla de bilis; en ocasiones esta diarrea va asociada de tenesmo, revelando un catarro de la mucosa intestinal.

Ipecacuanha está con frecuencia indicado en el principio del cólera infantil. Encontraremos que el niño presenta palidez del rostro con círculos azules alrededor de los ojos; las fontanelas están aún abiertas demostrando esto una nutrición defectuosa; el niño podrá tener epistaxis con palidez del rostro; está amodorrado y hay sacudimientos musculares durante el sueño; el enfermito está sujeto a epistaxis repetidas, se aproxima ya a un estado de hidrocefalia. Es necesario no pensar que, porque Ipecacuanha está íntimamente relacionada a los síntomas gástricos no puede estar indicado en este estado cerebral reflejo. Comúnmente la náusea y los vómitos estarán presentes. El niño come y bebe y vomita lo que ha tomado, casi inmediatamente después de hacerlo. Ipecacuanha está particularmente indicado en estos casos, como un remedio que precede a la indicación de Arsenicum. Arsenicum es complementario de Ipecacuanha en las afecciones abdominales.

En ciertos casos de estas afecciones gastrointestinales de los niños. Ipecacuanha y los otros medicamentos antes mencionados, fallarán algunas veces. Será entonces preciso recordar a los siguientes medicamentas, que, aunque con poca frecuencia indicados, pueden revelarse como de inestimable valor.

Oenthera biennis "la primera rosa de la tarde" que comúnmente

crece en los campos y lugares desocupados, es un valiosísimo remedio en la agotante diarrea acuosa. No obra, como se ha sugerido como un astringente por su ácido tánico, sino que es un medicamento genuinamente homeopático que produce y cura la diarrea. Las evacuaciones se verifican sin esfuerzo yendo acompañadas de un agotamiento nervioso y aún de hidrocefalia incipiente.

Gnaphalium produce una diarrea matutina, acuosa y fétida, que se repite con frecuencia durante el día; los experimentadors fueron niños y manifestaron claramente un cuadro común de síntomas de cólera infantil. Ruidos intestinales, dolores como de cólico, estando al mismo tiempo malhumorados e irritables. La orina era escasa; el apetito y sabor perdidos. Un escritor del "Homoepath" dice haber usado este medicamento con mucho éxito, y el Dr. Hale se refiere a él en su terapéutica.

Geranium maculatum, es también un medicamento que ha tenido éxito en los niños. El Dr. Hale dedica ocho páginas a Geranium y a otros astringentes dividiendo su acción según los síntomas primarios y secundarios, deduciendo de ahí dos proposiciones para su uso en la práctica. Las patogenesias, aunque breves, nos ayudan a seleccionar la droga.

Constante necesidad de defecar, con imposibilidad, durante algún tiempo, para expulsar los excrementos; después los intestinos logran una evacuación sin dolor ni esfuerzo; la boca está seca; la punta de la lengua ardiente; los alópatas hacen uso de Geranium, como un astringente.

Paullinia sorbilis, ha sido mencionada para la diarrea verde profusa y sin olor.

Opuntia nos ha sido recomendada por un cuidadoso observador, el Dr. Burdick, y aunque yo no la he empleado, no vacilo en presentarla como un medicamento nuevo. La náusea proviene del estómago y de los intestinos, el enfermo siente como si los intestinos descendieran hasta la parte más baja del abdomen (sensación limitada a los adultos). En los niños quizá podamos pensar en este mdicamento, cuando la parte inferior del abdomen es asiento de la enfermedad ya que parece ser este el sitio predilecto de ataque.

Nuphur lutenum produce una diarrea amarilla que empeora por la mañana, ya sea sin dolor o con cólicos; se le ha empleado en la diarrea durante la tifoidea y parece, en efecto, producir debilidad nerviosa. Que pueda ser de utilidad en los niños, está por verse. Debemos pensar en ella, cuando Gambogia, Chelidonium, etc. fallan y cuando el agotamiento es un síntoma prominente.

Kali bromatum se ha dado frecuentemente con éxito en el cólera infantil; hay gran postración, enfriamiento superficial y síntomas de hidrocefalia. Compárese con Cinchona (hidrocefalia incipiente, consecutiva a una diarrea prolongada o frecuente). Calcarea phosphorica, Carbo vegetabilis, Veratrum album, Camphora, etc.

Volviendo a Ipecacuanha, hablaremos de otro efecto de la droga, que le es tan característico como su acción sobre el intestino, es su

acción sobre la mucosa del aparato respiratorio. Por esto puede ser empleada en el coriza; la nariz se siente como si estuviera obstruída; a menudo hay epistaxis, pérdida del olfato y catarro en la mucosa bronquial y náusea.

En esto puede ser comparado con Allium cepa, que resulta ser un excelente medicamento para el simple catarro nasal, cuando la secreción es aguada y acre y hay lagrimeo no irritante; se experimenta una sensación de desolladura en la garganta y tos provocada por cosquilleo en la laringe. Puede decirse al calificar estos síntomas de Allium, que aunque detiene rápidamente el catarro nasal, con frecuencia parece derivar la enfermedad hacia el pecho. Me parece que Phosphorus puede detener esta acción de Cepa.

Euphrasia es muy semejante a Allium en el catarro nasal, aunque en éste hay lagrimeo excoriante y el flujo nasal no lo es.

Arsenicum album sigue a Ipecacuanha en los catarros de los niños gordos y mofletudos.

Afectando sobre todo, como lo hace Ipecacuanha, los nervios neumogástricos, debemos esperar de él utilidad en los padecimientos que interesan estos nervios, como el asma; enfermedad en la que está indicado cuando hay una sensación de constricción torácica, agravada por el menor movimiento. Especialmente encontrará indicación Ipecacuanha en esta clase de asma, en personas robustas de fibra flácida, ya se trate de adultos o niños, siendo particularmente sensibles a una atmósfera húmeda y caliente; hay estertores mucosos y sin embargo el enfermo no expectora.

Muy semejante a Ipecacuanha en el asma, es Arsenicum, que a menudo le sigue bien, ya se trate de un asma catarral o nervioso.

Cuprum metallicum es muy útil en el asma, cuando predomina el elemento espasmódico; la cara se pone cianótica; hay constricción de la garganta; el enfermo casi llega a las convulsiones.

Otro medicamento, muy parecido a Ipecacuanha, es Lobelia inflata. También produce asma con sensación de debilitamiento en el epigastrio, que se extiende hasta el pecho, náusea, salivación profusa y una sensación como de una bola en el estómago.

Ipecacuanha es uno de los mejores remedios que tenemos para la bronquitis capilar en los niños, especialmente si es producida por las circunstancias del tiempo que ya he descrito. Hay una gran acumulación de moco en los bronquios; a la auscultación se perciben estertores en todo el pecho, tanto atrás como adelante; la tos es espasmódica y se acompaña ordinariamente de vómitos de flemas. Puede haber fiebre y aún seguir indicada Ipecacuanha.

El niño puede tener dificultad para repetir, debido a la gran acumulación de moco en el pecho. En tales casos, he usado el medicamento en todas las potencias esto es, desde la 3a. hasta la 20.000a., quedando muy satisfecho de su acción. Cuando Ipecacuanha está indicado, el estadio de Aconitum ha pasado porque la exudación ya ha tenido lugar. Si nos guiamos por los principios homeopáticos, no daremos Aconitum e Ipecacuanha, alternando.

Después de dar Ipecacuanha, se notará que el moco no se adhiere firmemente a las paredes bronquiales o cuando menos se expulsa con más facilidad porque se adhiere menos.

Quiero advertir a ustedes que hay dos o tres cambios de síntomas que reclamarán medicamentos concordantes. Uno de estos cambios exigirá el uso de Antimonium tartaricum y será cuando la tos se produzca cada vez con menos frecuencia, sin que esto sea por la disminución del moco en los bronquios aún cuando la mamá así lo crea; el pecho está de más amodorrado. Al prescribir Antimominum tartaricum en tales casos, debe darse en dosis frecuentes hasta que la tos aumente.

Otros cambios pueden requerir el uso de Phosphorus. Este deberá darse cuando los síntomas inflamatorios aumentan; el tejido pulmonar es atacado y la neumonía se presenta. Entonces Ipecacuanha dejará de ser el medicamento. Los que ejercen en las regiones más frías del país, se encontrarán con frecuencia estos catarros, y, con Aconitum, Ipecacuanha, Antimonium tartaricum y Phosphorus podrán atender a la gran mayoría de sus pacientes.

Pueden todavía ser necesarios otros medicamentos. En algunos casos Antimonium tartaricum, aunque aparentemente bien indicado, no hará desaparecer los síntomas; entonces podremos recurrir a Sulphur que produce en el hombre sano un catarro bronquial con estertores fuertes en todo el pecho, especialmente en el pulmón izquierdo. Está indicado con particularidad, cuando hay atelectasia. He usado Sulphur en tales casos, con éxito completo.

Otro medicamento es Theribinthina, que he usado cuando el niño ha estado amodorrado y los pulmones parecen estar cargados de moco; la orina es propensa a escasearse y a obscurecerse por la presencia de sangre en ella. Theribinthina debe ser dado en forma repetida.

Otro medicamento más, es Lycopodium que afecta más marcadamente el pulmón derecho; se perciben ruidosos estertores en toda la parte afectada; la expectoración es amarillenta y espesa.

Frecuentemente estaremos obligados a prescribir Ipecacuanha en la tos-ferina en virtud del carácter espasmódico de la tos y la acción de la droga sobre los neumogástrico; encontraremos a más de los síntomas ya mencionados convulsiones espasmódicas; durante la tos el niño se entiesa y se pone rígido por el espasmo tónico de los músculos extensores; se suspende la respiración y la cara palidece o se pone azul. Finalmente se relaja y hay vómito de flemas que produce alivio. Sin embargo de que en estos casos el uso de Ipecacuanha es excelente, recordemos que hay otros medicamentos parecidos. Uno de ellos es Cina, que les ruego tener presente como algo más que un simple medicamento para las lombrices. Es de utilidad para la tos-ferina, cuando se presenta la misma rigidez que he descrito para Ipecacuanha pero hay además un sonido de cloqueo cuando el niño sale del paroxismo. Si por otra parte, se tiene también el rechinido de dientes; Cina es, con certeza, un medicamento mejor que Ipecacuanha en estos casos.

Cuprum metallicum es el complemento de Ipecacuanha en las afecciones espasmódicas y en la tos ferina, está indicado con especialidad en las convulsiones de origen parasitario y durante el curso de la tos ferina, predominando el espasmo de los flexores.

En las fiebres podemos hacer uso de Ipecacuanha, especialmente en las de tipo intermitente. Como dije al tratar de Cinchona, es uno de nuestros mejores medicamentos a prescribir cuando el caso está completamente confuso. Está indicado con particularidad cuando el escalofrío es corto y va seguido de una prolongada fiebre con náusea y vómitos sobre todo, después del abuso de la Quinina.

Ipecacuanha es una droga excelente en la hematuria de orígen renal, cuando el desarreglo va acompañado de náusea, opresión pectoral; respiración difícil y dolores cortantes en el abdomen.

En ciertos casos, los que trabajan la Ipecacuanha son atacados de una inflamación violenta de la conjuntiva. Esta observación condujo al Dr. Jousset a aplicar la droga en el tratamiento de la oftalmía y proclama haber tenido muchos éxitos por este medio en la intensa conjuntivitis de los niños escrofulosos; hay dolores cortantes en los ojos y en su rededor y el lagrimeo es profuso; las lágrimas brotan a cada vez que los párpados se separan. Cuando sin embargo hay una queratitis notable, Apis es de preferirse.

Para terminar me permito hablar del temperamento de Ipecacuanha. Estudiado como un medicamento homeopático, nos lo encontramos indicado en los pacientes llenos de deseos, pero que no saben lo que quieren. Gritan y se quejan como niños. Estos gritan y se quejan continuamente. Los adultos están iritables y malhumorados y todo lo toman por el lado malo.

Bismuthum parece estorbar la acción de Ipecacuanha.

Opium acrecienta su acción sobre la mucosa bronquial.

Coffea cruda

Coffea es extensamente usado como brebaje. Su alcaloide es la Cafeina químicamente idéntico a otros principios activos como la Theina, principio activo del té y la guaranina, principio activo de Paullinia sorbilis, etc.

Se ha encontrado que la Cafeína retarda las combustiones, como lo demuestra la disminución de la excerción de urea. Es más que probable pues, que la Cafeína sea útil cuando hay una pérdida del organismo, particularmente por un trabajo intenso o por la temperatura, cálida, por cuyas circunstancias la economía está doblemente agotada por el calor y el trabajo. Entonces una taza de café, será muy benéfica. Del mismo modo puede ser empleado cuando falta el sueño, cuando después del trabajo se siente una fatiga anormal. En igualdad de circunstancias, el café no es igualmente útil en los jóvenes y en los viejos. Tenemos a un hombre en la vida activa de los negocios el que trabaja todo el día, o a uno anciano en quien el desgaste está fuera de proporción con la

asimilación; estos individuos encontrarán gran beneficio en el café, por retardar el desgaste. Efectivamente, es casi instintivo en el trabajador recurir al café como bebida, porque ésta les proporciona lo que no podrá darles el sólo alimento: cierta cantidad de fuerza y un retardo en el desgaste por el trabajo. Los efectos de la cafeína sobre la economía, tienen cierta semejanza con los de la Estricnina, parecen producir una acción refleja, así como también en el tétanos si se dan con persistencia. Producen un repentino sobresalto al más ligero tacto de la superficie del cuerpo (como en Estricnina) y un aumento de la susceptibilidad a todas las impresiones exteriores. Este aumento de la acción excito-motriz, explica muchos de sus síntomas. Los pacientes experimentan una repentina emoción, sea agradable o desagradable y al instante enferman por la excitación. Despiertan por la noche sin deseo de volver a dormir.

Coffea produce también un estado extático de la mente; en esto concuerda con Cypripedíum. Este último medicamento está especialmente indicado en los niños que despiertan por la noche anormalmente alegres y juguentones y no muestran deseos de volver a domir. Tales síntomas son, con frecuencia, preliminares de alguna afección cerebral y el empleo oportuno de Cypripedium puede evitarla.

La congestión apopléctica puede ser curada por Coffea, con particularidad si un estado excitado de la mente ha sido la causa de una plenitud excesiva de los vasos sanguíneos cerebrales; del mismo modo en una discusión, cuando la persona afectada se excita demasiado, llegando hasta la congestión cerebral Coffea será el medicamento de elección. Sin embargo, tiene valor solamente en el comienzo de estos casos, en los que resulta del todo eficaz.

Pero si el trastorno llega hasta el derrame (no al inflamatorio, sino a la efusión de serosidad por resumamiento a través de las paredes de los capilares distendidos) entonces tendremos que recurrir a Belladonna, Bryonia o a algún otro medicamento más propio que Coffea para el derrame.

Nos encontramos también indicado a Coffea en las enfermedades eruptivas, cuando la erupción mantiene al enfermo despierto debido a la comezón y ardor excesivos de la piel; el enfermo se rasca hasta sangrarse. Este síntoma es debido, en el caso de Coffea a la hipersensibilidad de la piel.

Coffea tembién produce temor a la muerte pareciéndose en esto a Aconitum; este temor ordinariamente va acompañado a dolores violentos. Todos los dolores en el enfermo de Coffea son intolerables; aún los más ligeros obligan al enfermo a lamentarse, a quejarse y a gritar.

Coffea está indicado con frecuencia en la odontalgia de los niños y de las personas nerviosas. Algunas veces nos veremos inclinados a prescribir Chamomilla en estos casos. Encontraremos los síntomas mentales indicando al medicamento y sin embargo no obra o produce solamente una mejoría parcial. Podemos indicar Chamomilla cuando

la cara está roja; cuando el niño no puede soportar ni el más insignificante dolor y está malhumorado e iritable y cuando el agua fría en la boca, mejora la odontalgía por un instante; pero si el agua fría alivia de un modo prolongado, Coffea será el medicamento.

Los sentidos están demasiado agudizados bajo la acción de Coffea no solamente el sentido del tacto, sino el de la vista y el del oído; bajo la influencia estimulante de este remedio, el enfermo puede ver pequeños caracteres, con un grado de percepción absolutamente anormal; los ruidos distantes, le parecen amplificados.

Coffea produce una condición casi opuesta a la hiperestesia, que es originada por su acción secundaria o de depresión. Nos encontramos que obra sobre la circulación del modo siguiente: al principio parece aumentar la frecuencia del pulso demostrando que en la misma forma aumenta la acción del corazón. Sin embargo debe recordar que este aumento en la frecuencia del pulso no va acompañado de un aumento de energía como en Aconitum, Bryonia y Baptisia. Por lo que vemos el estímulo no es efectivo; al contrario, debilita el músculo cardiaco, de tal manera que después de algún tiempo, si el medicamento ha sido dado con demasía o se abusa del café como bebida, el corazón muestra una tendencia a la dilatación.

También encontramos indicaciones de Coffea en las diarreas particularmente las que se presentan en las amas de casa, a las que molesta demasiado el manejo de las ocupaciones domésticas.

Debemos recordar a Coffea en la fatiga que proviene de largas caminatas especialmente durante el tiempo caluroso.

Como análogos de Coffea, deseo hacer mención de dos o tres medicamentos más, que han sido experimentados recientemente. Piper methysticum también llamado kava-kava o Awua-samoa, muy usado en Polynesia como bebida, ha sido experimentado como medicamento. Sus efectos parecen ser algo semejantes a los del café, porque produce al principio una sensación de alegría y tensión como si los nervios estuvieran restirados hasta su más alto grado. El experimentador siente que puede trabajar rudamente y sin fatiga. Si estos efectos se extreman, hay una sensación de tensión mental, como si la cabeza fuera muy grande, casi a estallar. Hay también vértigo; desvanecimiento al cerrar los ojos o al dirigir la atención a cualquier objeto. Los vasos sanguíneos cerebrales y con particularidad los de la base, se sienten llenos y como ligados; este es el síntoma dado en el lenguaje del experimentador. Por lo que se ve, es muy semejante a Coffea. Pero los efectos secundarios, rápidamente siguen al uso de Piper y estos se caracterizan por lo que podemos llamar fatiga cerebral. Hay una sensación de fatiga cerebral al despertar, como si hubiera pasado la noche con pérdida considerable del sueño o se hubiera dedicado a estudios profundos; hay pesantez, dolor sordo de cabeza. que empeora al leer o por cualquier trabajo mental. Los síntomas mentales, cualesquiera que sean, de excitación o depresión, son mejorados por distraer la mente. A más de esto Piper parece producir convulsiones y también las ha

curado. Los espasmos simulan a los de la catalepsia. La mente está fatigada y se siente fatigada por el más ligero esfuerzo. Hay hiperestesia a todas las impresiones externas.

Dd escrofulariaceas

De este órden de plantas obtenemos a Digitalis, Gratiola, Leptandra virgínica, Euphrasia, Verbascum y Linaria. Digitalis tiene relación con Myrica cerífera, Spigelia, Kalmia, Helleborus. China es antagónico de Digitalis. Estas drogas no están completamente experimentadas pero las que son bien conocidas, son lo suficientemente distintas para ser recordadas. El más importante de este grupo es Digitalis purpurea.

Digitalis purpurea

Digitalis contiene, entre otros ingredientes, dos substancias: una conocida como Digitalina y la otra como Digitoxina; esta última se encuentra en mayor cantidad que la primera; la Digitalina ha sido experimentada por separado de Digitalis; su sintomatología, sin embargo, es como la de la mayor parte de los alcaloides casi idéntica a la de la droga original. Digitalis produce, muy al principio del esperimento y en casos de envenenamiento, entre otros síntomas, la náusea más violenta y vómitos. Esta acción emetizante va frecuentemente acompañada de una debilidad mortal y sensación de hundimiento en el epigastrio. La superficie del cuerpo a menudo está fría y algunas veces cubierta más o menos de un sudor frío; el pulso es irregular. Estos síntomas precoces de Digitalis, nos recuerdan marcadamente a otros medicamentos y con especialidad a Antimonium tartaricum, Tabacum y Lobelia; es probable que todas estas drogas con Digitalis provoquen la náusea y vómitos, por afectar la base del cerebro obrando sobre los nervios neumogastricos en su orígen. Tales síntomas, como la náusea mortal y los vómitos, sugerirían el uso de Digitalis en el vómito originado por una afección cerebral, por ejemplo en las meningitis cerebrales solas, o cuando el cerebro y la médula hubieran sido afectadas por la inflamación. Se le puede también emplear en la náusea y vómitos del embarazo y en el principio del aborto. Una de las experimentadoras, mujer embarazada, tomó una fuerte dosis de Digitalis, siendo atacada de esta misma náusea mortal y de un flujo sanguíneo vaginal.

Podemos estudiar a Digitalis en su acción sobre el corazón. Por la irritación de los nervios neumogástricos, tenemos la inhibición de la acción cardiáca; como consecuencia de este efecto de la droga, el pulso llega a ser lento. La tensión arterial está muy aumentada, probablemente debiéndose esto a la acción de la droga sobre el centro vaso-motor que se supone está en la base del cerebro; el pulso es, por lo tanto, primitivamente lento y fuerte. En adición al efecto de la droga sobre el tejido nervioso, debemos recordar que también obra sobre el tejido muscular, tanto sobre la variedad estriada, como sobre la lisa. Por esto produce debilidad del tejido cardiáco. Esta varía de intensidad, desde la simple debilidad, hasta la

completa parálisis de la fibra muscular; en consecuencia, podemos tener agregado a estos síntomas la debilidad del pulso. Cualquier pequeño ejercicio suplementario, tal que como el que se ejecuta por levantarse después de estar sentado, aumenta la rapidez del pulso, pero disminuye el tono del mismo. El pulso rápido puede volverse irregular y aún intermitente. Con este conocimiento de la acción fisiológica del medicamento, podremos comprender los síntomas cardiácos siguientes y respiratorios, relacionados entre sí.

Primero me permitiré hacer a ustedes una advertencia respecto al uso de Digitalis en las afecciones cardiacas. La tendencia de esta droga, como la de Lachesis y Arsenicum album. es deprimente; por lo tanto no se debe usar indistintamente y sin cuidado, sino sólo cuando hayamos sido guiados en su elección por los síntomas del caso; de otro modo empeoraremos a nuestro enfermo.

En las afecciones orgánicas cardiácas, debe hacerse uso de Digitalis con extremada precaución, porque puede apresurar la evolución, cuando la naturaleza ya no es capaz de compensar el desequilibrio funcional por la hipertrofia del músculo cardiáca. La naturaleza de este modo puede agotarse y la presión sanguínea en sus cavidades comienza a dilatarlo. Tendremos entonces un conjunto de síntomas que he intentado describir a ustedes brevemente, correspondientes a Digitalis. Esta advertencia es aplicable, con particularidad, al uso de la droga en grandes dosis. Dado en estas condiciones, puede mejorar por algún tiempo, pero apresurando el caso a una terminación fatal. Con estas palabras de advertencia, procedo ahora a darles en detalle los síntomas cardiácos de Digitalis. El corazón se siente como si se detuviera y esta sensación va acompañada de gran ansiedad: hay una especie de ansiedad indescriptible en la región precordial que puede ser expresada como una sensación de opresión como una compresión del corazón o como un desasosiego con debilidad y entumecimiento del brazo izquierdo; hay una sensación de vacío y hundimiento en el epigastrio. Algunas ocasiones estos síntomas se mejoran por comer, pero a menudo empeoran después de hacerlo, particularmente después del desayuno. Hay dolores agudos y punzantes en la región precordial; algunas veces hay sensación de estrangulamiento al tratar de deglutir debido al espasmo reflejo de la glotis. El pulso es lento, con frecuencia más lento que el latido cardiáco. En estos casos, el corazón trabaja tan imperfectamente, que algunas de sus ondas sanguíneas no son trasmitidas de un modo apreciable a la arteria radial en el canal del pulso. Cualquier movimiento, como el simple hecho de levantarse de una silla, salir de la como el simple hecho de levantarse de una silla, salir de la cama o aligerar el paso al caminar, aumenta la rapidez del pulso, no así la fuerza del latido. La distribución irregular de la sangre debida a estas alteraciones en la función cardiaca, se manifiesta por una variedad de síntomas. En casos extremos, por ejemplo, encontramos hasta cianosis, lo que hace pensar en Digitalis como en un medicamento posible en la cianosis de los recién nacidos. El niño se pone azul y cae

en síncope al más ligero movimiento, o bien se pone mortalmente nauseoso, como se ve por la expresión de la cara y los arqueos involuntarios. Si es posible palpar el pulso, lo encontraremos irregular tanto en su ritmo como en su volúmen; la superficie del cuerpo está fría; los labios azules o purpúreos; círculos, azules también alrededor de los ojos; las venas, en cualquier parte que se vean a traves de la piel, son obscuras. Otra demostración, y de las más comunes, de la distribución irregular de la sangre, la encontramos en el sueño. El sueño del enfermo es inconfortable y agitado; sueña mucho; despierta soñando que está cayéndose de una gran altura; otras veces despierta con una sensación de ansiedad que le es imposible localizar, pero que resulta de la afección cardiaca. Mentalmente el enfermo de Digitalis además de estar ansioso, tiene presentimientos melancólicos relacionados con su padecimiento cardiaco. Tiene una aprehensión mal definida, pero que no es menos terrible. Es propenso a entristecerse y a la depresión, así como ansioso. La respiración, por supuesto, está afectada por la acción cardíaca defectuosa. Nos encontramos frecuentemente una respiración profunda como suspiros y más lenta de lo normal; este síntoma es casi patognomónico de las afecciones cardiacas, muchas veces hay deseo de hacer una spiración profunda, pero al intentarla parece llenar solamente la mitad de los pulmones que no se ensanchan en toda su capacidad. Esto, a menudo va acompañado de tos seca que parece excitarse por la inspiración profunda; mientras más profundamente respira, más probabilidades hay de toser, este es en efecto un síntoma brónquico debido a la sobrecarga de los vasos sanguíneos. Accesos de sofocación con dolorosa constricción del pecho, como si las vísceras se crecieran todas a un tiempo.

Algunas veces estos accesos obligan al enfermo a incorporarse a fin de poder respirar. Con estos síntomas cardiacos, encontraremos a Digitalis indicado en una variedad de afecciones particularmente de origen cardiaco o dependiendo directa o indirectamente de una afección de este órgano.

En casi todas las afecciones, en que puede hacerse uso de Digitalis; hay algunas de estas formas de pulso lento o débil haciéndose irregular o rápido. Por ejemplo: la hidropesía puede reclamar el uso de Digitalis; esta hidropesía no es de orígen renal. Difícilmente podremos pensar en Digitalis en una hidropesia que resulta de una enfermedad primitiva del hígado o del riñón; pero en las que sobrevienen primitivamente por la debilidad cardiaca, en ciertas ocasiones resulta un medicamento de inestimable valor.

Digitalis puede ser usado con provecho en un regular número de formas de hidropesía; puede prescribirse en la anasarca cuando la superficie del cuerpo está azulosa, más bien que de apariencia alabastrina, característica de las hidropesías de orígen renal. Puede haber también derrames locales por lo que nos encontraremos indicado a Digitalis en el hidropericardio y aún en el hidrotórax y la ascitis, si coexisten con una afección cardiaca. En las hidropesías del

tórax hay un medicamento que a menudo es olvidado y es el Sulfato de mercurio Mercurius sulphuricus. Es especialmente útil este medicamento, cuando el hidrotórax sobreviene en una afección del hígado o del corazón; cuando la droga obra bien, produce una diarrea acuosa, abundante, con gran mejoría del paciente. Una forma muy común de hidropesía que requiere el uso de Digitalis, es la infiltración de los tejidos del escroto y del pene. Podemos hacer uso de Digitalis en el hidrocele, cuando los síntomas cardiacos que lo indican estén presentes. Con frecuencia está suprimida la orina o muy escasa; este trastorno de la circulación renal, depende de la circulación desordenada y no de afecciones renales primarias; la orina puede ser roja obscura o albuminosa.

Nos encontramos a Digitalis produciendo algunos síntomas en el hígado, que son dignos de mencionar. Creo, sin embargo, que Digitalis no tiene acción directa sobre la célula hepática, parece no afectar la secreción biliar. Pero en la ictericia que ha sido originada por una afección cardiaca del tipo ya mencionado, con evacuaciones de color blanco ceniciento, obra Digitalis admirablemente. El hígado está agrandado, se siente dolorido y como magullado; a la exploración se le encuentra algo endurecido; juntamente con esto hay ictericia; el sabor de la boca es amargo, a veces algo dulce. La lengua puede estar perfectamente limpia o cubierta de un amarillo blanquecino; el pulso es lento, más lento que el latido cardiaco; puede presentarse la somnolencia y aún llegar al estupor; las evacuaciones son del carácter antes mencionado; la orina está muy coloreada por la mezcla del pigmento biliar. Esta ictericia que indica a Digitalis, no es la que sigue a una retensión de los canales biliares, sino que es debida a un imperfecto funcionamiento del hígado que no toma de la sangre los elementos que van a dar origen a la formación de bilis.

Un medicamento que se puede comparar aquí ventajosamente con Digitalis, es Myrica cerifera que tiene los síntomas siguientes; primero desaliento, un estado mental que depende del defecto funcional del hígado. Los síntomas de Myrica son semejantes a Digitalis, porque la ictericia en ambos, es debida a la formación imperfecta de la bilis en el hígado y no la obstrucción de sus conductos. Pero los dos medicamentos difieren en sus efectos absolutos sobre la economía. En Digitalis la ictericia es debida al estado cardiaco; en Myrica el caso parece ser funcional más bien que orgánico. Por alguna razón la bilis no se forma correctamente y por esto los elementos permanecen en la sangre. El corazón se afecta secundariamente, dando lugar a la lentitud del pulso. Los síntomas que indican la prescripción de Myrica, son los siguientes: decaimiento, dolor sordo y pesado en la cabeza, empeora por la mañana; los ojos tienen un color sucio, amarillento y empañado; los párpados mismos están anormalmente rojos; la lengua cubierta de una capa amarillosucia; hay debilidad y sensación de hundimiento en el epigastrio después de comer. El enfermo está débil, amodorrado y se queja de estropeo muscular y dolor en los

miembros; el pulso es lento; la orina obscura y turbia; las evacuaciones de color ceniciento. Reconoceremos al instante su semejanza con Digitalis, pero es más superficial en su acción que este medicamento y no se acomodará a un caso tan intenso.

En las afecciones del corazón podremos comparar a Digitalis con un gran número de medicamentos. Desde luego con Kalmia, Arsenicum album, Helleborus y Conium.

Kalmia latifolia es una droga que pertenece al órden de las Ericáceas, con Rhododendron, Ledum palustre y otros medicamentos. Es un valioso remedio en el reumatismo cuando afecta el pecho. Los dolores que produce Kalmia en la afección cardiaca, son tan agudos, que impiden la respiración; el paciente casi se sofoca por la intensidad de los dolores. Estos irradian al abdomen o al epigastrio; el lento, casi tan lento como el que produce Digitalis. Kalmia., es especialmente útil cuando la gota o el reumatismo se propaga de las articulaciones al corazón, particularmente después de que se han hecho aplicaciones locales en las regiones enfermas. Me refiero de un modo particular a la aplicación de substancias que no son homeopáticas en el caso. Si se prescribiera Arnica al interior y localmente y que este fuera el remedio indicado, no habría peligro de metastasis. Pero si se aplicara tintura de Aconitum sobre una articulatión afectada, habría peligro de que la afección pasara a otro órgano más noble. El reumatismo de Kalmia, contrariamente al de Ledum, por lo general es descendente, siguiendo la dirección de los dolores.

Helleborus es semejante a Digitalis en la lentitud del pulso, la respiración es también lenta y la temperatura del cuerpo está disminuída notablemente; suele ser tan baja, que llega a 35 ó 35.5 C. Generalmente hay alguna afección cerebral.

Spigelia debe también ser comparado con Digitalis. Presenta los siguientes síntomas: dolor agudo que irradia del corazón a la espalda o bien del corazón al brazo o sobre el pecho y la columna vertebral; hay gran opresión y ansiedad en el corazón; taquicardia que empeora por cualquier movimiento, aunque solo se mueva el brazo; estremecimiento y sensación de murmullo en la región precordial (es justamente como el estremecimiento que se percibe cuando se pone la mano sobre el lomo de un gato que ronronea; también hay soplo en el corazón. Encontraremos indicado a Spigelia cuando estos síntomas cardiacos acompaña a otras afecciones, la neuralgía facial, por ejemplo, el lado izquierdo de la cara, iniciándose en el occipucio e irradiando al ojo izquierdo. Esta es la cefalalgía de Spigelia; su agravación aumenta y disminuye con el curso del sol; se inicia en la mañana llega a su punto culminante al medio día y disminuye hacia la noche. También podemos hacer uso de ella en la neuralgia ciliar con los síntomas simpáticos cardiacos que le acompañan. Un dolor agudo que atraviesa el globo ocular e irradia en todas direcciones volviendo al enfermo loco. Otras veces hay una sensación de como si el ojo estuviera siendo comprimido en una prensa o como si fuera enormemente grande y estuviera siendo empujado fuera de la órbita.

Este es uno de nuestros principales medicamentos en que debemos pensar en la iritis con intenso dolor. Deseo hacer mención de otro síntoma referente a Spigelia que el Dr. Jacob Jeanes confirmó muchas veces y es el pulso intermitente. Prescribía este remedio como intercurrente en distintas variedades de padecimientos, cuando el pulso se presentaba con este carácter.

Convallaria majalis presenta síntomas cardiacos asociados a síntomas uterinos; dolores en la región sacro-iliaca, extendiéndose hasta la pierna y comezón en el meato urinario y vulva; sensibilidad en el hipogastrio.

Otro medicamento es Magnolia grandiflora, que produce tristeza, nerviosidad, debilidad cardiaca con sensación, de constricción en la región precordial, agravado todo esto por caminar de prisa y en ocasiones sensación de como si el corazón detuviera su marcha.

No nos será infructuoso estudiar a continuación, la acción de Digitalis sobre el cerebro; produce síntomas muy semejantes a los de la meningitis; aún a la meningitis con derrame o a la hidrocefalia, y a la meningitis cerebro espinal; los detalles que nos guían en su indicación, serán los siguientes: cefalalgia punzante que se puede referir a la frente; delirium que puede ser tan violento, que simule la manía; errores visuales muy marcados, manchas de fuego brillantes aparecen en el campo visual, o como en Santonina, los objetos aparecen de colores diversos, amarillos o verdes. Más adelante cuando la enfermedad progresa, la confusión mental es mayor y la congestión amaurótica de la retina se presenta; las pupilas se dilatan y no reaccionan a la luz; finalmente se presenta el coma. Hay gran postración general, frialdad del cuerpo, que se cubre de sudor frío. Aún en estas formas de afección cerebral, cuando Digitalis sea nuestro medicamento, el pulso debe ser nuestro principal guía. Si el síntoma "zumbidos de oídos" nos sugiriere el uso de Cinchona, encarezco a ustedes no darlo después de Digitalis, pues Hahnemann nos decía que aún cuando hubiera semejanza entre los síntomas cerebrales y de la debilidad sin embargo estas drogas son antagónicas.

Por último hablaremos de la acción de Digitalis sobre la uretra y los órganos genitales: produce una irritación catarral de la vejiga, particularmente a nivel del cuello; hay estranguria, frecuente urgencia de orinar, con especialidad cuando el paciente está de pie o sentado. La sensación de presión sobre la vejiga no mejora por orinar; el enfermo puede también tener frecuente necesidad de orinar por la noche; la uretra está inflamada de tal modo, que hay ardor con flujo purulento de carácter espeso y de color amarillo brillante; ahora, si combinamos estos síntomas con otro, que es el de que el glande se inflama y produce una abundante secreción de pus espeso en su superficie, tendremos un cuadro perfecto de la gonorrea que cura Digitalis; este padecimiento curará con Digitalis aun cuando el pulso sea lento o rápido, blando o débil. Con frecuencia cuando Digitalis está indicado en esta molestia, encontraremos el prepucio hinchado o

infiltrado de serosidad. Diré de paso que si el prepucio está indurado, Digitalis no responderá y sí lo hará Sulphur.

El medicamento más próximo a Digitalis en la gonorrea, es Mercurius; este es una buena droga en la gonorrea asociada a la inflamación del prepucio, pero con menos edema y más obscura hinchazón purpurina de las partes afectadas y con fimosis o parafimosis.

Mercurius corrosivus es bueno en estos casos, cuando el glande tiene una apariencia roja-obscura o gangrenosa.

En el principio de estos casos de parafimosis, podremos hacer uso de Colocynthis que mejora con frecuencia el espasmo y pondrá en aptitud al prepucio para deslizarse sobre el glande.

Se debe pensar en Petroselium como un medicamento intercurrente en los padecimientos gonorreicos, cuando la infección invade el cuello de la vejiga y hay repentino deseo urgente de orinar. Parece como si el enfermo difícilmente pudiera retener la micción hasta llegar al lugar conveniente.

Digitalis produce también violentas erecciones y aún "garabatillo". Este es uno de nuestros mejores remedios para las emisiones seminales involuntarias durante el sueño, muchas veces sin haber ensueños. Estas emisiones van seguidas de una gran debilidad.

Linaria vulgaris

Esta droga afecta poderosamente al sistema nervioso simpático. Puede ser de utilidad en el debilitamiento de orígen cardiaco, cuando el enfermo sufra desmayos mortales sin causa aparente. Linaria ha producido este síntoma en forma repetida; es verdad que hay alguna dificultad para confirmar síntomas de esta naturaleza, por que el enfermo, en la mayoría de los casos, rápidamente vuelve al conocimiento sin tener que recurrir a ningún medicamento. Pero si el enfermo que está sujeto a estos ataques de desmayo no solamente se mejora sino que es curado tomando esta droga, se llegará a la conclusión de que es resultado de este remedio.

También tiene alguna acción sobre la vejiga, produciendo y curando la eneuresis con dolorosa urgencia para orinar.

Verbascum thapsus

Debe pensarse en Verbascum como medicamento para los catarros o resfriados, cuando van asociados a una neuralgia facial del lado izquierdo, que aparace en forma periódica, regularmente dos o tres veces por día, a la misma hora, en la mañana y en la tarde. Esta es descrita como un dolor sordo, presivo sobre el hueso malar, como si oprimiera un dedo, con tensión en la mejilla y sensación de entumecimiento; empeora por cualquier cambio de temperatura, especialmente del calor al frío. Hay considerable coriza y lacrimeo.

Verbascum ha producido tos característicamente laríngea o traqueal. Tos que no se producirá más que por la inflamación de un tubo rígido e inflexible como es la laringe y la tráquea. La tos es ronca y dura y

hueca, como de trompeta yendo acompañada de ronquera; la misma voz es ronca y gruesa, como de bajo profundo, teniendo en estos detalles alguna semejanza con Drosera, Spongia y Sulphur.

Gratiola officinalis

Gratiola es útil en la diarrea. Produce y cura la diarrea profusa, aguada y en chorro, comparable al escape de una llave de agua. Esta diarrea es muy común en el verano y parece tener como causa el tomar con exceso agua fría o no. Es concordante de Croton tiglium, Elaterium, Podophyllum y otras drogas.

Leptandra virginica

Leptandra virgínica es una droga que obra prominentemente sobre el hígado. Localmente produce un dolor de estropeo en el hipocondrio derecho, en el punto vesicular y hacia atrás en la región posterior del hígado. Este dolor con frecuencia va acompañado de sensibilidad. Otras veces produce una congestión tan intensa que ocasiona dolor y ardor en toda la zona correspondiente al hígado, irradiando a menudo al epigastrio y al abdomen. Como síntomas concomitantes encontraremos la somnolencia y el decaimiento correspondiente a las afecciones hepáticas de este carácter; diarrea, siendo las evacuaciones negras, tan negras como el alquitrán, y van acompañadas de ardor y dolor como de cólico muy molesto, alrededor del ombligo. En otros casos hay vómitos biliosos que acompañan a este angustioso ardor y ocasionalmente evacuaciones arsillosas. La lengua está cubierta de amarillo con más frecuencia de negro o de café obscuro y negro en el centro. Estando presentes estos síntomas puede hacerse uso de Leptandra en las fiebres tifoideas y biliosas.

Leptandra se parece a Mercurius, pero su principal diferencia es la siguiente: Mercurius casi siempre tiene como característico un tenesmo que se prolonga después de la evacuación; Leptandra carece de este síntoma, aún cuando puede haber dolores cólicos crispantes después de la evacuación.

Debe hacerse también aquí mención de Iris versicolor; esta droga produce irritación en todo el trayecto del tubo digestivo; de aquí que haya ardor y diarrea serosa, pudiendo llegar las evacuaciones a tener un aspecto como de agua de arroz; hay calambres y vómito. En el cólera morbus, cuando estos síntomas se agraven entre dos o tres de la mañana, es superior a Veratrum. También produce inflamación del pancreas. Leptandra tiene su acción electiva más notable sobre el hígado; está indicado si las evacuaciones son acuosas, lodosas y empeoran por la mañana al principiar a moverse.

Euphrasia

es particularmente para nosotros un medicamento que obra sobre las mucosas, con especialidad sobre la mucosa nasal y la conjuntiva.

Desde hace tiempo es conocida como un medicamento útil en las

afecciones de los ojos; primero producen una inflamación en los párpados (blefaritis); se ponen rojos e inyectados, particularmente en su mucosa; se ponen abotagados y aún llegan a ponerse de un color rojo-obscuro; la ulceración se presenta produciendo un escurrimiento grueso y escoriante. Las mismas lágrimas son profusas y escorian las mejillas; hay marcada fotofobia; el enfermo no puede soportar la luz del sol, molestándole aún más la luz artificial; ciertos médicos dicen que es atrevido diferenciar la agravación por la luz del sol y por la luz artificial; no se puede conceder crédito a esta objeción, porque las dos luces tienen una composición muy diferente.

Belladonna tiene agravación por la luz artificial y Aconitum por la luz del sol.

En la conjuntivitis, algunas veces está indicado Euphrasia en los escrofulosos; pequeñas vesículas o flictenas se forman cerca o sobre la córnea; la secreción de los ojos es acre y purulenta y una capa de moco se acumula sobre la córnea produciendo dificultad para la visión; este trastorno se mejora por limpiar el ojo o por frotar los párpados.

Nos encontramos indicado a Euphrasia en la conjuntivitis traumática, cuando están presentes los síntomas antes mencionados. Arnica que es más que un medicamento en los traumatismos, no tiene aplicación cuando existe esta secreción acre o hay formación de pequeñas vesículas, por eso cuando estas se forman después de algún traumatismo, es de preferirse Euphrasia.

Aún cuando Euphrasia afecta principalmente los tejidos superficiales del ojo, lo encontramos indicado en la iritis reumática. Si se examina el ojo, se ve que el iris reacciona con mucha lentitud a la luz y el humor acuoso está turbio por la presencia de productos de la inflamación; los dolores son de carácter ardiente, aguijoneante y punzante, empeoran por la noche y van acompañados de lacrimeo acre.

Euphrasia está indicado en el coriza, cuya secreción es inofesiva y va acompañado de lacrimeo escoriante.

Comparemos a Euphrasia con sus remedios concordantes. En primer lugar, refiriéndonos a los síntomas de los ojos, nos encontramos que puede ser un íntimo aliado de Mercurius solubilis; los dos medicamentos tienen bien marcada blefaritis y conjuntivitis producida por un enfriamiento; pero bajo la acción de Mercurius, la secreción es más delgada que en Euphrasia; además Mercurius tiene notable agravación por el calor del fuego y por el tiempo húmedo.

Después, encontramos a Euphrasia semejante a Arsenicum album; tanto uno como otro, producen la secreción acre y la formacióm de flictenas sobre la córnea, y los dos están indicados en los casos de escrofulosis. Pero Arsenicum tiene más marcado el ardor, ardor como de fuego, especialmente después de media noche; este síntoma, con frecuencia, aunque no siempre, se mejora por las aplicaciones calientes. No tenemos en Euphrasia la marcada inquietud que tenemos en Arsenicum.

Otro medicamento que le es muy semejante, es Rhus toxicodendron, que produce lacrimeo profuso que es coria las mejillas; escurrimiento purulento y profuso de los ojos. Pero al pus es más delgado bajo la acción de Rhus que en Euphrasia; Rhus ataca con más frecuencia el ojo derecho; Euphrasia afecta a ambos ojos; Rhus produce dolores en la iritis reumática, que atraviesan como dardos, del ojo al occipucio, con mucho dolor, angustia e inquietud durante la noche, que mejora por el movimiento y las aplicaciones calientes.

Al tratar el coriza, estamos acostumbrados a asociar a Euphrasia con Allium cepa; Cepa tiene coriza escoriante y lacrimeo suave; Euphrasia, coriza suave y lacrimeo escoriante.

También podemos hacer otra aplicación de Euphrasia en la parálisis del tercer par nervioso con producción de ptósis, especialmente después de un enfriamiento en los pacientes reumáticos.

Sus análogos, son Rhus toxicodendron y Causticum que tienen exactamente el mismo síntoma. Hemos conocido el uso preciso de Euphrasia en el tratamiento del catarro de los ojos y las nariz.

Podemos también hacer uso de la droga en el tratamiento de los condilomas.

Es de utilidad cuando estos son anchos y planos, bien marcados en el ano, naturalmente de origen sicótico. Generalmente hay en su rededor una secreción húmeda.

Baptisia tinctoria

Baptisia tiene relación con Gelsemiun, Rhus tox, Bryonia, Arnica mont., Muriaticum acidum. Lachesis y Arsenicum album; en las fiebres con Ailanthus en la escarlatina.

He seleccionado para nuestro estudio de hoy, de entre las numerosas plantas leguminosas, a Baptisia tinctoria. Baptisia tiene una corta historia pero sumamente interesante. Nuestras revistas están llenas de narraciones de curaciones brillantes de casos tifódicos hechos con este medicamento. En general, Baptisia produce cambios en la sangre tanto cuantitativos como cualitativos, que se manifiestan en la fiebre tifoidea. Las secreciones malolientes, los fenómenos mentales y nerviosos que desarrolla, son característicos de esta enfermedad. Baptisia se adapta a todos los estadios de la fiebre tifoidea; al principio o al fin. Sus síntomas serán divididos en dos clases: 1o.-aquellos que indican al medicamento en el comienzo de las afecciones tifoideas y 2o.-los que son requeridos para estas afeccciones más tarde. La droga naturalmente puede estar indicada, aun cuando no todos los síntomas siguientes estén presentes en cualquier caso. Daré a ustedes los característicos de la droga; si varios de ellos no están presentes, no sería correcto prescribir Baptisia.

Estos síntomas son los siguientes: excitación cerebral como la que precede al delirio; variabilidad, el enfermo no puede fijar su mente en un objeto; agitación; deseo constante de moverse de un sitio a otro; sueño desordenado, despierta entre dos y tres de la mañana y

después está tan inquieto, que se agita y no puede conciliar el sueño. Cuando duerme tiene sueños de carácter extravagante; sueña que está encadenado a la cama; que anda nadando en un río o que está sometido a una presión de la que para librarse necesita de un gran esfuerzo. Puede sufrir pesadillas, de las que despierta con la sensación de como si la pieza estuviera de tal menera caliente, que no la puede soportar, haciendo la respiración casi imposible. Si aún dispone de fuerzas, se levanta y abre la ventana para tener aire. Esto no es lo que sucede en el asma esencial, no se debe a la contracción espasmódica de los bronquios; hay una plenitud del tórax que produce una sensación de opresión. Un experimentador describió el síntoma de la siguiente manera: no es una verdadera dificultad respiratoria, sino una sensación de como si se careciera de fuerzas para dilatar el tórax. El enfermo sufre frecuentes errores en su propia persona; cree a veces que es doble o que su cuerpo está fraccionado y disperso, necesitando moverse en su cama para recoger los pedazos. Esta excitación nerviosa evidente, va acompañada de excesiva postración; hay dolor en la espalda y los miembros; el dorso se siente tieso; el enfermo se siente cansado y todo magullado; se queja de que la cama es demasiado dura; esto le tiene incómodo y se mueve a fin de encontrar un lugar más suave; la debilidad progresa a tal grado que le es imposible caminar; sufre esta indescriptible debilidad y desmayo con o sin vértigo. La cara está caliente y congestionada y la mirada es embrutecida como si estuviera intoxicado; los ojos pesados y le dan una apariencia de estupidez. La lengua al principio es blanca o ligeramente amarillenta; con frecuencia las papilas son prominentes y se proyectan a través de la capa blanco o amarillenta; los bordes de la lengua son rojo-subidos; hay una cefalagia frontal sorda con la sensación de como si la cabeza estuviera prensada; algunas veces esta presión parece irradiar a la raíz de la nariz. El paciente se queja de una sensación que describe de este modo: "como si la piel de la frente estuviera siendo restirada hacia atrás hasta el occipucio" debiéndose esto evidentemente a la contractura tónica de los músculos occípito-frontales. Otras veces el enfermo simplemente describe la sensación de como si la piel de la frente estuvira tirante, apretada o restirada; estos síntomas cefálicos frecuentemente van acompañados de una sensación de hormigueo o entumecimiento en la frente y pericráneo; otras veces la cabeza se siente enormemente grande.

La fiebre tifoidea es muy característica de Baptisia, siendo este uno de los pocos medicamentos que en realidad produce este tipo de fiebre. Hay siempre elevación de la temperatura. El pulso ordinariamente es acelerado en proporción directa con la intensidad de la fiebre. Aun en los primeros estadios de la fiebre tifoidea podemos encontrar indicado a Baptisia por los síntomas abdominales; una ligera sensibilidad en la región ilio-cecal; evacuaciones amarillas y pútridas. Estos serán los síntomas que indiquen a Baptisia en las primeras fases de la fiebre tifoidea.

Puedo decir confiadamente que si se selecciona el medicamento de acuerdo con sus indicaciones homeopáticas, como antes se ha dicho, se tendrá éxito haciendo abortar un gran porcentaje de casos tifódicos. Digo esto, a pesar de las aserciones de muchos otros médicos que arguyen lo contrario. La droga correctamente prescrita, hará abortar la fiebre tifoidea. La enfermedad no continúa su curso necesariamente, como autoridades de la antigua escuela pretenden asegurar.

Debemos reconocer que Baptisia responde a la verdadera fiebre tifoidea, particularmente cuando va asociada a fenómenos nerviosos.

Más trade, en el curso de la enfermedad, durante la segunda o tercera semana, encontraremos a Baptisia indicado cuando la postración es profunda. El enfermo está en estada de estupor. Se duerme mientras contesta a las preguntas; la cara se pone de un color rojo-obscuro y más notable que nunca la mirada es vaga y embrutecida; la capa amarilla o blanca que cubría la lengua ha cambiado y ahora se ve una banda café hacia el centro, permaneciendo aún los bordes rojos. Todas las exhalaciones y excreciones del enfermo son extremadamente fétidas. Los dientes están cubiertos de fuliginosidades muy pestilentes. El aliento es fétido. Las evacuaciones son amarillentas u obscuras y horriblemente pútridas; la orina y el sudor también son muy fétidos. Por lo que se ve, Baptisia está indicado en los casos en que hay una descomposición evidente de los fluidos y una desintegración rápida de los tejidos.

Para dar a Baptisia su sitio legítimo entre los medicamentos indicados en la tifoides, es necesario comparorla con los que le son más análogos en su sintomatología. El primero de ellos, sobre el que llamaré su atención, es Gelsemium. Este precede a Baptisia cuando hay malestar y adolorimento muscular y el enfermo tiene escalofríos que se propagan descendiendo a todo el dorso. Este es el primer día, recordémoslo. Por la tarde se presenta la fiebre con pulso acelerado lleno y flojo, no tenso y resistente como sucede en Aconitum. La fiebre generalmente va asociada a somnolencia; la cara tiene un color rojo difuso, uniforme y desde este momento puede presentarse la postración. Gelsemium produce parálisis de los nervios motores, de aquí que debe haber debilidad muscular. Por la tarde si la fiebre aumenta a pesar de Gelsemium, podemos indicar Baptisia siempre que los síntomas antes mencionados estén presentes. La razón por la que insisto en la relación que hay entre estos dos medicamentos, es la gran semejanza de sus síntomas. Tanto uno como otro tienen la intensa sensibilidad muscular y la postración; los dos somnolencia y excitación nerviosa con postración; ambos tienen esa sensación de expansión, como si la cabeza o cualquiera otra parte del cuerpo estuviera enormemente agrandada y las dos tienen exacervación de la fiebre después de medio día. La relación entre estas dos drogas es de grado e intensidad. Gelsemium obra más moderadamente que Baptisia.

Otro medicamento semejante a Baptisia es Rhus toxicodendron. como Baptisia, Rhus produce agitación, lengua café y dolores musculares. Debo confesar que la diferenciación de estas drogas no siempre es fácil. Primeramente Rhus tenía un dominio sin discusión en todas las enfermedades que tendían a tomar un carácter tifódico, ya se tratara de difteria, escarlatina, peritonitis o pneumonía. Ahora de este honor participa Baptisia. Las principales diferencias entre estos dos medicamentos, dadas con brevedad son las siguientes: Rhus tiene la inquietud causada más por dolores reumatoides, que por dolores musculares solamente. La lengua bajo la acción de Rhus tiene el triángulo rojo en la punta que no se observa en Baptisia. El delirio es de cáracter musitante en Rhus, sin ir acompañado, al menos por lo que conozco, de los errores respecto a la identidad personal. Ni son las evacuaciones pútridas de Rhus, tan fétidas como las de Bapitsia. Si la diarrea llega a hacerse grave en Rhus las evacuaciones son acuosas, algunas veces sanguinolentas e involuntarias. Los síntomas pneumónicos que a menudo complican la fiebre tifoidea, son más prominentes bajo la acción de Rhus.

Arnica ofrece muchas relaciones de semejanza con Baptisia. Es semejante a este último medicamento en el estupor, en la intolerancia de la cama (el enfermo se queja de sentirla muy dura), quedando dormido al contestar las preguntas. Arnica, a mi juicio, se adapta más cuando hay tendencia a una congestión apopléctica y cuando el estupor es tan profundo, que las evacuaciones y la orina pasan involuntariamente. La intensidad de la complicación cerebral se revela por la fuerte respiración de ronquido. Nos encontramos también en Arnica, sufruciones llamadas equimosis.

Lachesis se muestra también muy semejante a Baptisia. Encontraremos las semejanzas entre estos dos medicamentos en la fetidez de las evacuaciones, la putridez del aliento y la postración excesiva. Creo haber visto casos aparentemente desesperados, reaccionar bajo la benéfica influencia de este medicamento. Tratándose de un veneno animal, creo que es un medicamento de acción más profunda que Baptisia y en consecuencia estaría indicado en casos más graves. Se le puede distinguir por los siguientes síntomas: temblor de la lengua, cuando el enfermo trata de sacarla queda detenida entre las arcadas dentarias. Cuando logra sacarla cuelga temblorosa y el paciente no tiene la fuerza suficiente para volverla a introducir. Las hemorragias son frecuentes en el enfermo de Lachesis. La sangre puede salir por cualquiera de los orificios naturales del cuerpo. Los labios se parten, dando salida a una sangre obscura o negruzca. Hay melena de sangre obscura. Esta sangre después de un rato deposita un sedimento de apariencia de paja carbonizada. En los casos graves hay marcada intolerancia a la presión ligera. Aún cuando el sensorio parezca estar claramente entorpecido, el enfermo se molesta por el más ligero toque en el cuello. En los casos aún más graves es necesario distinguirlo de Baptisia, cuando hay una inminente parálisis cerebral, caída del

maxilar inferior y evacuaciones involuntarias.

Muriaticum acidum ofrece algunas semejanzas con Baptisia en la gran postración, la descomposición de los fluídos y en la forma de delirio deprimente. Pero me parece que el carácter general de estos síntomas no es tan semejante al de la otra droga, para dificultar su diferenciación. La debilidad de Muriaticum acidum es tan grande, que el enfermo es incapaz de hacer el más ligero movimiento para mantener la cabeza sobre la almohada; el paciente por lo tanto se desliza a los pies de la cama.

Ahora diremos algunas palabras acerca de Baptisia, en enfermedades distintas de las fiebres tifódicas y cuyas indicaciones se harán de acuerdo con los síntomas ya descritos. En la disentería lo prescribiremos cuando las evacuaciones sean mal olientes, sanguinolentas y acompañadas de tenesmo, pero con ausencia significativa de dolor revelando una depresión alarmante de la vitalidad. Baptisia entra en acción en el tratamiento de la tisis; es útil con especialidad en los últimos estadios de la enfermedad mejorando la fiebre, particularmente cuando aumenta por la tarde, con ligera somnolencia, palabra embarazosa y embotamiento intelectual.

Baptisia ha probado ser uno de nuestros mejores remedios en la difteria cuando toma un tipo tifódico. Algunos de sus síntomas mencionados estarán presentes; la boca huele excesivamente mal; la membrana es obscura y tiene una tendencia gangrenosa. Algunas veces, al principio de la enfermedad, se observará esta característica: el enfermo sólo puede deglutir los líquidos; désele leche y la tomará; dénsele alimentos sólidos y los rechazará.

Ailanthus debe ser comparado con Baptisia en los estados tifódicos, la escarlatina y la difteria. Produce un estupor aún más profundo que este último remedio; hay un escurrimiento nasal acentuado, escoriante, acuoso que inflama, el, labio superior. La erupción, si existe, es de tinte purpurino, lívido, demostrando en esta forma el estado de envenenamiento de la sangre.

Deseo que graven ustedes en su mente la necesidad de correlacionar con propiedad a Gelsemium, Baptisia, Rhus toxicodendron y Lachesis. Estos medicamentos presentan cuadros clínicos tan precisos, que recordados con oportunidad cuando se hace necesario y usados de acuerdo con las indicaciones sintomáticas, constituyen un valioso grupo de medicamentos en el tratamiento de diversas enfermedades.

Dd solanaceas

Entre estas contamos a Belladonna, Hyosciamus y Stramonium, que son midriáticos y acronareóticos. Solanum nigrum. Tabacum, Dulcamara y por último a Capsicum que tiene propiedades acres.

Las drogas que constituyen este grupo de medicamentos, presentan gran semejanza en sus sintomatologías respectivas. Los tres primeros Belladonna, Hyosciamus y Stramonium son de uso corriente en la practica ordinaria. Difícilmente hay en alguno de ellos un síntomas que no pueda ser encontrado en algunos de los otros. Sus semejanzas son, en efecto, casi una identidad que perpleja.

He arreglado los medicamentos en el cuadro no según la botánica, sino más bien según sus relaciones medicinales. Por ejemplo, las cuatro primeras Belladona, Hyonsciamus, Stramonium y Solanum nigrum, afectan de modo prominente al cerebro y poseen propiedades narcóticas; por lo tanto, constituyen un grupo.

En seguida tenemos a Tabacum que también posee propiedades narcóticas, pero que también obra sobre otros órganos del cuerpo además del cerebro. Después viene Dulcamara, que contiene una pequeña cantidad de Solanina y que es ligeramente narcótica. Una gran cantidad de esta droga sería necesaria para producir los efectos soporíferos que se obtienen con Stramonium o Hyosciamus. Finalmente tenemos a Capsicum que decididamente es acre e irritante. Colocado sobre la piel obra como un vejigatorio o contrairritante. Posiblemente tiene algunos efectos narcóticos, pero difiere casi en total de los otros miembros de este grupo. Las semejanzas entre los tres primeros son tan notables, que no es conveniente prescribirlos uno después del otro. Hay algunos síntomas de Balladonna y Hyosciamus, que son opuestos, no tanto por la fraseología que se usa en su descripción de tal modo que pueden leerse casi exactamente iguales, sino por el hecho de que resultan actuando en sentido opuesto; consecuentemente algunas veces se antidotizan uno al otro con especialidad en lo que se refiere a los síntomas de la piel.

Belladonna

Belladonna obra sobre los esfínteres produciendo espasmos; sobre los nervios, irritando los centros; paralizando los nervios periféricos; desordenando la circulación siendo esto peor en el cerebro y también por desorden sobre la circulación sanguínea produce fiebre. Las afecciones que produce Belladonna son violentas e intempestivas, generalmente a acompañadas de síntomas cerebrales. Produce inflamación; hiperemia más marcada en el cerebro; obra sobre las celulas cerebrales.

La Belladonna o "Sombra mortífera de la noche", fué conocida en el mundo médico, desde 1500 años antes de Jesucristo. Los venecianos la llamaron "Yerba bella-donna", por la circunstancia de que las señoras la usaron como cosmético en agua destilada, para dar brillo a los ojos y enrojecerse las mejillas. Esta planta, con especialidad las hojas, produce el bien conocido alcaloide Atropina aunque en proporciones variables. La Belladonna es altamente venenosa para el hombre, aunque algunos herbívoros pueden comerla impunemente.

Estudiada como veneno, Belladonna produce los siguientes síntomas:

Ojos secos e inyectados; cara turgente, roja y caliente; piel escarlata salpicada de papilas muy semejantes a las de la escarlatina; violentas congestiones, especialmente cerebrales; boca y garganta con sequedad molesta; esta última sensación se extiende hacia abajo,

obligando al envenenado a deglutir con frecuencia; espasmos sofocantes de las fáuces y la glotis. La sed es violenta, sin embargo, el agua la agrava; vértigo, confusión, alucinaciones y finalmente estupor. Las pupilas están tan marcadamente dilatadas, que el iris difícilmente es visible.

Belladonna dilata la pupila estimulando el simpático. Physostigma la contrae irritando el tercer par craneano y Gelsemium la dilata paralizando este mismo par nervioso.

Hay agitación muscular; convulsiones. Estos casos de envenenamiento no son poco comunes en Europa, de donde la planta es nativa y sus frutos han sido confundidos con las cerezas. En América se la toma accidentalmente o por intentos de suicidio. Para combatir el envenenamiento es nesario emplear la sonda gástrica, los eméticos de agua caliente de mostaza y el café fuerte sin leche ni azucar.

La Belladonna, como remedio homeopático es casi tan viejo como la misma Homeopatía. Nuestra sintomatología recogida por las experimentaciones y por los casos de envenenamiento, nos permite emplearlo con certeza matemática, por lo que toca a la selección de la droga. Pero como todos los policrestos, se ha abusado de él, sin cuidado y los prácticos lo dan con frecuencia, cuando sus semejanzas con el caso que tratan, apenas son superficiales o parciales. De entre todos los medicamentos, Belladonna tiene en más alto grado el poder de producir efectos opuestos.

Belladonna ha sido tan frecuentemente mencionado en las anteriores conferencias, en comparación con los otros medicamentos, que seguramente ya estamos familiarizados con él. Por esta razón muchos de sus síntomas pueden ser mencionados en breve revista. Pero antes de todo, voy a hablar del carácter general de Belladonna. Parece que se adapta mejor a las personas gordas y flemáticas, de hábito pletórico, propensas a congestiones, especialmente cefálicas; algo semejante a lo que sucede en Calcarea ostrearum, sin la palidez de este medicamento.

Los pacientes de Belladonna son alegres y de buen humor cuando están sanos, pero se vuelven excesivamente irritables e insoportables cuando están enfermos. Esta agradable sociabilidad que los hace tan amenos, parece convertirse en un estado completamente opuesto cuando les aflige alguna enfermedad. También se adapta a los niños precoces, de cabeza grande y cuerpo pequeño, pudiendo ser escrofulosos, probablemente mofletudos y con hipertrofia de los ganglios. Aprenden rápidamente lo que se les enseña; el sueño no es natural; la cabeza está caliente y las mejillas rojas; gritan durante el sueño. Para que esté indicado Belladonna en estos niños, es necesario que estén presentes los síntomas cerebrale. Puede haber alguna irritación cerebral, como lo manifiestan los subsaltos musculares, la irritabilidad, el mal humor, e incluso una inflamación manifiesta de las meninges.

Una particularidad de Belladonna, es la facultad de excitar la

contracciόm de las fibras circulares de los vasos sanguíneos; la contracción de los esfínteres, etc. Esta cualidad universal de Belladonna tiene sus demostraciones en la constricción de la garganta que empeora por los líquidos; constricción del esfinter anal, que por la urgencia, tenesmo y presión en el recto, sugiere el empleo de Belladonna en la disentería; constricción espasmódica del cuello uterino retardando el parto; deseo frecuente e ineficaz de orinar, con micción poco abundante.

Las afecciones en que Belladonna está indicado, son agudas repentinas y violentas. La notable rapidez del principio del padecimiento, debe al instante sugerir a Belladonna. Por ejemplo : un niño está perfectamente bien al irse a acostar; pocas horas después comienza a gritar durante el sueño y pronto despierta con síntomas alarmantes, tales como contracturas de los músculos, irritación cerebral, inquietud, no puede calmarse, constantemente se mueve, con especialidad los brazos. Todos estos síntomas, pueden hacernos pensar en Belladona.

Del mismo modo en las inflamaciones que se presentan repentinamente y son casi abrumadoras por su intensidad, recordaremos el uso de Belladonna. Podemos pensar en este medicamento, en los abscesos, cuando la supuración se desarrolla con la rapidez del relámpago, ya se trate de un absceso de la amígdala, de un divieso o de cualquiera otra clase de abscesos. De aquí su indicación en la erisipela flegmonosa, que rápidamente avanza a la supuración. Las regiones afectadas se hinchan con rapidez; el pus se abre camino a través de los tejidos, entre los musculos. La vertiginosa rapidez del ataque nos debe hacer pensar en Belladonna. Los dolores responden completamente a este carácter del medicamento. Se presentan repentinamente y duran más o menos tiempo; después cesan tan repentinamente como aparecieron. Este es el carácter general de Belladonna.

Belladonna obra sobre el tejido muscular y sobre las articulaciones. Es uno de nuestros mejores remedios en el reumatismo agudo y cronico. Estos dolores son cortantes y desgarrantes y se extienden a lo largo de los miembros, como relámpago. Las articulaciónes inflamada; hay fiebre reumática con dolores que atacan a la nuca, a los hombros y a la parte superior de los brazos. Es uno de nuestros mejores medicamentos en la tortícolis reumática ocasionada por cortarse el pelo, mojarse la cabeza o el cuello o exponerse a una corriente de aire.

La acción de Belladonna sobre el cerebro, debe ser comprendida antes de seguir adelante. Al revisar los síntomas de la droga, me parece que no produce una inflamación de las meninges, sino más bien los síntomas colaterales de la inflamación. Tenemos a Aconitum que produce una positiva inflamación de las meninges, con aumento de la exudación; a Bryonia, que produce inflamación con exudación de leucocitos y plasma sanguíneo, reproduciendo el cuadro perfecto de la meningitis. Belladonna parece más bien producir solamente

congestion; los vasos sanguíneos sobrecargados, parecen haberse roto y producido pequeños puntos rojizos o equimóticos en los tejidos, acarreando de este modo una irritación congestiva del cerebro por debajo de la serosa. Si la exudación sigue a esta irritación congestiva, es serosa, justamente lo que sucede en la congestión venosa. No es la exudación inflamatoria rica en plasma, que se observa bajo la acción de Bryonia, Apis y Sulphur.

No obstante, Belladonna produce tantos síntomas colaterales de irritación cerebral, que nos la encontramos indispensable en este estado.

¿Cuáles son los síntomas particulares que la indican? En primer término la congestión cefálica que en su más moderada forma, puede ser simplemente una sensación de calor en la cabeza, estando los pies fríos. Otras veces en sus más violentas formas, con la cara roja y los ojos inyectados, el enfermo se queja de una intensa cefalalgia pulsátil, pudiendo estar somnoliento o muy insomne. Con frecuencia estos síntomas alternan, es decir: el enfermo está somnoliento y cae en pesado sueño, despertando después con sobresalto o gritando y dando demostraciones de irritación cerebral, tal como movimientos de los miembros y contorsiones de músculos aislados, y cuando esta forma de irritación avanza, los ojos se ponen muy rojos dando a la esclerótica aspecto de carne cruda.

Las carótidas laten tan violentamente que sus movimientos se perciben con claridad. Esta congestión conduce a una irritación inflamatoria. Hay intensos latidos en la cabeza con dolores agudos, que obligan a gritar al paciente por su intensidad. Estos dolores aparecen con la rapidez de un relámpago y desaparecen con la misma rapidez que se presentaron. Al principio, el enfermo no puede dormir. Claramente se le ve somnoliento y sin embargo, le es imposible conciliar el sueño. A medida que el proceso avanza, particularmente en los niños, hunde la cabeza en la almohada extendiéndola hacia atrás y efectuando movimientos de rotación; se nota ligero estrabismo; las pupilas están dilatadas; rechina los dientes; luego la cara se pone de un rojo encendido o puede ser la congestión tan violenta que tome un color purpurino. Si se trata de un niño, en quien la fontanela anterior no ha cerrado todavía, puede palparse tensa y sobre- saliendo a la convexidad del cráneo, latiendo y moviéndose a cada batimiento cardiaco. Las convulsiones se presentan con frecuencia particularmente en los niños, siendo éstas violentas en extremo, contorsionando el cuerpo en todas las formas posibles con predominio del opistótonos; la orina bien está escasa o suprimida. Los diferentes síntomas objetivos y subjetivos que aparecen en este estado son los siguientes: primero, el enfermo brinca durante el sueño o aún estando despierto; al cerrar los ojos, es muy propenso a ver visiones anormales, que desaparecen generalmente al abrirlos; otras veces tiene la sensación de como si fuera cayendo. En ocasiones, si el enfermo es un niño, despierta repentinamente tendiendo las manos al espacio y temblando como si

hubiera sido espantado. Algunas veces ese síntoma es debido a los sueños, otras a la cefalalgia, que por su intensidad, despierta al niño con gran alarma, resultando en otras, de sensación que experimenta el enfermo como si fuera cayendo.

Solemos encontrar a los enfermos con esta irritación cerebral, y yaciendo en estado de estupor; apenas pueden ser despertados y cuando se logra, están siempre violentos, incómodos pegando a los que están cerca de ellos y desgarrando sus ropas; todas estas evidentes demostraciones de excitación, si no se deben a un estado de inflamación verdadera, por lo menos a un estado que se aproxima a ella. En la inflamación cerebral o de sus membranas, Belladonna debe ceder su lugar a otros medicamentos, cuando la exudación se ha presentado, ya se trate de una meningitis simple o tubercúlosa. Hay pocas relaciones entre Belladonna y la meningitis tuberculosa. Esta es lenta en su evolución, por lo que al instante debemos pensar en Sulphur, Calcarea ostrearum, Apis y otros medicamentos de acción más profunda y más lenta que Belladonna. Nuevamente, cuando la exudación se ha presentado, como lo indican la persistente rotación de la cabeza y los gritos estridentes, débese recurrir a otros remedios, principalmente a Apis. Bryonia, que se indica después de Belladonna, cuando la cara está roja por la congestión, o alternativamente roja y pálida. El más ligero intento de mover al niño le hace gritar de dolor; las pupilas no reaccionan con rapidez a la luz, el niño mueve la boca como si estuviera masticando o mamando. Las samejanzas entre los dos medicamentos son tales, que a menudo conducen a una elección errónea. Ambos remedios producen avidez al tomar el agua; los dos producen grito con dolor y tienen agravación por el movimiento y constipación. A veces nos encontraremos con muchas dificultades para distinguirlos.

Distinguir a Belladonna de Aconitum, es más fácil; las fiebres producidas por las dos drogas se diferencian de la siguiente manera: Belladonna no produce fiebre de un modo primitivo por su acción sobre el sistema nervioso simpático; Aconitum, si la produce. Belladonna obra secundariamente sobre el sistema nervioso simpático y primitivamente sobre el sistema cerebro-espinal; de aquí que deberá usarse solamente cuando éste esté incluído en la afección, lo que en los niños sucede muy al principio del caso. En los adultos la enfermedad tiende a iniciarse con fiebre, presentándose enseguida los síntomas cerebrales, por los que Belladonna, puede ser el medicamento de elección. En el comienzo de la fiebre, es de preferirse Aconitum, cuando hay intensa zozobra mental con inquietud, incomodidad, temor a la muerte, piel caliente y seca, pulso lleno y saltón, algunas alucinaciones, gritos durante el sueño o musitación y palabras sin sentido que pertenecen al estado febril. Estos síntomas cerebrales resultan de la temperatura elevada y no de la inflamación directa del cerebro: pero supóngase que el caso progresa hasta invadir al cerebro; la piel se calienta hasta casi quemar al palpar al enfermo; al levantar las ropas de la cama, un

vapor caliente se percibe; esa es la clase de calor que produce Belladonna. Otras veces un ardor caliente, con particularidad en la cabeza y en la cara, acompañando a esta fiebre; vemos que un sudor caliente se mantiene en gotitas sobre la frente (que no es tan característico de Aconitum). Aunque los dos medicamentos pueden distinguirse por el hecho de que Belladonna produce sacudimientos en el sueño, alucinaciones, visiones y deseo de la muerte en vez de temor a ella. Esto sucede con frecuencia en la fiebre reumática; toda la economía parece estar afectada produciendo una fiebre general con dolor en las articulaciones, que van de un lugar a otro. Esta fiebre casi siempre va acompañada de sudores agrios, que de cualquiera intensidad que sean, no mejoran. El enfermo parece empeorar por el sudor y mientras más suda, menos probabilidades hay de mejoría. Aquí, Aconitum no dará resultados, pero Belladonna si. Cuando la fiebre ha sido abatida parcialmente y la transpiración todavía continuúa, Mercurius es el remedio más apropiado que le sigue.

En los tipos tifódicos de fiebre, Belladonna está indicado algunas veces en el comienzo de la enfermedad; en el estadio de exitación, cuando la congestión cerebral predomina. Encontramos delirio furioso, con gritos y esfuerzos violentos por escaparse de la casa o de la cama; la cara está roja, ya de un rojo encendido, o profundo acercándose al purpurino; las pupilas están dilatadas y la conjuntiva inyectada; el enfermo está muy temeroso, imaginándose que toda clase de accidentes le van a suceder; la orina es escasa y cuando es expelida tiene un color amarillo intenso, con o sin sedimento. Los pies están propensos a enfriarse; el paciente cae en profundo sueño con ronquido; no se trata de un sueño tranquilo porque hay la tendencia a ir acompañado de manifestaciones de irritación cerebral, como sacudidas musculares, temblores y gritos. No importa lo profundo que el sueño pueda ser, nunca es un sueño tranquilo y silencioso, y si lo es, Belladonna no será el remedio indicado. Veremos por esto que Belladonna está indicado, no en los cambios cerebrales producidos por el envenenamiento de la sangre, sino en los que resultan de la congestión o de la inflamación. Cuando la enfermedad ha progresado al grado de provocar alteraciones en los humores del organismo, Belladonna está cada vez menos indicado a medida que los cambios avanzan; entonces tendremos necesidad de recurrir a otros medicamentos, tales como Hyosciamus, Rhus toxicodendron, Lachesis y otros.

Algunas veces hay un estado diferente al ya descrito, en el que Belladonna puede ser el medicamento de elección. La cara está pálida en vez de estar roja. Ahora bien, esta indicación es justamente tan crara Balladonna como cuando la cara está roja; ordinariamente hay al mismo tiempo irritación cerebral y estrmecimientos cuando el enfermo duerme. Esto tiene lugar generalmente en el cólera infantil, durante la dentición, en cólico y en afecciones semejantes. El pulso es lleno y duro, como bajo la acción de Aconitum o lento. Es lento

cuando la congestión cerebral es capaz de producir alguna compresión del cerebro. Aquí de nuevo encontraremos un ejemplo de los efectos alternantes de Belladonna. El pulso puede ser rápido por algunas horas y después lento, y así alterna.

Las cefalalgias de Belladonna son nerviosas y congestivas. El vértigo también es congestivo; el enfermo siente como si se cayera hacía adelante, o repentinamente cae hacia atrás inconsciente. Las cefalalgias nerviosas son unilaterales, afectando el lado derecho; empeoran de las cuatro de la tarde a las tres de la mañana siendo más intensas al acostarse; en el cerebro hay la sensación de como si se tuviera agua que se mueve; parece como si se produjera ruido en el cerebro, con agravación por la luz, el ruido o cualquiera sacudida desagradable. Hay vómitos; imposibilidad de permanecer tranquilo; está agitado; las cefalalgias congestivas son de carácter pulsatil, con agravación al inclinar la cabeza hacia la parte más congestionada del cerebro, los dolores son a menudo de carácter hiriente y punzante, volviendo casi loco al enfermo. Cuando todo el cerebro está afectado, el enfermo la sostiene, como para impedir de este modo que el peso lo doblegue; al mismo tiempo que se presenta este dolor, generalmente la cara está roja y hay un violento latido de las carótidas. La mente con frecuencia está afectada, el enfermo llega a ser delirante, turbulento y excitado y tiene toda clase de alucinaciones.

Ya hemos visto cómo puede estar indicado Belladonna en las inflamaciones cerebrales. Es también un medicamento de mucho valor en las inflamaciones de otras partes del cuerpo. Por ejemplo, lo encontramos como el mejor, aun cuando por ningún motivo el único remedio, en la otitis media. Esta afección a veces nos confundirá; los síntomas son muy intensos; el niño se sostiene la cabeza con las manos y puede creerse erroneamente que la afección ahí radica. Los dolores son terebrantes, desgarrantes y de carácter atormentador. Estos caracteres necesariamente son debidos a las relaciones anatómicas de la región afectada. Se presentan repentinamente y son muy violentos; parecen herir el otro oído o la cabeza, con zumbidos y rugidos. Ahora, si se inspecciona el oído, se encuentra el tímpano prominente hacia afuera; sus vasos sanguíneos muy dilatados y de hecho tiene un aspecto marcadamente inflamado. Hay una rápida formación de pus que busca salida ya sea perforando el tímpano, por la trompa de Eustaquio o hacia la cavidad craneana. En este último caso producira síntomas alarmantes, sino es que mortales. Es nuestro deber reconocer este padecimiento desde un principio, cuando tadavía hay oportunidad de salvar el oído. Creo que Belladonna será nuestro mejor medicamento para los primeros estadios de la enfermedad; más tarde, estrán indicados otros como Hepar y Tellurium.

Tellurium produce inflamación del oído medio con ruptura del tímpano y evacuación de pus, que desde luego puede ser loable pero en seguida se pone muy fétido, teniendo un olor parecido a la

salmuera.

En las inflamaciones de los ojos, como en la conjuntivitis o escleritis está indicado Belladonna por lo repentino de los dolores y del ataque y por la violencia de los síntomas. Hay una gran intolerancia a la luz. Los ojos se sienten como si estuvieran enormemente hinchados. La conjuntiva está de un rojo encendido; estos síntomas proporcionan un cuadro perfecto de Belladonna. Parece atacar el ojo derecho más que el izquierdo. Es la congestión intensa, la que nos conduce a la elección de Belladonna en las afecciones de los ojos; la misma observación se aplica igualmente a las neuralgias en y alrededor de los ojos.

Spigelia produce una variedad de dolores en el ojo, semejante a los de Belladonna, pero son del lado izquierdo carecen de la intensa congestión que produce Belladonna.

Amylinum nitrit, es semejante a Belladonna, estando indicado cuando los ojos y la cara están rojos.

Paris cuadrifolia es excelente cuando hay dolores en los ojos; como si estos fueran restirados hacia atrás por unas cuerdas; los globos oculares se sienten muy grandes (como en Spigelia).

Prunus produce dolores compresivos, es decir, una sensación de como si los ojos fueran prensados entre dos pinzas o dolores agudos y cortantes a través y alrededor del ojo.

Bajo la acción de Belladonna se inflama la glándula parótida, especialmente la derecha; hay punzadas que se extienden al oído; la glándula está hinchada caliente y roja; el orificio del conducto de Stenon está doloroso, como erosionado; la saliva es espesa, gomosa, amarillenta y tenaz; el moco cubre la boca y la garganta de una capa espesa y pegajosa; la lengua está blanca y agrietada.

Belladonna produce inflamación de la garganta. La lengua de Belladonna es generalmente de un color rojo encendido; las papilas prominentes, dándole esto un aspecto semejante a la fresa (de aquí que se le llame lengua de fresa). Se encontrará a veces que el dorso de la lengue está cubierto de una delgada capa blanca, a través de la cual se muestran las papilas prominentes y rojas. Pero, a medida que el caso progresa, esta capa se desprende, dejando un color rojo encendido y la lengua intensamente inflamada.

La garganta es un punto prominente de ataque en las patogenesias de Belladonna. La inflamación que produce es de un tipo muy común. Inspeccionando el interior de la garganta, se encontrarán las fauces inflamadas y de un rojo encendido las tonsilas, particularmente la derecha, agrandada y tendiendo la enfermedad a propagarse al lado izquierdo. Todos estos síntomas tienen la misma rapidez que notamos en toda la sintomatología de Belladonna y de la que ya hablamos Hay notable constricción de las fauces y la glotis, por lo que cualquier intento de deglutir, es seguido de una constriccion repentina de la garganta y expulsión de los alimentos por la nariz y boca. Si el enfermo intenta beber, en el momento en que el agua toca las fauces es expulsada y escapa por donde puede. El enfermo

parece sentirse peor al deglutir los líquidos, que al deglutir los sólidos o saliva. Las tonsilas supuran rápidamente. Los ganglios del cuello comunmente están infartados y se sienten como almendras, pero muy duros y sensibles.

Algunas veces se encuentra sobre los pilares una exudación blanca o perlada, que examinada, se ve que es moco y no fibrina. Por lo tanto, hablando en términos correctos, no hay semejanza entre la inflamación que produce Belladonna y la que es característica de la difteria o crup membranoso; de tal manera que cuando Belladonna sea administrado en la difteria, será basándose en otros síntomas que no sean los que corresponden a las membranas. El carácter general de la difteria es el de un envenenamiento de la sangre. Cuando prescribimos pues, Belladonna en dicha enfermedad, debemos tener la certeza de que es el medicamento indicado, o de otro modo se pierde un tiempo valioso. Ocasionalmente Belladonna puede ser el medicamento, en los primeros estadios, cuando la violencia del ataque la requiere.

Me permito recordarles que Lycopodium afecta la tonsila derecha produciendo elevada temperatura y gritos durante el sueño y al despertar, el enfermo está malhumorado e irritable; estos síntomas los encontramos también en Belladonna pero estaremos bien seguros, cuando prescribamos este último medicamento, de que no es Lycopodium el indicado.

Nuevamente deberemos hacer recordación de Apis, como un magnífico medicamento en la difteria: la exudación más frecuentemente está sobre la amígdala derecha; la garganta está rojo-encendida y rosada; la lengua roja; la fiebre muy elevada; la piel seca y caliente; el pulso acelerado y el enfermo muy inquieto. Pero en la tonsilitis o amígdalitis folicular supurada, Belladonna encabeza la lista. Este medicamento supera en alto grado al valor terapéutico de Apis, porque obra sobre el parenquíma de la glándula y cuando la inflamación corresponde a Apis esta es superficial y no afecta más que a la mucosa. En las afecciones de la garganta, Belladonna forma un pequeño grupo interesante con Hepar, Mercurius, Silicea y Sulphur.

Cuando después de la administración de Belladonna el pus se forma en la amígdala, habiendo fracasado este remedio, como lo indican la rigidez, los escalofríos y los dolores agudos y lancinantes como latido, será necesario cambiar este remedio por Hepar; solo así se podrá llegar a evitar la formación del absceso.

Debe hacerse uso de Mercurius si el pus ya se ha formado, si la amígdala ha aumentado de volumen hasta invadir los órganos vecinos y la respiración se hace difícil. Cuando el pus ya se ha manifestado, Mercurius dado a dósis bajas y repetidas, favorecerá la evolución rápida del absceso, mejorando todos los síntomas. Si damos Mercurius desde un principio, se alargará mucho la duración del caso.

Otras ocasiones tendremos necesidad de recurrir a Silicea, cuando el

absceso se ha evacuado y no cicatriza. El pus continúa formándose y se vuelve obscuro, fétido y desagradable al gusto.

En algunos casos Silicea falla; entonces deberemos intercalar alguna dósis de Sulphur, que generalmente produce el efecto deseado; puede haber necesidad de recurrir a Fluoricum ac. Hay otro medicamento del que he hecho uso y es Amígdala amara. Esta droga produce una coloración roja de las fauces, úvula y tonsilas, con dolores agudos y produciendo una dificultad considerable para deglutir; algunas veces son tan intensos que hacen gritar al enfermo. Si estos síntomas están presentes, puede hacerse uso de este medicamento en la difteria. Yo mismo he curado casos de esta enfermedad con Amígdala amara., sola, cuando había este color rojo sombrío de la garganta los dolores agudos, repentinos y marcada postración general. Amígdala produce la sensación de postración y de fatiga que sobreviene en los primeros días de la difteria.

Belladonna tiene aplicación en la esofagitis con sensación de constricción; hay dolor al deglutir y al respirar. Veratrum viride, Rhus toxicodendron y Arsenicum, son también medicamentos de utilidad en la esofagitis.

En los síntomas gástricos, Belladonna está indicado cuando los dolores son como de calambres, empeoran durante la comida; son dolores punzantes, que obligan al enfermo a echarse hacía trás y a detener la respiración; hay ardor; estos dolores gástricos siempre irradian a la columna vertebral; la presión en el estómago es un síntoma prominente; empeora después de comer y también se presenta a veces al caminar.

Calcarea ostreanum produce presión como de una piedra, que mejora por el movimiento. Chininum arsenicosum ha producido esta presión en el plexo solar con sensibilidad requíden, justamente hacia atrás.

Bismuthum produce gastralgia que irradia de la garganta a la columna vertebral se mejora por echarse hacía atras. En esto es muy semejante a la acción de Belladonna, pero carece de la extremada nerviosidad y excitación febril. En Bismuthum el enfermo es propenso a enfriarse; la cara está pálida y el dolor puede ir acompañado de ansiedad e inquietud.

En la inflamación del abdomen, encontramos algunas veces indicado a Belladonna; por ejemplo en la peritonitis, vaya o no acompañada de metritis y sea o no de origen puerperal. Los síntomas que la indican, son los siguientes: al principio timpanismo; el abdomen está agrandado como un tambor; muy sensible al tacto, de tal manera que el enfermo desea que toda la ropa de la cama se le quite. La menor trepidación en su pieza, le agrava; si alguien inesperadamente tropieza contra la cama, el enfermo se queja amargamente de dolor; notaremos también el calor molesto de que ya se ha hablado. Al palpar el abdomen del enfermo, lo notaremos extremadamente caliente; al levantar las ropas de la cama, notaremos la salida de un vapor caliente del que ya se ha hecho referencia. Hay marcada

irritación cerebral. Los loquios son propensos a escasearse o suprimirse.

Tilia europea es una droga, que esto y seguro no ha recibido el debido crédito. Presta utilidad en la metritis puerperal, cuando hay intenso adolorimiento en el útero; hay también marcada pesantez con sudor caliente que no mejora.

Una droga muy comunmente usada por los alópatas, es Theribinthina. Los síntomas que ha producido en realidad, son los siguientes: pesantez en la región uterina, ardor como de fuego en el epigastrio, ardor al orinar; orina revotada y lodosa; en estos casos la lengua tiende a secarse y enrojecerse.

Para esta sensación de adolorimiento uterino, el Dr. Jeanes empleaba una preparación de miel de abeja con sal, Mel cum sale; la usó a la tercera y sexta dilución. El síntoma característico para su elección era uná sensación de adolorimiento en la región hipogástrica, irradiando de ilión a ilión. Esta es una indicación importante en los desplazamientos uterinos, y en el comienzo de la metritis.

Bajo la acción de Belladonna, la orina es amarilla y clara, turbia, con sedimento rojo o profusa. Puede haber micción involuntaria durante el sueño; este último detalle sugiere su uso en los niños; con frecuencia será de valor cuando concurren los otros síntomas. No hay una verdadera atonía, síno más bien una relajación de los esfínteres y como un trastorno del equilibrio, una superactividad de las fibras musculares longitudinales. Hay una sensación en la vejiga de como si una bola rodara (síntoma de Lachesis y quizá de Lycopodium); hay tenesmo vesical, estranguria, orina, obscura y turbia y de un rojo encendido; frecuente deseo de orinar con micción escasa. En la eneuresis con relajación manifiesta, véase Plantago major, Causticum, etc. Belladonna puede ser seguido en estos casos de Calcarea ostrearum, Sulphur o Silicea. Kreosotum está indicado en la incontinencia, especialmente cuando el enfermo orina, el soñar que está efectuando este acto. Debe también tenerse en cuenta a Hyosciamus.

Tenemos que hablar a continuación de la acción de Belladonna, sobre la piel. Produce primeramente un eritema, una rubicundez viva, escarlata de la piel; esta se pone excesivamente sensible al tacto. Algunas veces el eritema consiste en un rojo uniforme en la superficie de todo el cuerpo, tal como se presenta en la escarlatina de tipo Sydenham. Otras veces es de una apariencia erisipelatosa, presentándose en bandas que parten de un punto central e irradian en todas direcciones, siendo el color generalmente muy encendido; la hinchazón es rápida, con pronta invasión del tejido celular. Con eso tenemos un verdadero cuadro de la erisipela flegmonosa; con estos síntomas no se encuentra con frecuencia desarrollo de vesículas o pústulas; en lugar de esto, hay una superficie lisa, brillante y tensa. Los dolores son violentos y agudos; de carácter lancinante y punzante y ordinariamente acompañados de muchos latidos, con particularidad, si las partes profundas han sido invadidas por la

inflamación.

En los casos en que la erisipela invade la cara, principiairá casi siempre por el lado derecho, con tendencia a invadir el izquierdo; hay casi siempre propensión a la irritación cerebral; mientras más jóven es el enfermo, más marcada es esta tendencia. Es necesario no confundir esta irritación cerebral con la metastasis de la erisipela al cerebro. Se trata de una simple irritación producida ya por la fiebre, por la intensidad del dolor, o por el envenenamiento de la sangre o por los tres factores juntamente, pero no es una verdadera metástasis. Si la metástasis se presenta, Belladonna aún podria estar indicado. En el caso de que Belladona falle, contamos con otros medicamentos, por ejemplo Lachesis cuando la metástasis cerebral no ceda al uso de Belladonna; la cara está de un tinte purpurino o azuloso, más bien que rojo encendido, como sucede en esta última droga. El paciente está más débil; el pulso es más rápido y carece de fuerza y hay más somnolencia que en Belladonna.

Otro remedio concordante es Crotalus, muy semejante a Lachesis tan semejante, que no les podría dar ningún punto de distinción entre los dos.

Se debe pensar en Cuprum para estas metástasis, si los síntomas son espasmódicos y violentos. El enfermo está amenazado de convulsiones; hay fuertes contracciones de los músculos flexores.

Ailanthus es de recomendarse cuando hay profundo estupor y la cara está lívida y jaspeada. Apis y Sulphur también actuarán en este caso.

Volviendo ahora al eritema de Belladonna, sabemos que cuando llega a ser general esta condición, sugiere el empleo del medicamento en la escarlatina. En esta enfermedad está indicado ante todo, por el color rosado brillante de todo el cuerpo y en segundo lugar, por la irritación cerebral de naturaleza activa. Los síntomas van desde el simple despertar con sobresalto del sueño o las sacudidas de grupos musculares aislados, hasta el delirio más violento, con gritos agudos y el enfermo salta de la cama. La erupción misma debe ser lisa.

Belladonna no produce rash miliar; el vómito es violento; Belladonna produce vómitos tan intensos, como Ipecacuanha; está indicado particularmente en el vómito de orígen cerebal. Los síntomas de la garganta son prominentes. Hay hinchazón rojo-brillante de la garganta; las tonsilas están brillantes; la lengua tiene la apariencia de la fresa o si está cubierta, la capa es delgada y las papilas sobresalientes se muestran a través. El pulso es lleno, fuerte y acelerado, hay gran agitación, como debe suponerse. Puede haber inflamación de los ganglios, particularmente del cuello. Puede haber supresión de la orina o ser esta profusa. Uno u otro caso de estos, es incidente producido por Belladonna. La somnolencia o el sueño no es un coma claramente marcado. No es la somnolencia o el estupor que se desarrolla en el envenenamiento de la sangre, estado en el que el cerebro es tan impropiamente provisto de oxígeno, que pierde su actividad. Esta no es la condición de Belladonna; el sueño de Belladonna puede ser profundo; el enfermo puede roncar; puede

dormir tan pesado como un leño, pero el sueño no es tranquilo y pasivo. El enfermo grita durante el sueño los músculos se contraen, la boca está en constante movimiento como si estuviera masticando; hay rechinamiento de dientes. De hecho hay casi siempre síntomas que revelan una irritación cerebral de carácter activo.

Cuando el enfermo despierta de su sueño se violenta mirando en rededor de su pieza de un modo feroz y golpeando a los que están a su alcance. Cuando sin embargo, la enfermedad desde un principio es de un tipo maligno o llega a serlo a despecho del uso de Belladonna nunca será demasiado pronto para cambiar este medicamento. Necesitamos al instante seleccionar otro, tal como Lachesis, Rhus toxicodendron o Hyosciamus.

Lachesis tiene en estos casos, muchos síntomas parecidos a los que demandan el empleo de Belladonna. Nos encontramos en los dos remedios el grito durante el sueño, inquietud irritabilidad al despertar lengua de fresa, rubicundez en toda la superficie del cuerpo, supresión de la orina, garganta sensible y vómito. ¿Pero en qué difieren? Difieren en la esencia misma. En el caso de Lachesis la enfermedad es adinámica y el envenenamiento de la sangre es profundo. Los síntomas cerebrales no llegan al furor de Belladonna, pero hay más estupor. La piel no tiene el color eritematoso de Belladonna, sino más bien pálido, purpurino o azuloso; es irregular la erupción y sale de un modo imperfecto. La garganta nos mostrará no sólo los ganglios aumentados exteriormente, sino una inflamación de todo el tejido conjuntivo que rodea las amígdalas al igual que las fauces. Las regiones afectadas son más bien de un color púrpura. Si hay tendencia a la formación de pus fétido, Lachesis estará mejor indicado.

Rhus toxicodendron con frecuencia precede a Lachesis, principalmente cuando la celulitis es una complicación y antes de producirse el tinte purpurino. La inflamación es de tipo adinámico, el rash es miliar. (Véase también Hyosciamus, Stramonius, Lachesis y Bryonia).

Volviendo nuevamente a Belladonna, lo encontramos que algunas veces falla en los casos de escarlatina variedad Sydenham, a pesar de que los síntomas parezcan indicarla. En este caso hay dos remedios en los que es necesario pensar: Sulphur que con la misma intensidad que Belladonna, produce un eritema liso en toda la superficie del cuerpo. Puede estar indicado al principio de la enfermedad. El otro es Calcarea ostrearum, complementario de Belladonna; con frecuencia termina la curación que inicia este medicamento. Por esto lo encontramos indicado en la escarlatina, cuando la erupción sale como la que produce Belladonna, pero comienza a palidecer. La cara también llega a palidecer y abotagarse; la orina es escasa y aún puede estar suprimida y los síntomas cerebrales que sugieren el empleo de Belladonna; pueden también estar presentes.

Lycopodium está indicado cuando en el niño aumenta el estupor;

despierta con terror gritando; está malhumorado y trata de pegar a los que le acompañan.

Otra acción de Belladonna sobre la piel es la producción de forúnculos y abscesos; puede ser aplicado en la mastitis o inflamación de los senos. Está indicado aquí por la violencia de los síntomas, por la rubicumdez irradiante, por los latidos y la tendencia a la supuración. Los mismos síntomas lo indican en los abscesos de cualquier naturaleza y situados en cualquier región del cuerpo. Aún los incordios de carácter específico, pueden necesitar de Belladonna, si los síntomas son violentos como los ya mencionados, prestando en este caso buen servicio, mientras está indicado. También lo encontraremos como medicamento para los forúnculos que se presentan en la primavera.

Puede hacerse uso de Belladonna con éxito en las afecciones del estío, tratándose de niños de corta edad. Lo encontraremos indicado cuando los indicado cuando los niños gritan y lloran hora tras hora sin causa apreciable. También lo estará en la indigestión de los niños asociada a dolores agudos, gritos repentinos, echándose hacía atrás, no hacia adelante como en Colocynthis. Algunas veces el colon transverso está tan dilatado, que forma prominencia hacia adelante como un rodillo en el epigastrio. Estos síntomas, también se presentan algunas veces el cólico de los pintores. Nos encontraremos indicado a Belladonna en la diarrea; se adapta con particularidad a la diarrea disentérica, sobre todo si es a frigore; las evacuaciones van acompañadas de considerable tenesmo (pues debemos recordar que Belladonna tiene gran afinidad por los esfínteres); las evacuaciones son mucosas y sanguinolentas; en las afecciones del estío las evacuaciones son amarillentas o verdes conteniendo bolas semejantes al gis, debido, sin duda a la presencia de grasas y caseína.

Debemos recordar a Belladonna como un complementario de Chamomilla en el cólico y la diarrea infantil.

En la neuralgia estará indicado Belladonna cuando los dolores se presentan de un modo repentino, duran un tiempo más o menos largo y desaparecen también repentinamente; los dolores son lancinantes, quemantes, desgarrates y cambiantes. Empeoran por el movimiento, la luz, el ruido o el más ligero sacudimiento y por acostarse, mejorando por sentarse. En la prosopalgia, el lado derecho es el principalmente afectado, con especialidad los nervios suborbitarios; la cara está caliente y roja. En la ciática, el dolor empeora por la noche en la articulación de la cadera, obligando al enfermo a cambiar de posición. Todos estos dolores, lo mismo que las fiebres, propenden a exacerbarse entre dos y tres de la tarde y nuevamente a las once de la noche. El poder de este medicamento para producir dolores neurálgicos en cualquiera de los nervios raquídeos, ha conducido a recomendarlo en los dolores atroces que marcan el principio de la ataxia locomotriz. En las neuralgias debe compararse con Aconitum, Amyl nitrit. Cactus grand. Verbascum,

Platina y Ferrum carb. Este último medicamento, produce excitación vascular, cara roja, etc., lo que le hace muy semejante a Belladonna.

Belladonna con frecuencia está indicado en el tratamiento de las convulsiones. La epilepsia es fácilmente modificada y a veces curada por este medicamento (1).

Igualmente está indicado en la terrible enfermedad llamada eclampsia puerperal.

En los espasmos de los niños durante la dentición (2). como consecuencia de las erupciones repercutidas, etc., exigen el uso de este medicamento casi diariamente. En todos estos casos, los síntomas cerebrales deben existir en forma predominante: cabeza caliente, cara con aflujo de sangre, carótidas pulsátiles, despertar del sueño con terror y sobresalto, etc., espuma en la boca con olor a huevos podridos. Los movimientos comvulsivos pueden ser una combinación de emprostótonos y opistótonos. El paciente, generalmente un niño, llega a ponerse rígido, se embara, la mirada es fija y penetrante. En los casos puerperales, la mujer está inconsciente y cada dolor despierta un nuevo espasmo. Entre los espasmos la mujer se agita, se queja o llora o bien yace en profundo sueño. En los niños en la época de la dentición, las encías están hinchadas y la boca caliente y seca.

Glonoium es semejante a Belladonna en el trabajo del parto, Chamomilla en los niños malhumorados, cara roja y sudor caliente. Opium en la cara roja-obscura, sopor, especialmente después de un susto.

Vamos a hablar ahora de la acción de Belladonna sobre los órganos genitales femeninos, en los que esta droga obra de un modo decidido. Produce constante y violenta pesantez que empeora por acostarse, mejorando por sentarse. Sepia es su opuesto. Kreosotum tiene pesantez que empeora por el reposo y mejora por el movimiento. En Aconitum también hay pesantez por descansar, que mejora por el movimiento. Bajo la acción de Belladonna la menstrución es prematura y copiosa, de color rojo encendido, acompañada de dolores calamboídeos y desgarrantes en el dorso, los brazos, etc.; cefalalgia batiente. Dismenorrea congestiva, intensamente dolorosa; pesantez, dolor cortante de atrás hacia adelante o viceversa; flujo menstrual que sin ningún motivo aparente es fétido; loquios fétidos también sin causa justificable. Hemorragias uterinas; al salir la sangre se siente caliente; leucorrea con pesantez; cuello del útero espasmódico, pareciendo muy caliente y sensible; dolor en el dorso, como si se rompiera. Los dolores del parto vienen y se retiran repentinamente; dolores violentos pero ineficaces durante el trabajo del parto. Puede hacerse uso de Belladonna durante el parto, cuando el cuello uterino no se dilata, debido a un estado espasmódico del mismo. Los dolores son violentos, produciendo gran angustia, y sin embargo el trabajo no progresa. Al hacer la palpación se encuentra el cuello demasiado rígido y espasmódico. Generalmente unas cuantas dósis de Belladonna serán suficientes

para corregir este defecto. También debe recordarse a Gelsemium en la rigidez del cuello uterino.

Belladonna tiene alguna acción sobre el aparato respiratorio. Produce tos por cosquilleo de la laringe, como si se estuviera inhalando polvo; la cara es roja, los ojos centelleantes; la tos es seca; el dolor se presenta en forma de violentos ataques; tos con resequedad y presión en la parte más elevada del pecho; empeora en las tardes y en la noche, justamente después de acostarse; el esputo es mucoso y estriado de sangre; la laringe está dolorida y caliente al interior; empeora por la presión; hay ardor en el pecho; dolores hirientes producidos por toser o por el movimiento, pero no afectados por la respiración; presión en el pecho y entre los omoplantos, con disnea por caminar o sentarse.

Calcárea también produce tos que se presenta justamente después de acostarse.

Phosphorus difiere de Belladonna en que la irritación es más baja en las vías respiratorias; produce más desolladura y la laringe está dolorosa; empeora por hablar o por la presión. En Belladonna hay solamente adolorimiento a la presión.

En Causticum la tos es de cosquilleo; la voz casi apagada; hay adolorimiento y desolladura en la tráquea pero no en el pecho.

Rumex produce tos seca por cosquilleo en la fosa supraesternal, agravándose por el más ligero aire frío o por la inspiracion profunda.

En Cepa la tos produce una sensación de como si la laringe se partiera; hace inmovilizar al paciente; hay coriza.

Lachesis produce una tos por cosquilleo que se siente más abajo que en el caso de Belladonna, y es agravada por la más ligera presión de la ropa.

Belladonna obra sobre el tejido muscular y también sobre las articulaciones; es uno de nuestros mejores medicamentos tanto en el reumatismo agudo como en el crónico. Las articulaciones afectadas están inflamadas, rojas, brillantes y a menudo tienen vetas rojas que irradian a lo largo de los miembros. Es uno de nuestros mejores remedios para la tortícolis causada por un aire frío, por humedecerse la cabeza o por sentarse con la cabeza y el cuello expuestos a una corriente de aire. Bryonia, Nux vómica y Guaiacum están relacionados, en esta afección. Para la rigidez del cuello uterino recordaremos también a Gelsemium.

Belladonna es complementario de Calcarea ostrearum; es antidotizado por Coffea. Nux vómica y Opium. Hyosciamus antidotiza su abuso en las afecciones de la piel y en la tos.

Stramonium

Stramonium se coloca entre Hyosciamus y Belladonna. Excita el sensorio y pervierte sus funciones; los sentidos especiales están afectados y hay diplopia; los objetos aparecen dobles u oblicuos. Sus síntomas mentales son como siguen: la manía o el delirio son de carácter feroz, estando la cara de un color rojo encendido; los ojos

están inyectados y tienen un aspecto salvaje, aunque no tan intensamente congestionado como en Belladonna. Las alucinaciones aterrorizan al enfermo; ve objetos que brotan de cada uno de los rincones; animales de toda especie y ve que criaturas grotescas se levantan y le aterrorizan. Si el enfermo es un niño, llora por su mamá aún cuando esté cerca; los ojos están abiertos y las pupilas muy dilatadas. Si se trata de un adulto, está decididamente locuaz en su delirio. A veces revela un caracter alegre en su locucidad; otras tiene momentos de horror. Por momentos estará riendo, cantando, haciendo muecas; otras veces estará rezando, implorando ayuda, etc. A menudo tiene fotomanía o deseo de luz; parece tener un gran temor a la obscuridad; otras veces insiste en que está seguro de estar conversando con los espíritus; otras veces la manía toma un carácter estúpido; platica de un modo bromeante y tonto y ríe de sus propios esfuerzos de ingenio. La locuacidad difiere de la de Lachesis. En Stramonium la locuacidad consiste en una simple garrulería, en tanto que en Lachesis salta de un asunto a otro. Durante el delirio de Stramonium como bajo la acción de muchos narcóticos, el paciente con frecuencia intenta huir. Agaricus parece colocarse entre Stramonium y Lachesis, teniendo semejanza con los dos.

Un estado que semeja a la hidrofobia, exige a veces el empleo de Stramonium. En este estado, cualquier objeto brillante produce delirio furioso, espasmos de la garganta y convulsiones terribles. El delirio, con especialidad en los estados tifódicos, es excesivo y parece agotar al paciente de un modo completo.

Los movimientos convulsivos de Stramonium se caracterizan más bien por su elegancia que por su angulosidad; son más bien giratorios que de sacudimiento. Esta condición se nota especialmente en los casos de fiebres eruptivas en los niños, cuando el exantema no se presenta. Stramonium obra mejor que Belladonna en los niños y jóvenes. Tomemos por ejemplo un caso de sarampión: la erupción no sale de un modo normal; el niño está caliente; la cara rojo encendida; está inquieto y grita como espantado tan pronto como se duerme; no conoce a nadie; sus movimientos, aunque convulsivos, no son sacudidas o angulares. Este será un caso de Stramonium.

Semejante a Stramonium en estos casos es Cuprum metallicum que como el primero, tiene agravación al despertar y el mismo terror. Se caracteriza por la violencia de sus síntomas; los movimientos son de carácter francamente angular.

La cara es propensa a tener un color azuloso; está especialmente indicado cuando la erupción se ha entorpecido y aparecen estos violentos síntomas cerebrales.

Otro medicamento también semejante a Stramonium es Zincum metallicum, que igualmente produce gritos durante el sueño y terror al despertar; hay evidencia notoria de debilitamiento, estando el niño tan débil que carece de la fuerza suficiente para desarrollar la erupción.

Otra afección nerviosa que será curada por Stramonium, o al menos

modificada por éste, es el asma nervioso; el enfermo difícilmente puede respirar debido al espasmo; se agrava platicando. También está indicado Stramonium en la ataxia locomotriz; el enfermo no puede andar en la obscuridad o con los ojos cerrados; si intenta hacerlo, vacila y titubea. Las anomalías mentales referentes a las dimensiones, parecen ser características del enfermo de Stramonium. Por ejemplo, se imagina que es muy grande o que tiene un brazo más grande; algunas veces se siente como si fuera doble o como si tuviera tres piernas en lugar de dos. Estos errores en la talla y dimensiones en el enfermo de Stramonium, nos hacen pensar en otros medicamentos, particularmente en Baptisia, sin embargo de no parecerse en nada a Stramonium en sus demás síntomas. Recuérdese que ambos medicamentos tienen esta ilusión sobre las dimensiones. El enfermo de Baptisia se cree doble y lo que es más característico, cree que su cuerpo está reducido a pedazos y trata de reunirlos. Otros medicamentos tienen este síntoma; nos lo encontramos en Petroleum y en Thuja. Bajo la acción de este último medicamento, el enfermo se imagina que es de vidrio y camina cuidadosamente para evitar romperse. Este síntoma puede guiarnos en la indicación de la droga en la fiebre tifoidea.

En la erisipela con complicación cerebral, podemos encontrar indicado a Stramonium cuando la enfermedad toma un carácter adinámico. Los síntomas se parecen mucho a los de Rhus toxicodentron, pero se distinguirá por la violencia de los síntomas cerebrales, el delirio, la inquietud y el grito como de aterrorizado. A pesar de todos estos síntomas, hay poca o ninguna fiebre. Stramonium puede también ser necesario en el principio de la escarlatina, cuando la erupción no brota y el cerebro se afecta pero hay menos fiebre y los síntomas de la garganta que produce Belladonna. Puede haber supresión de la orina, la que con particularidad es característico de esta droga, si esta molestia carece de dolor o de cualquier otro inconveniente.

Como en todos los medicamentos que producen irritación cerebral encontramos rechinamiento de los dientes. Puede haber tartamudeo, que ha sido comparado a la micción espasmódica de los niños, cuando la más ligera emoción les hace orinar a pequeñas gotas; las palabras son proyectadas en una forma análoga; particularmente el enfermo encuentra dificultad al combinar las vocales con las consonantes.

Otro medicamento para el tartamudeo o balbuceo, es Bovista.

La lengua en Stramonium es roja o blanquizca y cubierta de finos puntos rojos, seca y tostada; en algunos casos está hinchada y cuelga fuera de la boca.

Stramonium puede excitar a una ninfomanía marcada, durante la cual la mujer, aunque muy casta en su estado normal, llega a ser excesivamente lujuriosa en sus canciones y en su conversación. Puede llegar a ser muy violenta en sus modales. A menudo estos síntomas tienen lugar en las mujeres antes de la menstrución, en

cuyo caso Stramonium obra de un modo admirable. El flujo menstrual propende a ser abundante revelando esto el alto grado de congestión que se produce en la ninfomanía. Estas mujeres tienen un fuerte olor que recuerda el de los animales en la época de celo.

Me agradaría llamar su atención sobre la diarrea que cura Stramonium. Las evacuaciones son muy fétidas y tienen olor de carne corrompida. Pueden hacerse amarillentas, pueden ser o no obscuras, pero la fetidez es uno de los más importantes síntomas.

La ausencia de dolor es característica de Stramonium, exceptuando los abscesos, particularmente cuando afectan la articulación coxofemoral izquierda, en cuyo caso puede ser tan intenso el dolor, que despierta convulsiones en el enfermo. El antídoto para el envenenamiento por Stramonium es el jugo de limón.

Hyoscyamus niger

Botánica y terapéuticamente, Hyosciamus, en cierta forma es semejante a Belladonna. Este interesante medicamento, aunque inofensivo para ciertos animales, es venenoso para las aves y ha recibido el nombre de "veneno de las gallinas".

Hyosciamus parece adaptarse con especialidad a la manía aguda, a la manía sin signos de inflamación absolutos, a la manía que tiene como característico una extremada excitación del sensorio. El enfermo en tales circunstancias, tiene muchas ideas extrañas, procedentes todas de impulsos anormales. Se imagina por ejemplo que va a ser envenenado; posiblemente rehuse las medicinas que se le ofrezcan, declarando en tono enojoso que éstas le envenenarán. Se imagina que es perseguido por algún demonio o que alguno está tratando de quitarle la vida. Esto lo tiene sucesivamente inquieto; se levanta de la cama para huír de su enemigo imaginario. Los sentidos también están alterados; ve los objetos muy grandes, o de otro modo, de color rojo de sangre. Algunas veces los objetos como si estuvieran muy distintos, es decir, con una nitidez de sus contornos. El enfermo platica de asuntos que tienen relación vida diaria, saltando rápidamente de un asunto a otro como en Lachesis en todo este tiempo, su cara no está notablemente roja; puede estar ligeramente. Las pupilas por lo general están dilatadas. El sueño perturbado; el enfermo permanece despierto en su cama durante largas horas. Cuando la manía persiste, parece caer en un estado de estupor, que sin embargo no es real, porque el más ligero ruido le despierta todas las formas de manía violenta. Cualquiera insignificante impresión produce una excitación del sensorio. Acompañando a estos síntomas hay una debilidad característica; esta misma debilidad se manifiesta por una gran postración a cada intento de moverse o de caminar y por la parálisis de uno o varios músculos después de los ataques de manía. El sensorio se deprime más y más y contesta a las preguntas con lentitud o de otro modo, la respuesta que da no está en relación con la pregunta. Algunas veces estará en estado de estupor, del que pronto puede reponerse y contestará a las

preguntas correctamente, para volver en seguida a su estupor. Con esto hay una especie de estado adinámico cerebral, que resulta de la excitación prolongada, y en este estado nos encontramos todavía el delirio, pero el enfermo está muy postrado; las evacuaciones y la orina escapan involuntariamente; el pulso no es lleno y acelerado, sino que es rápido, depresible e irregular. El estupor es ahora completo; hay fuliginosidades sobre la lengua y los dientes; los pulmones están ingurgitados no por un proceso neumónico sino debido a la congestión hipostática; acompañando a esto hay estertores ruidosos durante la respiración. La boca está abierta; la mandíbula inferior caída y el enfermo yace tranquilo a pesar de la contracción de diversos grupos musculares. Si no se obtiene mejoría este estado pronto es seguido por la muerte. Otras veces el delirio reaparece y los síntomas toman otra forma. El enfermo está alocado y rié de un modo injustificado. Algunas ocasiones, por algunas horas, su fisonomía revelará una expresión de embrutecimiento e idiotez. De nuevo se pone ex cesivamente lascivo, arroja sus ropas e intenta descubrir sus órganos genitales. Los movimientos anormales que acompañan estos síntomas son sobre todo angulares; no son del significativo carácter giratorio de Stramonium.

Otra forma aún, bajo la cual pueden aparecer los síntomas cerebrales de Hyosciamus, particularmente en las mujeres, son los celos y también los efectos de las emociones intensas, como un amor frustado, un susto y otras que son más o menos excitantes y al mismo tiempo deprimentes.

Volviendo ahora a la inflamación del cerebro y las meninges, nos encontramos algunas veces indicado a Hyosciamus, cuando existen algunos de los síntomas ya mencionados, el alivio por sacudir la cabeza, o por sentarse flexionándola hicia adelante. En esto es exactamente opuesto a Belladonna, el paciente se queja de sensación ondulante y latidos a través de la cabeza.

Hyosciamus produce una tos completamente característica; esta resulta del alargamiento de la úvula, consecuencia de su relajamiento o inflamación, que cuelga y descansa sobre la raíz de la lengua, causando irritación y la tos consecutiva. Esta empeora al acostarse, experimentando el enfermo completa mejoría al incorporarse. Generalmente empeora por la noche y también después de comer, beber o hablar.

Hay dos o tres medicamentos que pueden compararse en esto con Hyosciamus. Uno de ellos es Rumex crispus, que resulta magnífico cuando la tos es originada por un molesto cosquilleo en la fosa supraesternal. El enfermo desea aspirar aire caliente. Cualquier circunstancia que altere la temperatura del aire inspirado, excita el cosquilleo y naturalmente la tos. El cosquilleo puede propagarse hasta el pecho y todavía Rumex seguirá indicado.

Natrum muriaticum también una tos seca con agrandamiento de la úvula. Hay otro medicamento que tiene el mismo síntoma y que ha sido bien confirmado; se trata de Mentha piperita, aunque inferior a

Rumex. He oído decir que comiendo manzanas se alivia esta clase de tos.

Hyosciamus debe ser considerado también como un remedio para el insomnio; es útil en los niños cuando brincan en el sueño, gritan, tiemblan y despiertan asustados. Es también de mucho valor en las convulsiones; es uno de los más eficaces que tenemos para las convulsiones epilépticas, quiero decir, cuando no está indicado otro medicamento. En las convulsiones que produce Hyosciamus, encontramos al paciente con sacudidas y tirones bruscos; estos movimientos angulares descritos ya, parecen ser provocados por comer. Es de notar esto especialmente en los niños; despiertan hambrientos; la cara es propensa a tomar un color rojo encendido, casi purpurino, durante el paroxismo; hay también espuma en la boca y se muerde la lengua; estos síntomas casi siempre van seguidos de un sueño produndo. Las convulsiones de origen puerperal, también requieren el uso de Hyosciamus, que puede distinguirse inmediatamente de Belladonna y Stramonium por la prominente agitación nerviosa, excitabilidad refleja, etc.

En la epilepsia debe compararse con Cicuta virosa, que produce sacudimientos de la cabeza hacia abajo, mirada fija, grito, cara roja; los miembros con grandes contorsiones, espuma en la boca, cara azul, la respiración muy dificultada; temblor antes y después del espasmo; después gran debilidad. Véase también a Oenanthe crocata.

Hyosciamus también puede estar indicado en el corea; los enfermos están muy debilitados y tienen una marcha vacilante; parecen tener impresiones anormales de las distancias; se esfuerzan por coger algo que les parece tener justamente a su alcance, cuando en realidad el objeto está en otro sitio de la habitación.

Stramonium es también un medicamento en el que debemos pensar en el corea, particularmente si el cerebro está afectado; el niño despierta con un grito y canta y ríe sin razón.

Todavía contamos con el recurso de Veratrum viride, que está indicado especialmente cuando hay una gran congestión de los centros nerviosos y el pulso está sobre-excitado.

Quiero hablar ahora acerca de las fiebres de Hyosciamus. Ya he dado a ustedes la sintomatología que indicará a la droga en la fiebre tifoidea. Vamos a ver ahora cuándo será necesaria su aplicación en las fiebres con síntomas de la piel, como en la escarlatina. Hyosciamus está indicado en la escarlatina, aún cuando no son con mucha frecuencia, sin embargo, puede ser necesario en los casos en que Belladonna ha sido usado indebidamente. La erupción es de tipo miliar; obscura o rojo obscura; más bien es escasa por repercución parcial. El enfermo tiene carfología, grita durante el sueño y hay estupor revelando esto el progreso alarmante de la enfermedad.

Stramonium está indicado en la escarlatina cuando los síntomas son violentos, un tanto parecidos a los que hemos estudiado en Belladonna. La cara está muy roja, la erupción parece estar esparcida

por la superflcie; la postración es excesiva; la piel es propensa a secarse y calentarse demasiado, faltando el sudor caliente que encontramos bajo la acción de Belladonna; si el sudor se presenta, no produce alivio.

Comparemos ahora mutuamente a los tres medicamentos, Belladonna, Stramonium y Hoisciamus. En terminos generales encontramos que Belladonna produce más congestiones o inflamaciones cerebrales; Stramonium, congestión con mayor excitación sensorial y Hyosciamus, mayor irritación nerviosa, con menos congestión e inflamación que cualquiera de los otros.

El tipo de delirio en Belladonna es feroz; hay deseo de escapar; el enfermo muerde y pega; la cara está roja; hay sufusión de los ojos con violentos latidos de las carótidas; el paciente o bien se queja de alucinaciones al cerrar los ojos, o fija la vista en un punto con los ojos muy abiertos; además hay somnolencia con imposibilidad para dormir. Si se presenta el estupor, éste más bien es el resultado de la congestión e inflamación cerebral y va acompañado de algunos síntomas de irritación de tal manera que el enfermo cuando despierta está violento o alterna entre el delirio y el estupor, sin evidencia de serios cambios en la sangre.

Hyosciamus tiene un parecido deseo de escapar; el enfermo intenta morder y pegar a los que están cerca de él; tiene el mismo deseo de descubrirse, pero carece de los violentos latidos de las carótidas, de la intensidad de la rubicundez de la cara y de la sufusión de los ojos. El paciente de Hyosciamus tiene particular aversión a la luz y especialemente marcado temor a ser enveneneado o traicionado. Tendido tranquilamente en su cama, se sienta de repente, y ve en su derredor, como si tratara de locazar a alguien, a una palabra de la enfermera cae de nuevo y vuelve a dormir. Puede exhibir sus órganos sexuales. El insomnio es muy diferente al que produce Belladonna; está nervioso, se queja, grita y tiene sacudimientos.

Phosphorus se coloca más cerca de Hyosciamus en el deseo de exhibirse, pero Veratrum está también íntimamente ligado con él en la ninfomanía.

Hyosciamus es usado ampliamente en los manicomios para la manía aguda no inflamatoria. Siempre se encontrará a estos enfermos débiles; el pulso con frecuencia carece de amplitud; los enfermos pueden o no tener apetito o ser éste excesivo. Todos los síntomas se agravan al instante, por comer. Los médicos alópatas usan mucho su alcaloide, la Hyosciamina. Es muy semejante a Kali bromatum, teniendo el poder de excitar el sensorio sin inflamar el cerebro. Por esto encontraremos indicado a Kali bromatum en la manía aguda de los niños, cuando despiertan con gritos imaginándose que alguien les va a lastimar. El enfermo también puede tener la nefasta impresión de que va a ser asesinado o que su honor está en peligro o que las personas que están en su casa sienten antipatía por él e intentan hacerle daño. Hyosciamus está indicado en estos casos, particularmente si son de origen puerperal. Encontraremos estos

síntomas de Hyosciamus en las fiebres tifoideas; tiende, según los veremos, a una enfermedad de tipo adinámico. Este es un medicamento más adinámico que Belladonna. En la fiebre tifoidea debe ser comparado con Phosphoricum acidum, Rhus, Lycopodium y Lachesis. Pero todos ellos, exceptuando tal vez a Phosphoricum acidum, tienen una acción más poderosa que Hyosciamus y de aquí que sigan bien cuando este último medicamento ha sido insuficiente.

Belladonna puede estar indicado en el comienzo de la enfermedad, cuando hay ese delirio turbulento y furioso. Hyosciamus obra después, cuando el estupor llega a hacerse más notable; cuando el enfermo desecha las ropas de la cama o que sus manos, en cierta forma adormecidas, las extiende esforzándose por coger algo en el aire. La lengua en tales casos, estará seca y roja. Naturalmente, se le dificulta la articulación de las palabras y a medida que el caso avance, habrá fuliginosidades en los dientes, con evacuaciones y micción involuntarias; la mandíbula inferior estará caída. Me agradaría advertir a ustedes por vía de precaución que aún cuando el caso demande claramente el uso de Hyosciamus por razón de sus síntomas, no siempre obra. No podría decir por qué razón; no puedo ver la causa, salvo que sea porque el medicamento no obra porfundamente. En tales casos, ordinariamente recurro a Lachesis, Lycopodium, Muriaticum acidum y Arsenicum.

En los fiebres de este tipo, Stramonium difiere de Belladonna y Hyosciamus. El paciente ve objetos que le parecen brotan de todos los rincones de la habitación y que se dirigen hacia él; tiene manía por que le acompañen y por la luz, lo cual es justamente opuesto en Belladonna; está excesivamente locuaz, ríe, canta, reniega y reza casi al mismo tiempo. El deseo de escapar está presente; hay repentino levantamiento espasmódico de la cabeza, dejándola caer después. Despierta asustado, sin conocer a las personas que están cerca de él; los movimientos que hace son elegantes y fáciles aunque pueden ser violentos. Otras veces el cuerpo está bañado en sudor caliente que no produce ninguna mejoría al enfermo. El deseo de desabrigarse es semejante al de Hyosciamus, pero más bien trata de descubrirse todo el cuerpo, que de exhibir sus órganos genitales. La lengua a menudo es blanca, observando la impresión de los dientes; grita durante el sueño frecuentemente con hipo; la cara está generalmente de un rojo encedido, pero no tan profundamente congestionada como en Belldonna.

Dd tabacum, dulcamara, capsicum y glonoinum

Tabacum contiene varios ingredientes activos, el más importante de ellos es Nicotinum. Desde que el fumar fué una costumbre, se han hecho esfuerzos para eliminar la nicotina. Todos reconocen que produce serios efectos sobre el organismo. Hay tres grupos de síntomas que pueden seguir al uso del tabaco; los primarios son bien conocidos: síntomas gástricos, náusea mortal y vómito. El enfermo tiene una palidez de muerte; le es indiferente vivir o morir. Algunas

veces brota sudor frío. Los efectos secundarios son más remotos presentándose meses y aún años después del uso de la hierba, y son dispepsia, ambliopía y también algunos síntomas cardíacos.

Recomiendo que estos últimos síntomas sean retenidos en la memoria. Si no son producidos por el tabaco, Tabacum será un valioso medicamento para curarlos. Me refiero especialmente a la dilatación cardíaca estando presentes estos síntomas: frecuente palidez con lividez de la cara: diarrea alternando con constipación; palpitaciones al acostarse en decúbito lateral izquierdo; moscas volantes; tinitus aurium y tos seca de orígen cardíaco; paroxismos de sofocación con sensación de opresión a traves de la parte superior del pecho; pulso débil e irregular; dolores como de angina pectoris que parten del corazón e irradian al brazo izquierdo o se elevan al cuello e invaden diferentes plexos nerviosos; las extremidades están frías y cubiertas de sudor pegajoso; otro síntoma secundario que puede presentarse, es la prosopalgia. Cuando este síntoma tiene lugar, puede ser curado por Sepia, lo mismo que la dispepsia. La impotencia sigue también al abuso del tabaco y a menudo se corrige con Lycopodium.

Los efectos terciarios del tabaco incluyen la apoplegía.

Tabacum, en sus efectos sobre los órganos digestivos, tiene mucha semejanza con Hidrocianicum acidum, Veratrum y Camphora. Por ejemplo, nos lo encontramos indicado en el cólera, cuando la náusea y el sudor frío persisten después de que Veratrum, Secale o Camphora han detenido la diarrea. Esta náusea va acompañada de calor quemante en el abdomen, estando frío el resto del cuerpo; el enfermo insiste en desabrigarse el abdomen.

Haré notar aquí que esta clase de náuseas sugieren a Tabacum en el cólico nefrítico y en la hernia estrangulada. Hay esta náusea mortal y mareo, con evacuaciones viscosas, por irritación intestinal.

La semejanza con Hidrocianicum acidum existe en la asfixia. Esta última droga obra sobre la médula oblonga y por consiguiente sobre la el corazón por medio de los neumogástricos. Consecuentemente los síntomas que produzca serán cardíacos y pulmonares. Lo encontraremos ocasionando convulsiones con tirantez de la nuca, debido a la irritación de la base del cerebro. Juntamente con esto, la respiración es irregular, pudiera llamarse jadeante, gran opresión cardíaca con debilidad que se repite a intervalos y frialdad, cianosis en la superficie del cuerpo. Bueno es recordar este hecho en las convulsiones urémicas, cuando la médula oblonga está afectada Hidrocianicum acidum entones será nuestra única esperanza.

Tabacum se usa como antídoto para los efectos de Cicuta virosa.

Los efectos primarios del tabaco son generalmente mejorados por Ipecacuanha. Nux vómica está indicado en el mal sabor de la boca y en la cefalalgía que empeora por la mañana o por haber fumado con exceso.

Se dice que Plantago major produce aversión por el tabaco; he se de dos pacientes que después de haberlo tomado, declararon que habían

sentido aversión por la hierba.

Dulcamara

Dulcamara o "amargo dulce", contiene una pequeña cantidad de Solanina, una cantidad mucho menor en realidad que los otros miembros de este grupo. Se han usado las hojas y las ramitas tiernas para la preparación de la tintura madre. Varios relatos de envenenamiento a cause de las frutas de Dulcamara han sido registrados. Los síntomas de este modo producidos, son fuertes dolores calambroideos en los intestinos, seguidos de un estado de inconsciencia y espasmos. Estos últimos son tetánicos y van acompañados de calor seco, piel seca, trismus, respiración fuerte y estertorosa y en un caso sobrevino la muerte.

Los síntomas ordinarios producidos por la droga no son tan intensos. Encontramos como punto central, alrededor del cual irradian todos los demás síntomas que: hay agravación por el tiempo frío y húmedo o por los cambios del tiempo caliente al frío, especialmente si estos cambios son repentinos. Por esto nos será de utilidad Dulcamara en el reumatismo que empeora por los cambios repentinos del tiempo; hay subsaltos de los músculos de los párpados y de la boca cuando el tiempo se vuelve húmedo; coriza seco, garganta irritada, con rigidez del cuello; cólico a frigore, especialmente con diarrea por la noche; el dolor de oídos se presenta en todos los cambios de tiempo.

Dulcamara tiene una marcada influencia sobre el sistema nervioso, pero aquí su aplicación en la práctica se basa en la agravación antes mencionada. La lengua se paraliza por el tiempo húmedo; la palabra es dificil; hay hiperemia en la médula juntamente con el estado parético siendo originado este padecimiento por acostarse en tierra húmeda. También está indicado en la parálisis vesical que se agrava por el tiempo húmedo.

Puede emplearse en el principio de la parálisis de los pulmones en los ancianos, especialmente si los síntomas se agravan por cambios de tiempo. Dulcamara tiene una influencia específica sobre la mucosa vesical, produciendo catarro de este órgano. La orina es muy fétida y cargada de moco.

También ejerce una marcada acción sobre la piel. Desarrolla una erupción rojo encendida sobre la superficie del cuerpo; en diversos lugares habrá grandes manchas que pueden ser blancas o rojas, coexistiendo con ardor y comezón. Está indicado en la urticaria que aparece por desórdenes gástricos, cuando mejora por el aire frío.

El complementario de Dulcamara es Baryta carbónica que tiene también agravación por el tiempo frío, especialmente en los niños escrofulosos.

Capsicum annuum

Capsicum posee en grado ínfimo, si es que las tiene, las propiedades narcóticas de las Solanáceas; pero tiene marcadamente notables las propiedades irritantes de este grupo. Muy poco se necesitaría de la

droga para producir esta iritación. Se elimina del organismo por medio de los riñones, produciendo estranguria con ardor al paso de la orina. Esta droga obra mejor en las personas de fibra laxa, más bien gordas, que no responden fácilmente a los medicamentos porque son de fibra laxa y también de digestión anormal.

El enfermo de Capsicum tiene digestión débil, estómago débil, de aquí que todo él sea débil. Tales enfermos son irritables y fácilmente se enojan. Esto se observa tanto en los adultos como en los niños. Empeoran por la más ligera corriente de aire, aún cuando esta sea caliente. Son torpes en sus movimientos.

Están sujetos a escalofríos y a la fiebre; el escalofrío se inicia por la espalda; aún cuando el enfermo tenga sed, al tomar el agua siente estremecimiento. El enfermo de Capsicum es propenso al asma catarral, con cara roja y bien marcados estertores silbantes. Tose y un esfuerzo eficaz expulsa la flema que mejora el asma.

Capsicum tiene un síntoma que se refiere al pecho y que no se encuentra a menudo en la práctica y es el aliento muy fétido durante la tos.

También tiene una acción bien marcada sobre los oídos, especialmente sobre el oído medio. Es útil en la ruptura del tímpano por cualquiera enfermedad cuando hay sensibilidad e inflamación en la mastoides.

Para los abscesos de la mastoides, los medicamentos preferibles son: Aurum y Nitricum acidum.

Para la supuración crónica del oído medio debemos pensar en Silicea.

Capsicum es de importancia en las afecciones de la garganta; está indicado en la difteria o en la gangrena de la misma, cuando hay vesículas quemantes en el paladar y cuando la fetidez es parecida a la que produce la carne corrompida. Hay una constricción de la garganta y se siente como si se cerrara con espasmo. El enfermo empeora cuando no deglute y en casos extremos, está muy postrado. En esto es semejante a Cantharis.

Capsicum está indicado también en el alargamiento de la úvula.

En la disentería está indicado cuando las evacuaciones son frecuentes pero escasas y van acompañadas de violento tenesmo y ardor tanto en el recto como en la vejiga. Las evacuaciones son sanguinolentas, mucosas y contienen como "pellejos". Hay sed, sin embargo el acto de beber produce estremecimiento.

Glonoinum

Glonoinum o nitroglicerina, tiene acción sobre la sangre, en los traumatismos y en las convulsiones; se estudia en este curso de Conferencias, por sus semejanzas sintomáticas, con Belladonna. Es una droga muy fácil de estudiar; aunque su punto de acción principal es la sangre, no la afecta en su calidad tanto como la afecta en su circulación. La base de toda la sintomatología de esta droga puede referirse en esta frase: "UNA TEDENCIA A IRREGULARIDADES

REPENTINAS Y VIOLENTAS DE LA CIRCULACION"; con esta expresión fácilmente podemos deducir sus otros síntomas.

Los síntomas que se refieren a las irregularidades de la circulación son los que siguen: es muy característica la cefalalgía pulsátil; el dolor puede afectar toda la cabeza o localizarse en la frente y vértice, occipucio o en cualquier otro punto. La pulsación no es una mera sensación, es un hecho real; en efecto, parece como si los vasos sanguíneos reventaran; tan violenta es la acción congestiva de la droga; el latido es sincrónico con el trabajo cardíaco; la sangre parece llegar con ímpetu a la médula y al cerebro; los vasos sanguíneos llegan a dilatarse de un modo manifiesto; las yugulares externas se ven como tortuosas; las carótidas vibran violentamente y están duras, tensas y no ceden a la presión. La cara está de un rojo encendido; los latidos se acompañan de un dolor profundo que atormenta, o de dolencias agudas y violentas. Encontramos aplicable a Glonoinum en la insolación, ya sea por los síntomas enumerados o por otros que revelan que la congestión prolongada ha producido sus efectos deprimentes sobre el cerebro. La cara llega a ponerse pálida; el pulso, que en un principio era lleno, se vuelve depresible y débil y la respiración es dificil; no hay tanta compresión en el pecho como en la médula oblonga, afectando de este modo a los nervios de la respiración. Los ojos están con frecuencia fijos. El enfermo puede estar inconsciente. Glonoinum, pues se revela como nuestro mejor remedio para los efectos del calor, ya sea que la molestia provenga de la acción directa de los rayos solares, por el tiempo cálido, o por el trabajo al calor intenso de un horno, como en el caso de los fundidores y maquinistas. Estos efectos del sol, o del calor no se localizan tan solo en la cabeza, sino que pueden afectar a todo el organismo; por lo que notaremos opresión respiratoria, taquicardia, náusea y vómitos, con la lengua cubierta de una capa blanca. Esta náusea no es de origen gástrico sino cerebral, como sucede bajo la acción de Rhus toxicodendron, Belladonna y Apomorphinum. El apetito está perdido; no hay deseo de tomar alimentos, hay una horrible sensación de hundimiento en el epigastrio y con frecuencia, también diarrea. todos estos síntomas requieren el uso de Glonoinum. Hay otros efectos de esta congestión que se localizan en los ojos; los globos oculares se sienten como si fueran demasiado grandes, de tal modo que se sienten proyectarse hacia adelante, como si fueran a reventar.

Glonoinum está indicado en las afecciones de los ojos ocasionadas por la exposición a una luz muy brillante, como en el caso de que un empleado se viera obligado a trabajar en el escritorio con una luz caliente y brillante. Al examen oftalmoscópico se notan los vasos de la retina distendidos o en los casos extremos, hay apoplejía retiniana.

Además, los efectos de Gloninum aumentando la presión sanguínea, pueden ser notados en los síntomas de la boca. Por ejemplo, hay dificultad para conversar por la disminución de la energía de la lengua, debiéndose esto a la presión que sufren los centros

cerebrales. El vino agrava todos estos síntomas. Algunas veces la congestión es tan intensa, como para volver fernético al paciente, que trata de escaparse y saltar por la ventana. Glonoinum es un admirable remedio en las convulsiones que sobrevienen durante el trabajo del parto, en las convulsiones puerperales. La cara está de un rojo brillante, abotagada y el pulso lleno y duro; la orina es albuminosa; la enferma tiene espuma en la boca y esta inconsciente. Creo que Glonoinum es uno de los mejores medicamentos con que contamos para la forma congestiva de las convulsiones puerperales; esa forma que se anuncia por un aflujo de sangre a la cabeza, especialmente si hay albuminuria. También es de mucho valor en la congestión cefálica por la menstruación suprimida. Los síntomas mentales atribuibles a esta congestión son los que siguen: síncope, lipotomia repentina, la cara se pone pálida y con frecuencia lívida; hay manchas negras delante de los ojos; ataque repentino de inconsciencia; las calles conocidas le parecen extrañas al paciente. Este último síntoma es marcadamente peligroso, puede ser precursor de un ataque inmediato. Supóngase que una persona está sujeta a una congestión apoplética, es sobrecogida en las calles por uno de estos ataques, no sabe donde está; Glonoinum será el medicamento indicado.

Otro medicamento para el error de localización es Petroleum.

Glonoinum también será útil para los malos efectos de un susto. Lo mencioné brevemente al tratar de Opium. Hay una horrible aprehensión y en ocasiones el temor es ser envenenado. Este último síntoma se coloca a lado de Hyosciamus, Lachesis, Rhus toxicodendron, Kali bromatum y Baptisia. Algunas veces la congestión es tan intensa que el enfermo se pone furioso y trata de escapar saltando por la ventana.

Hay otro uso que se puede hacer de Glonoinum y es su aplicación en les traumatismos. Se le ha encontrado como un excelente remedio para los dolores y otras sensaciones anormales, que sobrevienen tardíamente después de estos traumatismos locales. Mucho tiempo después de recibir una contusión, la región duele o se siente irritada, o si se trata de una cicatriz añeja, se abre nuevamente; en este caso Glonoinum podrá proporcionar mejoría.

Debe compararse con Natrum sulphuricum, especialmente después de los traumatismos de la cabeza.

Es necesario recordar las distinciones entre Belladonna y Glonoinum, porque se relacionan en las congestiones e inflamaciones de los niños y ancianos.

A los dos medicamentos corresponden los honores, porque los dos tienen un buen número de curaciones confirmadas. Tenemos el grito en cefálico en Glonoinum, que no es tan marcado en Belladonna; de tal modo que parece que Glonoinum respondería a un caso más grave que Belladonna. Los síntomas que nos ayudarán a diferenciar estos dos medicamentos, son los siguientes: empecemos por Glonoinum; los síntomas de la cabeza empeoran por doblarse hacia atrás; por el

tiempo húmedo; por la aplicación de agua fría, que puede producir espasmo; mejora por descubrirse; por el aire libre; algunas veces el enfermo se ve obligado a levantarse y pasearse a despecho del dolor que le ocasiona el hacerlo. Un síntoma muy marcado que se presenta antes de las convulsiones puerperales y que es considerado como un síntoma premonitor de la congestión cerebral por la supresión de las reglas y un síntoma prominente en los malos efectos del calor del sol, es una sensación de como si la cabeza estuviera enormemente grande; parece como si estuviera ensanchada. Aún cuando este síntoma se encuentra bajo la acción de Belladonna, no es tan característico de este medicamento como en Glonoinum.

Ahora, Belladonna tiene mejoría por doblarse hacía atrás; por sentarse con la cabeza quieta, . Belladonna generalmente tiene mejoría por cubrirse la cabeza, en tanto que en Glonoinum se mejora por descubrirse, aunque este último síntoma es de menos importancia que los otros.

El mejor antídoto de Glonoinum que conozco, es Aconitum.

Lycopodium clavatum

Lycopodium clavatum tiene acción sobre la constitución, sobre la sangre, sobre el hígado, en las hidropesías, en los catarros y sobre los riñones. Refiriéndonos a la sangre, produce fiebres, ebulliciones, afecta el pulso; produce várices, tifoidea, escarlatina y difteria.

Lycopodium, licopodio o pinillo, pertenece a las Licopodiáceas; ha sido llamado así por su semejanza con el pie del lobo. Ha sido usado desde largo tiempo por los prestidigitadores y en el arte pirotécnico para la producción de luces artificiales. En la prestidigitación ha sido empleado para cubrir las manos a fin de introducirlas en el agua y retirarlas completamente secas. Como medicina, fué considerada del todo inerte por los profesantes de la escuela alopática y usado solamente como polvo inerte por los enfermeros.

No obstante, por la experimentación que se hizo en algunos sujetos, se encontraron síntomas verdaderamente intensos que siguieron al uso de este polvo. Otros, por el contrario, lo usaron por meses y años y declararon que era positivamente inerte. ¿Porque sucede esto? Las criptógamas, o acotiledóneas a la inversa de otras plantas, tienen, en lugar de granos, esporos. Los cuales están algunas veces colocados debajo de las hojas, como en el caso de Lycopodium. Ahora bien, estos esporos tienen como una cubierta dentro de la cual encontramos una pequeña cantidad de substancia aceitosa, que es la parte activa del esporo. Por largo tiempo, el Lycopodium que se empleaba consistía en esporos inertes, sin quebrar; cuando estos fueron rotos, entonces llegó a ser activo y algunos síntomas respondieron a su aplicación local.

En la preparación de Lycopodium, es necesario tomar grandes precauciones a fin de que todos los esporos se rompan. Cuando así se prepara, tenemos en él una valiosa y verdadera medicina que Hahnemann experimentó para nosotros y que empleamos casi

diariamente en nuestra práctica. Deseo enaltecer las virtudes de esta notable droga, porque Hahnemann con su infalible ley lo ha sacado de su ignominioso empleo como polvo par los niños y lo ha elevado a la más alta categoría entre los antipsóricos.

A fin de que podamos entender la sintomatología de este medicamento, he expuesto su modo de actuar al principio de esta conferencia.

Ante todo, estudiemos la constitución, es decir, el carácter general del medicamento. Lycopodium afecta profundamente las energías vitales, produciendo una serie de síntomas que lo indican como un valioso remedio en la fatiga cerebral, el tifo, la escarlatina, etc., cuando los síntomas cerebrales indican un estado paralítico alarmante.

Lo encontramos más frecuentemente indicado en las personas extenuadas que tienen debilidad muscular, aunque la mente esté bien desarrollada. Esto es de notarse particularmente en los niños. Son precoces y extra-ordinariamente obstinados. La extenuación se nota con más particularidad en la parte más elevada del cuerpo y del cuello. Hay una predisposición a los desarreglos del hígado y también a las afecciones pulmonares. La cara está con frecuencia pálida o de un color cetrino; los ojos hundidos, y hay círculos azulosos en su derredor. Con frecuencia también la cara está surcada de pliegues y arrugas, revelando un padecimiento arraigado, el rostro fácilmente se sonroja y las mejillas llegan a enrojecer, sucediendo esto con frecuencia en la tarde y después de comer. En cuanto al temperamento, el paciente de Lycopodium, es más bien impaciente e irritable y fácilmente se enoja. Otras veces la tristeza o el llanto son notables. Cuando están enfermos tales sujetos, son propensos a mostrarse tiránicos y bastante imperiosos en sus modales o a darse cierto grado de importancia, de tal manera que ordenan a los otros en forma colérica y vehemente. Por lo que hace a la parte intelectual de la mente, nos encontramos una memoria siempre débil, por lo que la droga a menudo estará indicada, cuando hay frecuentes errores al hablar. El enfermo olvida las palabras o las sílabas. No puede leer porque el significado de ciertas palabras le es confuso; no puede encontrar la palabra que necesita al hablar. Pero si el argumento es de importancia, como para poner de manifiesto su energía, las palabras le salen con facilidad. En esto debe compararse con Sulphur, Lachesis, Fluoricum acidum y Silicea.

Todos los síntomas se agravan entre las cuatro y las ocho de la noche. Lycopodium no es el único remedio que tiene esto. También lo tenemos en Sabadilla, Nux moscata y Helleborus. Helleborus tiene alguna relación con Lycopodium, no solo por razón de su agravación entre las cuatro y las ocho de la noche, sino también por el efecto excitante de dirigir la voluntad hacia el trabajo.

Los cambios producidos en la sangre por Lycopodium no son muy numerosos. En los estados febriles nos lo encontramos algunas veces indicado por el escalofrío que se presenta entre las tres y las cuatro

de la tarde cada tercer día o diariamente. Este frío va seguido de sudor sin calor intermediario. O puede caracterizarse el caso por el escalofrío que es presenta a la misma hora, acompañado de vómitos agrios, con o sin calor.

El pulso de Lycopodium no es muy característico; en las experimentaciones, fué muy poco cambiable, salvo que su frecuencia está ligeramente aumentada hacia la tarde. Los brazos se sienten dormidos, pesados y débiles, mejorándose por el movimiento.

Después de lo expuesto, haré mención de las venas varicosas. Lycopodium, debido a su acción sobre el hígado, tiende a producir una hínchazón o aumento del volumen de las venas, particularmente aquellas que están más o menos imperfectamente provistas de válvulas; de este modo tenemos ya las várices características de Lycopodium; várices en las piernas, particularmente la derecha; váricosas. Si este último estado sobreviene durante el embarazo, es un síntoma que demanda el empleo de Lycopodium. (Lo mismo sucede con Carbo veget.)

Nos encontramos que Lycopodium modifica con frecuencia los noevi. No debemos suponer que todo los noevi son curables por este medicamento, porque ese no es el caso. Aún cuando es nuestro deber tratarlos medicamente cuando se pueda. Para este propósito, Lycopodium es uno de los medicamentos. Otro más, que es mejor que ninguno y que también ha producido noevi, es Fluoricum acidum.

Del mismo modo, presentándose un cuadro semejante de síntomas, nos encontramos a Lycopodium indicado en las hemorroides sangrantes, que producen una enorme cantidad de sangre, mucho más considerable, que la que pudiera producir en proporción con el tamaño de la vena interesada. También lo encontramos indicado en las hemorroides que no sangran, pero que por absorción de su contenido, quedan como masas duras y azulosas.

Todavía más, en los tumores eréctiles, en los cuales aumenta y disminuye la cantidad de sangre contenida en ellos, Lycopodium puede sernos de utilidad.

Lycopodium debe tener algún efecto sobre la sangre y sobre el sistema nervioso por su uso general en los estados tifódicos. No es un medicamento indicado en el comienzo de la fiebre tifiodea, pero cuando la enfermedad ha avanzado a pesar de nuestro tratamiento hasta un estado muy alarmante, entones sí. Los síntomas que nos guíen para la elección del medicamento, son los siguientes: el enfermo llega a caer en estupor; yace con la mandíbula caída; los ojos entreabiertos; la conjuntiva cubierta por una capa vidriosa de moco; la orina es expulsada involuntariamente. Después, en la fiebre tífoidea típica, está indicado hacia el catorceavo día, cuando se ha desarrollado de un modo completo, cuando el rash correspondiente a la enfermedad no aparece y el enfermo entra en estado de inconsciencia, con delirio musitante, arrojando las ropas de su cama y se presenta la carfología; el abdomen está dilatado; hay flatulencia ruidosa y estreñimiento; sacudimiento repentino de los miembros en

distintas direcciones; respiración de orina; si esta sale, deja en las ropas de la cama una arena rojiza. Se trata de una reacción deficiente, que terminará de menera fatal si no se remedia con rapidez. Lycopodium en este caso, con frecuencia dará resultados.

Estas indicaciones son muy semejantes a las que requieren el empleo de Calcarea ostrearum; se ha encontrado que este medicamento está indicado en la fiebre tifoidea plenamente desarrollada, cuando no aparece la erupción; pero en esta droga puede haber o diarrea o constipación; en Lycopodium siempre habrá constipación; Calcarea produce más alucinaciones; el enfermo ve visiones al cerrar los ojos; no puede dormir; aun cuando esté completamente consciente, constantemente estará aterrorizado por algo imaginario. En tales casos, Calcarea desarrolla la erupción y saca al paciente de este estado peligroso.

Podemos encontrar indicado a Lycopodium en estados peores que el anterior, cuando debido a la prolongación de la temperatura en la fiebre tifoidea, hay un principio de parálisis cerebral, siendo en este caso un remedio importante. El enfermo yace en estado de estupor; las pupilas no reaccionan a la luz y el enfermo tiene aspecto de intoxicado; el maxilar inferior está caído y escurre la saliva; la respiración es roncante y estertorosa; puede percibirse el ruido del moco cuando el aire penetra y sale de las vías respiratorias; la orina es expulsada con dificultad o está suprimida; el pulso es intermitente y rápido. En estos casos debe hacerse uso de Lycopodium y se salvará al paciente si el remedio puede obrar.

En Hyosciamus también la orina deja manchas de arena rojiza en las sábanas;; la diferencia entre este medicamento y Lycopodium es la parálisis cerebral inminente; es cuestión de grado, siendo más profunda la acción de este último medicamento. Avanzando el caso, habrá mayor agravación muy marcada en las tardes y menos irritabilidad nerviosa.

En estos estados tifódicos encontramos una indicación para Lycopodium en la lengua; parece como hinchada y el enfermo no puede sacarla, y cuando lo hace, oscila de un lado a otro como péndulo; casi siempre la lengua está seca y tiene vesículas. Son estos suficientes síntomas para asegurar la elección de Lycopodium.

En la escarlatina, Lycopodium no está indicado por su poder de producir una erupción y la fiebre semejante a esta enfermedad; está indicado más bien en los casos que no toman un curso normal, sino que tienden a un desenlace fatal debido a la constitución. Seremos guiados en este caso por los síntomas tifódicos antes mencionados y también por otro que se anticipa y que nos guiará en su prescripción, antes de que se presenten los síntomas alarmantes. Me refiero al estado del niño después del sueño; despierta enojado e irritable, arrojando las ropas y tratando de pegar a todos los que le rodean o se levanta asustado buscando a la mamá para que le proteja contra algo alarmante. Aún cuando este síntoma pueda aparecer insignificante, no lo es de ningún modo; es el principio de alguna

enfermedad y si no es atendido, el estupor y la inminente parálisis cerebral se presentarán. En esto se asemeja a Cuprum, Belladonna, Stramonium y Zincum, que también producen un despertar del paciente como asustado. El elemento irritabilidad y la ausencia de los síntomas característicos de las otras drogas, nos guiarán a la prescripción de Lycopodium.

Recordando a los medicamentos en los que predomina el elemento irritabilidad, diremos que son: Chamomilla, Arsenicum y Kali carbonicum.

Lycopodium es necesario con frecuencia, cuando el niño repentinamente llega a ser obstinado; se pone molesto, llora, respira con rapidez durante el sueño; los músculos llegan a ponerse flacidos y le es imposible caminar.

Podemos hacer otro uso de este síntoma; algunas veces los niños sufren de litiasis y el ácido úrico pasa en cantidad exagrada a la orina, de manera que produce dolor en el momento de la micción; despierta gritando por el dolor y golpea a los que se le acercan. En este estado, Lycopodium está indicado tanto por los síntomas subjetivos como objetivos. Se relaciona con Sarsaparrilla, Zingiber, Pulsatilla, Arnica, Prunus spinosa, etc., en la retención de orina.

Con frecuencia también, cuando Lycopodium está indicado en la escarlatina, nos encontraremos que una u otra de las parótidas están inflamadas y dejan escapar una materia purulenta.

Probablemente el mejor de nuestros remedios en la Materia Médica para la parotiditis que acompaña a la escarlatina, es Rhus toxicodendron; después le sigue Calcarea ostrearum y a este le sigue Lycopodium. Lachesis está indicado únicamente cuando la hinchazón cuando la hinchazón es purpurina y el pus no es loable, sino delgado, escoriante e icoroso.

Con frecuencia se olvida a Lycopodium en las enfermedades de los ojos, siendo un remedio que presta mucha utilidad, aun cuando está indicado con especialidad en los casos que han llegado a hacerse crónicos; puede hacerse uso de él, cuando los párpados están resecos y granulosos habiendo comezón; en la retinitis pigmentada y aún en la catarata. También curará los orzuelos, especialmente si aparecen cerca de la comisura interna de los párpados.

En la difteria debe pensarse en Lycopodium, cuando el depósito diftérico es sobre todo abundante del lado derecho de la garganta, con tendencia a extenderse al lado izquierdo. Hay constante deseo de deglutir, llegando casi hasta el espasmo de la garganta con violentos dolores punzantes. El enfermo empeora por deglutir los líquidos, especialmente si están fríos. Con frecuencia nos encontraremos que los síntomas se agravan entre las cuatro y ocho de la noche. Los ganglios cervicales están hinchados. Por lo regular cuando Lycopodium es el medicamento indicado ya en la escarlatina o en la difteria, están invadidas las fosas nasales; el enfermo no puede respirar por la nariz; las tonsilas están muy hinchadas, lo mismo que la lengua, por lo que el enfermo se ve obligado a abrir la boca y

sacarla a fin de poder respirar. Otras veces, después de haber prescrito Lachesis, las falsas membranas invaden el lado derecho; entonces Lycopodium estará indicado como substituto.

Arum triphyllum y Nitricum acidum, le son muy semejantes en la difteria de la nariz. Phytolacca produce un rojo obscuro en la garganta, peor en el lado derecho, pero hay imposibilidad para deglutir bebidas calientes.

Ahora veamos la acción que ejerce Lycopodium sobre el hígado. Obra de un modo intenso sobre este órgano, produciendo un numeroso grupo de síntomas. Empezaremos por la boca: encontramos la lengua sucia, sabor agrio, excepcionalmente pútrido en el momento de despertar; hambre canina, sin embargo, una pequeña cantidad de alimento parece producir plenitud, como si el enfermo estuviera "lleno hasta la garganta", volviéndo a sentirse a pocos momentos la misma hambre; molestias gástricas inmediatamente después de comer, no poco tiempo después como sucede en Nux vómica; no puede soportar la presión de las ropas en la cintura, siendo en esto algo parecido a Lachesis, pero distinguiéndose en que éste tiene hiperestesia todo el tiempo, y Lycopodium solamente después del alimento. El hipocondrio derecho está muy sensible al tacto; algunas veces hay sensación de tensión, siendo este síntoma subjetivo, el que nos conduzca a la elección de Lycopodium en la hepatitis crónica, cuando ya se han formado los abscesos. El diafragma está muy propenso a afectarse en este estado; hay una sensación de como si una cuerda estuviera atada alrededor de la cintura; hay marcada flatulencia, siendo ésta más notable en la parte superior que en la baja; ruido de aire en el ángulo esplénico del colon, con dilatación en todo su trayecto. Hay notable fermentación en los intestinos, siendo seguida de descargas flatulentas y aún de diarrea. Generalmente, sin embargo hay constipación intestinal, aunque con urgencia de evacuar sin efecto ninguno. Después de la evacuación queda una sensación de como si una gran cantidad de excremento permaneciera en el recto.

Ahora bien, si estos síntomas, especialmente, van asociados de ascitis, nos conducirán a la prescripción de Lycopodium en la enfermedad conocida con el nombre de cirrosis hepática.

Lycopodium en estos síntomas gástricos y hepáticos, tiene muchos análogos; uno de ellos es Nux vómica, que puede distinguirse de aquél por lo siguiente: aún cuando Nux tiene sabor agrio, agravación por la mañana y plenitud después de comer, sin embargo, la molestia inmediata es más característica en Lycopodium. En la acumulación de gases, Nux vómica tiene más presión hacia abajo, produciendo frecuente urgencia de evacuar y presión en la vejiga. Ambos tienen constipación notable con urgencia ineficaz de evacuar. La diferencia es la siguiente: Nux tiene este deseo ineficaz por su acción espasmódica sobre el intestino y en Lycopodium este proviene de la contracción del esfinter anal.

Sulphur le es también semejante en la acumulación de gases y en el

sabor agrio y amargo; pero el lugar característico de su acumulación, es la porción sigmoidea del colon y es referida por el paciente a la fosa iliaca izquierda.

Momordica balsamica es otro medicamento que tiene acumulación de gases en el ángulo esplénico. Cepa, tiene dolores en la misma región probablemente debidos a la misma causa.

Debemos pensar también en Raphanus en los casos de acumulación y retención de gases. El Dr. James B. Bell, de Mass., uno de nuestros más eminentes cirujanos, practicó una operación abdominal. El enfermo tenía un timpanismo notable y sin embargo, no expulsaba gases a pesar de mover los intestinos. Este síntoma lo encontró en Raphanus; lo prescribió y el paciente curó.

Llegamos ahora a las hidropesías curables por Lycopodium. Nos lo encontramos indicado con particularidad en las hidropesías que radican en la mitad inferior del cuerpo; la parte superior está extenuada; los músculos de los brazos y del pecho, están contraídos; el abdomen dilatado y los piernas hinchadas y cubiertas de úlceras, por las que mana una serosidad continuamente. Tenemos tres medicamentos que pueden ser útiles cuando las úlceras se forman en las piernas, en la hidropesía y son Rhus toxicodendron, Lycopodium y Arsenicum. La causa que produce la hidropesía en Lycopodium, es un afección del hígado. También se ha usado con éxito en el hidropericardio, cuando Arsenicum ha fallado. Veamos ahora los catarros que produce Lycopodium; debemos pensar en él cuando éste afecta la mucosa nasal, particularmente cuando la nariz está obstruída y el niño no puede respirar; despierta restregándose la nariz.

Puede recurrirse igualmente a este medicamento en el catarro bronquial, ya sea que los grandes o pequeños bronquios sean invadidos, cuando hay acumulación de moco revelada por los estertores; la respiración es ruidosa; hay tos, disnea y movimientos de la alas de la nariz.

Puede también prescribirse en la fiebre héctica con supuración de los pulmones, particularmente cuando el pulmón derecho está más grave que el izquierdo.

Es de utilidad en la neumonía cuando la hepatización es tan extensa, que el enfermo tiene gran dificultad para respirar y hay batimientos de las alas de la nariz. También puede ser empleado en la neumonía tifódica cuando concuerdan sus síntomas y para los malos efectos de la neumonía tratada de modo impropio, con particularidad si amenaza la supuración pulmonar.

Veamos ahora la acción de Lycopodium sobre los tejidos muscular y fibroso. Debilita los músculos y por esto llega a ser de utilidad en las personas delicadas cuya musculatura está pobremente desarrollada; los brazos se sienten débiles y pesados y esta debilidad es meramente funcional, pues cuando el enfermo trata de moverlos, encuentra que puede trabajar enteramente bien con ellos; las piernas fácilmente se adormecen, con entorpecimiento y hormigueo. Estas

sensaciones acompañan al reumatismo, a la neuralgia, etc. Lycopodium tiene acción sobre el reumatismo crónico y la gota, cuando los dolores empeoran por el tiempo húmedo y mejoran por el movimiento lento y el calor estando presentes los síntomas característicos gástricos y urinarios. El lado derecho es el principalmente afectado.

En las afecciones renales nos encontramos a Lycopodium indicado para un trastorno, del que ya he hablado, la presencia de ácido úrico en exceso en la orina, en forma de arenillas y para el cólico renal que afecta el lado derecho.

Hay un síntoma para Lycopodium que deseo agregar, que no es poco común en la fiebre tifoidea, en la neumonía y la escarlantina y es la frialdad de un pie, mientras el otro está caliente y aún ardiente. Este síntoma podría parecer como insignificante en la fiebre tifoidea, pero puedo asegurar a ustedes que es de inestimable valor en la práctica. Sulphur produce frialdad en un pie, pero generalmente el izquierdo es el afectado.

Lycopodium es complementario de Lachesis.

Dd umbeliferas, berberidaceas y spigelia

Las Umbelíferas constituyen un órden de plantas que tienen una marcada acción sobre el sistema nervioso, produciendo en algunos casos, síntomas semejantes a los de la histeria. También afectan el sistema glandular, produciendo ya infarto o atrofia de las glándulas. Obran sobre las membranas mucosas produciendo catarro y algunas de elles sobre la piel, produciendo erupciones pustulosas.

Los remedios obtenidos de este órden, son los siguientes: Conium mac. Cicuta virosa, Oenanthe croc. Phellandrium acuat., Petroselinum, Asafoetida y Ammoniacum gummi.

Procedamos desde luego a estudiar al primero de ellos.

Conium maculatum

Conium maculatum obra como un deprimente del sistema nervio cerebro-espinal.

Produce un estado parético que se propaga de abajo hacia arriba; la parte más baja del cuerpo se afecta antes que la más elevada. Cuando la droga es tomada en dosis tóxicas, encontramos desde luego dificultad para caminar, como si no se pudieran mover las piernas. Cuando la acción del veneno aumenta, otros órganos más nobles son invadidos. Los pulmones son afectados; hay disnea; el pulso es arrítmico, revelando la acción irregular del músculo cardíaco. Hasta este momento, la mente está perfectamente clara. Finalmente sigue la inconsciencia y el enfermo muere a causa de la parálisis respiratoria.

Podemos hacer uso de Conium en aquellos estados de agotamiento de la economía, como resultado de una edad avanzada. También puede emplearse después de enfermedades graves como la difteria y la fiebre tifoidea y para las consecuencias del vicio de vicios, la

masturbación. En la parálisis de Conium, la sensibilidad sólo está poco afectada. Sus análogos en este caso son Gelsemium y Cocculus, que también producen parálisis funcional motriz y son medicamentos importantes en la parálisis postdiftérica.

En el tratamiento de los efectos de los excesos sexuales, encontramos a Conium de gran utilidad, por sus síntomas mentales. Produce un cuadro perfecto de la hipocondriasis; el enfermo está melancólico; rehuye la sociedad y sin embargo, teme estar sólo. Conium también puede ser aplicado en este estado mental, cuando es resultado de la continencia.

Zincum oxidatum es en este caso muy semejante a Conium. Este último remedio es deprimente, en tanto que el primero es irritante, a la vez que debilitante.

Se puede hacer uso de Conium en el vértigo, cuando proviene de la anemia cerebral y se caracteriza por ex- acerbaciones al voltearse en la cama; con frecuencia va asociado a una sensación de adormecimiento del cerebro, como si este órgano estuviera estupefacto.

Obrando como lo hace Conium sobre el sistema glandular, debe ser considerado como un medicamento escrofuloso. Está indicado en la oftalmía escrofulosa; un síntoma característico que lo indica en este padecimiento, es la intensa fotofobia, desproporcionadamente intensa al grado de inflamación real. Además, hay neuralgia ciliar y prosopalgia de un lado, que empeora por el frío y bajo la influencia del aire, las mejillas llegan a tener un color rojo-obscuro y se hinchan.

Conium afecta las glándulas seruminosas, aumentando su secreción y volviéndola de un color obscuro, con el aspecto como de papel masticado.

El tratamiento correcto en estos casos, consiste en remover la cerilla por medio de un cuidadoso lavado y prescribir en seguida Conium para evitar su nueva formación.

Conium no obra de modo prominente sobre el pecho, aún cuando nos lo encontraremos útil en la tisis, cuando hay imposibilidad para expectorar y los enfermos se ven obligados a tragar los esputos. Es útil especialmente para la tos nocturna atormentadora, producida por cosquilleo como de un punto seco en la laringe, y que mejora tan pronto como se incorpora el enfermo. Apenas si hay tos durante el día.

Conium debilita el corazón dando lugar a un pulso por momentos lleno y regular y después depresible, débil e irregular. Este síntoma no constituye una indicación poco común para Conium en las personas de edad avanzada.

El uso de Conium en las afecciones glandulares y en las formas malignas de tumores, proviene del poder que posee de producir un agrandamiento de las glándulas, adenomas. Las glándulas afectadas tienen una dureza de piedra; estas induraciones son muy comunes en las mamas, en los tésticulos y en el útero; generalmente hay poco o

ningún dolor, aún cuando algunas veces se presentan dolores como de dardo. Conium está indicado en el comienzo del escirro y después de contusiones o golpes, cuando el resultado es la induración. Las induraciones son comunes en las mamas, testículos y útero.

Hay una induración que produce Conium, que semeja de un modo perfecto a un tumor maligno. En la boca reproduce un cuadro del noma; la lengua y las mucosas están hinchadas con secreción fétida; las partes afectadas tienen un tinte grisáceo, ceniciento y aún pueden estar gangrenosas; hay gran dificultad para deglutir, con espasmo de la garganta.

En el cáncer del estómago hay vómitos de sangre y de una substancia negra grisácea, que no es sino la sangre digerida y los tejidos gangrenados que se eliminan.

Conium es complementario de Nux vómica en la constipación especialmente cuando hay sensación de desmayo después de evacuar.

Ammoniacum gummi

Ammoniacum gummi es una goma obtenida de un árbol muy grande que crece en Arabia. Ha merecido notable reputación como medicamento para los ojos; yo lo he usado con éxito en la astenopía, cuando hay escozor y ardor en los ojos, especialmente si se ha trabajado de noche a la luz artificial; los ojos se ponen inyectados y con frecuencia hay latidos, principalmente en las comisuras internas. Por esto es colocado entre Belladonna, que se usa en las afecciones oculares por exceso de trabajo, cuando hay una gran congestión, y Ruta que está indicado para la irritabilidad de todos los tejidos oculares, por exceso de trabajo o por esforzarse en un trabajo fino.

Asa foetida

Asafoetida es una goma que tiene un franco olor aliáceo. Es útil con especialidad en dos clases de padecimientos; Primero, en las enfermedades nerviosas que reproducen un tipo perfecto de la histeria. Obra sobre las fibras musculares produciendo una acción antiperistáltica en el esófago e intestinos; por lo que poduce una sensación de como si una bola se levantara desde el estómago hasta la garganta; siendo esto provocado por una comida copiosa, por el movimiento o por el movimiento o por cualquiera otra causa que pueda excitar los nervios. Produce una sensación de explosión hacia arriba, como si todo el contenido abdominal fuera a salir por la boca. Esto es común en el cólico histérico, precedido de eructos de sabor ácido y acompañado de una sensación de vacío en el estómago, a las once de la mañana como en Sulphur.

La segunda acción de Asafoetida es sobre los huesos. Produce una inflamación del periostio que termina en úlceras especialmente sobre la tibia. Una característica de estas úlceras es la intolerancia a las ropas. Todas las partes circunvecinas están excesivamnte sensibles a cualquiera aplicación local.

Asafoetida cura la histeria, que proviene de la supresión repentina de

los flujos.
Asafoetida produce inflamación de los ojos. Por lo que puede estar indicado en la iritis consecutiva al abuso del mercurio, especialmente cuando es de origen sifilítico, con dolores quemantes y punzantes y sensibilidad de las órbitas alrededor de los ojos. El medicamento más semejante en esto, es Aurum, que tiene mejoría por el calor moderado.
Asafoetida tiene mejoría por la presión de los globos oculares, lo que no sucede en Aurum.
Phellandrium aquaticum
Phellandrium aquaticum está indicado en la cefalalgia, afectando a los nervios que van al ojo. Hay una sensación triturante en la coronilla de la cabeza, con ordor de ojos y lacrimeo.
Phellandrium también produce dolores agudos en el trayecto de los conductos galactóferos al mamar el niño.

Petroselinum sativum
Petroselinum tiene aplicación en las enfermedades de la uretra, especialmente en la gonorrea, cuando la infección se ha propagado a la uretra posterior y el enfermo se queja de un dolor en la raíz del pene. Hay deseo repentino e irresistible de orinar e intensa comezón en el periné.
Conium produce también cistitis crónica con micción intermitente. La orina empieza a salir y se detiene. He utilizado este síntoma del medicamento en el tratamiento de la hipertrofia prostática en los ancianos.

Aethusa cynapium
Aethusa cynapium es un veneno terrible, teniendo propiedades narcóticas, así como efectos paralizantes. El principal uso que podemos hacer de esta droga, proviene de su acción sobre el estómago. Produce náusea mortal y mareo con vómito. Si se trata de un niño, los vómitos consisten en leche cuajada que es con frecuencia verde. Después del vómito, el niño cae hacia atrás agotado y se duerme. Despierta hambriento, come y vomita nuevamente. La cara está pálida y hay círculos obscuros alrededor de los ojos. Su análogo en este estado, es Antimonium crudum, que difiere de Aethusa por la capa blanca de la lengua. Hay otro medicamento y es Calcarea ostrearum o Calcarea acética, que produce vómitos de leche cuajada y el niño está propenso a la diarrea siendo las evacuaciones de olor agrio.

Cicuta virosa
Cicuta virosa es otro miembro de este órden; cuando se toma en cualquier cantidad produce congestión de la base del cerebro y del bulbo. Al principio el paciente está rígido, con la mirada fija, la cara azulosa y espuma en la boca e inconsciente. Después tiene lugar una sacudida o una serie de sacudidas de la cabeza y del cuerpo. Los

maxilares están contraídos y el enfermo se muerde la lengua. Estos síntomas espasmódicos van seguidos de un profundo agotamiento. Estos detalles nos conducen a la prescripción de Cicuta en la epilepsia, en los espasmos reflejos por los parásitos y también en algunas formas de espasmos de orígen puerperal.

Encontramos en Cicuta además de estos síntomas, fenómenos que se asemejan a los efectos lejanos de la contusión cerebral; las pupilas están dilatadas y hay vértigo y cefalalgia y algunas veces convulsiones epileptiformes.

Cicuta también afecta la piel, produciendo una erupción pustulosa, con costras amarillentas color de miel, particularmente en la boca y en el sitio de los bigotes. Ha curado dos casos de epitelioma, cuando la producción cancerosa estaba cubierta de costras color de miel.

Dd berberidaceas

Solamente tendremos tiempo para estudiar dos plantas de este órden: Berberis vulgaris y Podophyllum peltatum.

Berberis vulgaris

Berberis vulgaris pertenece a este órden, juntamente con Podophyllum y Caulophyllum. Contiene un alcaloide llamado Berberina, que también se encuentra en Hidrasitis canadensis, Zanthorriza, Menispermum canadense, Coptis, etc. Algunos químicos han asegurado que lo que se vende como cloruro de hidrastina, no es tal, sino un cloruro de berberina. Esta berberina, cuando se da en grandes cantidades a los animales, produce inquietud, temblor convulsivo, sed, diarrea y finalmente parálisis de las extremidades posteriores. El hombre se envenena mucho menos fácilmente que los animales inferiores. en la antigua escuela se usó como antiperiódico y también como tónico amargo.

Berberis vulgaris obra más sobre los riñones y la vejiga, que sobre cualquier otro órgano del cuerpo; después sobre el hígado y finalmente sobre las membranas mucosas. También afecta las energías vitales y perturba la nutrición como lo revela la demacración y notable postración.

Antes que todo, examinaremos los síntomas renales, como los más importantes. Justamente como he recomendado a Digitalis para varias enfermedades cuando los síntomas cardiacos nos lo indiquen, en la misma forma recomendaría a Berberis vulgaris, como en la peritonitis, metritis, etc., cuando predominen los síntomas renales de este medicamento. Encontramos en la región renal dolores aguijoneantes y desgarrantes como de taladro, que empeoran por la presión profunda, por tratarse evidentemente de los mismos riñones; estos dolores descienden por el dorso y pelvis por el trayecto de los ureteres. Hay una especia de dolor tenso y presivo, que cruza la cintura, que también se siente tensa y entumecida. Los dolores son de carácter aguijoneante y desgarrador e irradian de los riñones hasta la misma región. Otro síntoma que parece ser peculiar de

Berberis, es una sensación de burbujeo, como si el agua fuera a brotar a través de la piel; este es un síntoma peculiar que nos puede indicar con firmeza a Berberis como el medicamento apropiado.

Veamos ahora lo que se refiere a la vejiga; encontramos en ella un marcado dolor cortante que se extiende irradiando hasta la uretra, con ardor después de orinar. La orina misma presenta marcadas características. Es amarilla, turbia, mucosa; algunas veces hay un sedimento blanquizco que llega a ser rojo y harinoso. Con estos síntomas urinarios, estás presentes los dolores desgarrantes que hace un momento mencioné. Ahora siempre que tengamos estos síntomas renales y vesicales, debemos pensar en Berberis, sea que se trate de una inflamación del útero, de los intestinos, del peritoneo o de cualquiera otra parte del cuerpo. La cara revela generalmente por su expresión una enfermedad profundamente desarrollada, estando lívida y de aspecto demacrado. La postración es notable.

Algunas veces se tiene este mismo cuadro en las afecciones del hígado; se encontrará como característico el dolor aguijoneante en el reborde de las costillas falsas del lado derecho; estos dolores parecen partir de la región hepática e irradiar al abdomen. Estos síntomas pueden ser indicio de un cólico por cálculos biliares.

Las evacuaciones de Berberis van acompañadas de un violento ardor en el ano, como si las regiones vecinas estuvieran irritadas. Deseo frecuente y constante de evacuar. Estos síntomas han sugerido el empleo de Berberis en la fístula anal. En la fístula debe compararse con Silicea, Sulphur, Ignatia y Calcarea phosphorica, siendo indicada esta última, cuando los síntomas pulmonares están presentes como resultado de una operación quirúrgica.

Puede también hacerse uso de Berberis en las mujeres, cuando la leucorrea o, la dismenorrea, van asociados a los síntomas peculiares urinarios de la droga.

Berberis debe ser estudiado juntamente con Pareira brava; la diferencia entre las dos es la siguiente: en esta última droga, los dolores irradian hacia los muslos; en tanto que en la primera, rara vez descienden más abajo de la pelvis y al enfermo le es imposible orinar a menos que se coloque "a gatas". Orina de olor amoniacal. Podemos también emplear a Berberis en las enfermedades de las articulaciones, cuando van acompañadas de dolores desgarrantes, ardores y una sensación como de burbujeo, como la que se ha mencionado. Es también de utilidad en el reumatismo y la gota, cuando los síntomas urinarios característicos están presentes. En esto se coloca a lado de Lithium carbonicum, Benzoicum acidum, Calcarea ostrearum y Lycopodium.

Bezoicum acidum es útil en la gota y reumatismo con síntomas urinarios, cuando la orina tiene un olor fuerte parecido a la del caballo.

Calcarea ostrearum produce una orina mal oliente, con sedimento blanco en vez de turbio.

Lycopodium es útil en el reumatismo o la gota, cuando la orina tiene

un sedimento de acido úrico.

Podophyllum peltatum

Podophyllum peltatum es la mandrágora o manzana de mayo. Es una planta que crece a una altura de dos o tres pies, con las hojas extendidas hacia arriba. Pertenece también al órden de las Berberidáceas; crece de preferencia a orillas de los bosques. Las partes de esta planta que se usan en medicina, son las raíces y los frutos. En aplicación exterior, Podophyllum produce desolladuras en la piel semejantes al intertrigo. Si la planta pulverizada es aplicada a los ojos, produce una intensa inflamación y úlcera perforante en la cornea.

Sin embargo, el punto central de ataque de esta droga, es el abdomen. Poco después de tomarse ocasiona diarrea con dolores como de cólico; la diarrea matutina bien conocida, expulsada como chorro de agua por una llave; precedida de arqueo y vómitos; de una contracción espasmódica del estómago, que obliga a gritar al niño; una diarrea de tal naturaleza que nos haría pensar en Sulphur, Dioscorea, Bryonia, Natrum sulphuricum y algunos otros medicamentos. Las evacuaciones se presentan inmediatamente después de comer, como en Croton tiglium, etc.

Además de esta acción intestinal, lo encontramos obrando sobre el hígado, y aquí tiene su principal aplicación. Está indicado en el hígado tórpido y crónicamente congestionado; hinchado y sensible, la fricción sobre el hipocondrio derecho mejora la sensibilidad. La cara y la esclerótica llegan a tener un tinte ictérico; hay mal sabor, originado, con evidencia, por la descomposición de los alimentos en el trayecto intestinal. La lengua tiene una cubierta amarilla o blanca y conserva la impresión de los dientes; la bilis puede llegar a espesarse en la vesícula, dando origen a la formación de cálculos. Por lo que encontraremos a Podophyllum indicado en el tratamiento del cólico hepático. Las evacuaciones son de carácter ya mencionado o si hay estreñimiento, son arcillosas, revelando esto la ausencia de bilis. Estos síntomas de Podophyllum se asemejan mucho a los de Mercurius y ha merecido esta droga el nombre de "mercurio vegetal", aún cuando es mucho menos perjudicial que el mercurio.

En la constipación de los niños con alimentación artificial, muchas veces produciría mejorá. En Podophyllum los excrementos son secos y desmenuzados.

De los medicamentos que producen la impresión de los dientes en la lengua, Mercurius se coloca a la cabeza; después vienen Podophyllum y Yuca filamentosa y por último Rhus toxicodendron, Stramonium y Arsenicum metallicum.

Podophyllum produce prolapso del recto acompañando a la diarrea; el recto se prolapsa antes que salga la evacuación (en Nux vóm., después) especialmente por la mañana. Podophyllum parece tener también la propiedad de producir y curar el prolapso uterino, con los síntomas concomitantes de pesantez en el hipogastrio y la región

sacra, que empeora por el movimiento y neuralgia en el ovario derecho, que irradia por el nervio crural; hay cefalalgia, menstruación retardada; leucorrea espesa y transparente y con frecuencia coincide con el prolapso del recto. Como medicamentos concordantes de Podophyllum en este prolapso, tenemos a Nux vómica y Sepia, para cuyas indicaciones ya hemos dado los datos en otra conferencia. Pocas veces se pensaría en Podophyllum como un medicamento para la tonsilitis y sin embargo, ha tenido muy claras indicaciones en ésta afección. La enfermedad generalmente aparece en el lado derecho y de ahí se propaga al izquierdo, como en Lycopodium; hay gran sequedad de la garganta, agravación por deglutir líquidos, en la mañana y dolor que irradia al interior del oído.

Podophyllum es un valioso medicamento durante la dentición; parece no tener acción sobre el cerebro y sin embargo, produce irritación cerebral refleja, ya sea por los síntomas abdominales solamente o por la dentición. Los síntomas que lo indican, en adición a los que ya se han dado, son: quejido y lloriqueo durante el sueño; no gritos agudos y súbitos, como en Belladonna, sino un grito de dolor; el niño rechina los dientes; la cabeza es echada hacia atrás y rueda de un lado a otro.

Podophyllum está indicado en las fiebres, generalmente de tipo remitente, con particularidad si se trata de una fiebre biliosa. Durante el escalofrío, la droga no tiene síntomas característicos; pero durante la fiebre, el enfermo está somnoliento y algunas veces delirante.

Spigelia anthelmia

Spigelia forma parte del orden de las Laganiáceas; no será dificil de entenderlo en su acción medicamentosa, si fijamos nuestra idea en que obra sobre los nervios como un remedio neurálgico, que produce como gran característica, la neuralgia. Acompañando a estos síntomas neurálgicos, casi siempre encontramos síntomas simpáticos de la cabeza, sean también neurálgicos o no. Mentalmente encontramos que el enfermo tiene miedo, ansiedad, presentimiento de como si alguna cosa la fuera a suceder; este e un síntoma muy común en los hombres y mujeres con neuralgias, especialmente en equellos cuyos nervios están muy debilitados. Otro síntoma que aparece algunas veces es el temor a los objetos puntiagudos. Por ejemplo, el enfermo tiene miedo a los alfileres; con frecuencia también hay angustia precordial. Si la neuralgia afecta la cabeza, comienza por el occipucio irradiando hacia adelante, para localizarse sobre el ojo izquierdo; puede también invadir los carrillos, especialmente el izquierdo. Hay dolores quementes, atormentadores, de sacudida y que empeoran por cualquier ruido o mivimiento del cuerpo. Ordinariamente empeoran también por el cambio de tiempo, especialmente al tiempo tempestuoso. En la culminación del dolor, generalmente hay vómitos biliosos; el período de exacervación es bien notable: el dolor se inicia por la mañana con la salida del sol, aumentando durante el día y disminuyendo al atardecer.

Nos encontramos con frecuencia indicado a Spigela en la jaqueca cuando el paciente no puede soportar ni el ruido, ni las sacudidas del cuerpo.

Este es nuestro mejor remedio en la neuralgia ciliar; el dolor puede radicar en uno u otro ojo aunque con más frecuencia en el izquierdo. Puede haber fotofobia por la más ligera retinitis; agudos dolores hirientes en el ojo o irradiando de él. La región supraorbitaria está muy sensible al tacto; el globo ocular se siente como si fuera muy grande en relación con la órbita. Juntamente con estos síntomas, hay lacrimeo y coriza.

Tres medicamentos pueden compararse aquí con Spigelia. El primero de ellos es Mezereum, que presta utilidad en la neuralgia ciliar; los dolores irradian y se extienden hacia abajo; hay una sensación de frío, como si una corriente de aire estuviera soplando sobre el ojo. Mezereum está indicado con especialidad, cuando los huesos están afectados, sobre todo después del abuso del mercurio.

Otro medicamento útil en la neuralgia ciliar es Thuja; como Mezereum produce sensación de frío en el ojo, pero los dolores toman una dirección opuesta; van hacia arriba y hacia atrás, en vez de irradiar hacia abajo.

Otro medicamento más en tratándose de estos casos es Cedron que produce neuralgias que aparecen con regularidad cronométrica.

Spigelia es un medicamento valioso para el corazón. Se debe pensar en él cuando hay dolores agudos y picantes en el lado izquierdo del pecho; irradian al brazo y al cuello; cuando se coloca la mano sobre el corazón se tiene una sensación peculiar como de estremecimiento catario. El paciente empeora por el más ligero movimiento de las manos o de los brazos. No puede permanecer acostado. El pulso no es sincrónico con el corazón.

Spigelia puede ser empleado para los parásitos intestinales; produce los síntomas siguientes: estrabismo por irritación abdominal; sacudidas de los ojos; palidez de la cara, con ojeras azulosas. El enfermo se siente desfallecer y con náusea al despertar por la mañana cuando hay hambre; mejora por desayunar; el cólico es más intenso hacia el ombligo; las evacuaciones consisten en moco, materias fecales y lombrices.

Abies Canadensis.
prolapso uterino
Abies Nigra
dispepsia
síntomas mentales
Abrotanum
Véase Artemisia abrotanum
Absinthium
delirium tremens
epilepsia
fiebre tifoidea
Acalypha indica

hemoptisis
hemorragias
Aceticum Acidum.
hidropesía
Acido Aconítico
Aconitina
Aconitum ferox
Aconitum Nepellus
aborto
catarro gástrico
cefalalgia
cólera infantil
cólico
congestión cerebral
conjunctivitis
corazón
coriza
crup
diarrea
disentería
dismenorrea
embarazo
evenenamiento
episcleritis
escarlatina
fiebre
fiebre continua
fiebre gástrica
fiebre de leche
fiebre puerperal
fiebre tifoidea
gastritis
glaucoma
gusanos intestinales
hemoptísis
hemorragias
hernia
hipertrofia cardíaca
inflamaciones
insolación
membranas serosas
meningitis
nefritis
neumonía
neuralgia
ojos
parálisis
parto

piel
pleuresía
pleurodinia
pulso
sarampión
síntomas mentales
sistema nervioso
tétanos
Actea racemosa
aborto
afecciones uterinas
angina de pecho
cefalalgia
corazón
corea
dismenorrea
embarazo
entuertos
histeria
irritación espinal
locuocidad
manía puerperal
mialgia
neuralgia
ojos
órganos genitales femeninos.
parto
pleurod-inia
sistema nervioso
tisis
tos
Actea spicata
reumatismo
Aesculus hippocastanum
hemorroides
Aethusa cynapium
dentición
torpeza
vómitos
Agaricus muscarius.
blefaroespasmo
corea
delirio
irritación espinal
locuacidad
ojos
tortícolis
angus Castus.

agalaxia
espermatorrea
Allanthus
difteria
erisipela
escarlatina
fiebre tifoidea
Alcohol.
difteria
Aletris farinosa
afecciones uterinas
constipación
neurastenia
prolapso uterino
Allium Cepa.
véase Cepa.
Allium sativa.
piel
Aloe socotrina
cafalalgia
diarrea
disentería
hemorrides
hígado
prolapso uterino
Alstonia scholaris
diarrea
fiebre intermitente
Alúmina
constipación
ojos
ptosis
sistema nervioso
Ambra grisea
asma
constipación epistáxis
insomnio
leucorrea
metrorragia
órganos genitales femeninos
parto
reacción defectuosa
reblandecimiento cerebral y
medular
sistema nervioso
tos
tos ferina
várices

vértigo
Ambrosia artemise-folia.
fiebre de heno
Ammoniacum gummi
astenopia
histeria
síntomas torácicos
Ammonium benzoicum.
orina
Ammoni-um carbónicum
envenenamiento por el Rhus
menstruación
relaciones antidotales
sistema nervioso
Ammonium cáusticum
difteria
piel
Ammonium muriaticum
hígado
Amigdala amara.
difteria
tonsilitis
Amigdala persica
Amylenum nitrit.
véase Nitrito de Amylo.
Anacardiaceas
Anacardium occidentale
erisipela
envenenamiento por
piel
Anacardium orientale
articulaciones
cefalalgia
constipación
corazón
coriza
embarazo
fatiga mental
fiebre tifoidea
hemorroides
hipocondriasis
médula espinal
pericarditis
piel
propensión a blasfemar
relación antidotal
reumatismo
síntomas gástricos

síntomas mentales
tendencia al suicidio
tortícolis
viruela
vómito del embarazo
Angustura
caries de los huesos
contusiones
dolor escapular
necrosis del maxilar inferior
podagra
tétanos
tos
Anisum stellatum
dolores torácicos
tisis
Anthracinum
carbunco
Antimonium crudum.
callocidades
catarro gástrico
dientes
piel
síntomas mentales
vómitos
Apis mellifica
bronquitis capilar
erupciones suprimidas
neumonía
oftalmía
oftalmía
piel
tos
Antimonium tartáricum
viruela
vómitos
albuminuria
amenorrea
apoplejía
astenopía
asma
cara
cistitis
conjunctivitis
corazón
diarrea
difteria
disuria

edema pulmonar
edema de la glotis
envenenamiento por
erisipela
erupciones suprimidas
escarlatina
estafiloma
estomatitis
estomatitis aftosa
fiebre
fiebre intermitente
fiebre tifoidea
hidrocéfalo
hidrocefaloide
hidropesía
hidropesía post-escarlatinosa
hidropericardio
hidrotórax
histeria
inflamaciones
laringe
meningitis
meningitis tuberculosa
modalidades
modo de preparación
ojos
oftalmía escrofulosa
órganos genitales femeninos
orina
ovarios
ovaritis
panadizo
parálisis
pleuresía
prolapso
pulso
queratitis
relación antidotal
relaciones antigónicas
relación complementaria
reumatismo
sensación de estropeo
sinovitis
síntomas mentales
torpeza
tos
tumores ováricos
útero

urticaria
variola
vértigo
Apium virus
apocinaceas
Apocyn cannabinum
articulaciones
ascitis
corazón
degeneración grasosa del corazón
diarrea
hemorroides
hidropesía
hidrocéfalo
hidrotórax
orina
reumatismo
Apomorphina
mareos
vómitos
Araceas
Arácnidos
Aranea diadema
cefalalgia
constitución
huesos
odontalgias
fiebre intermitente
sistema nervioso
Arctium lappa.
costras de leche
poliuria
reumatismo.
Argemona mexicana
piel
tenia
Argentum nitricum
conjuntivitis
diarrea
gonorrea
marasmo
oftalmia
oftalmia neonatorum
órganos urinarios
Arnica montana
abscesos
asfixia por el carbón de leña
apoplejía

apoplejía retiniana
cólera infantil
contusiones
diarrea
disentería
dispepsia
enteritis
escaras
esfuerzos musculares
fiebre tifoidea
forúnculos
gota
hemiplejia
hipertrofia cardiaca
mialgia
orina
peritonitis
parto
piel
piohemia
pleurodinia
relaciones
reumatismo
sensibilidad
torceduras
tos
tos ferina
vasos sanguíneos
vértigo
Arnicina
Arsenicum album
albuminuria
alcoholismo
asma
cara
catarros
catarro gástrico
carbunco
cólera asiática
cólera morbus
colapso
conjuntivitis
convulsiones
corazón
corea
coriza
crup
debilidad

delirium tremens
diarrea
difteria
dispepsia
encefalitis
esfuerzos musculares
esofagitis
estomatitis aftosa
fiebre
fiebre continua
fiebre de heno
fiebre héctica
fiebre intermitente
fiebre tifoidea
gangrena
gangrena de la boca
garganta
gastritis
hemicranea
herpes zoster
hidrocefaloide
hidropesía
hidropericardio
hipertrofia cardiaca
hipo
inflamaciones
inflamación del cerebro
lengua
menía puerperal
meningitis
metroragia
oftalmía flictenular
ojos
ovarios
orina
parotiditis
pulmones
quemaduras
relaciones antidotales
retención de orina
riñones
síncope
síntomas gástricos
síntomas mentales
sistema nervioso.
tos
úlceras
uremia

urticaria
vejiga
vértigo
Arsenicum iodátum
costras de leche
psoriasis
Arsenicum metallicum
lengua
Artemisia abrotanum
hemorroides
marasmo
mielitis
parotiditis
reumatismo
síntomas gástricos
Artemisia vulgaris
astenopía
emociones
ojos
epilepsia
Arum maculatum
piel
Arum triphyllum
afonía
difteria
escarlatina
garganta
inflamación del cerebro
laringe
síntomas mentales
uremia
Asafoetida
histeria
huesos
iritis
ojos
periostitis
relación antidotal
reaccion defectuosa
sistema nervioso
úceras
Asarum europeum
síntomas nerviosos
Asparagus.
corazón
Atropinum
Aurum metallicum
acción general

caries de la apófisis mastoides
cuello uterino
hipertrofia cardiaca
iritis
oído
ozena
prolapso uterino
síntomas mentales
testículos
útero
Aurum muriaticum matronatum
cuello uterino
Badiaga
bubones
corazón
infartos ganglionares
Bálsamo del, Perú.
bronquitis
Baptisia tinctoria
aftas
cara
difteria
disentería
enteritis
escarlatina
fiebre tifoidea
peritonitis
relaciones
síntomas mentales
tisis
Baryta carbonica
apoplejía
herpes circinatus
trastornos de los bebedores
Belladonna
abscesos
abscesos mamarios
ano
apoplejía
astenopia
blefaroeapasmo
cálculos biliares
cara
carácteres generales
cefalagia
cerebro
ciatica
colera infantil

cólico
colico nefritico
coma
congestiones
conjuntivitis
convulsiones
convulsiones puerperales
corazón
corea
coriza
delirio
dentición
diarrea
difteria
enteritis
enuresis
envenenamiento
epilepsia
erisipela
eritema
escarlatina
escleritis
esfinteres
esofagitis
fiebre
fiebre tifoidea
forúnculos
gastralgia
garganta
glándulas
hemicránea
hemorragia
hidrofobia
histeria
inflamaciones
insolación
magullamiento
meningitis
menstración
metritis
metritis puerperal
metrorragia
neuralgia
ojos
órganos genitales femeninos
orina
otitis media
parotiditis

parto
peritonitis
peritonitis puerperal
piel
pulso
pupilas
recto y ano
relaciones
relaciones complementarias
reumatismo
sarampión
síntomas gástricos
síntomas mentales
sistema nervioso
sueño
temperamento
tétanos
tiflitis
tonsilitis
tonsilitis supurada
torpeza
torticolis
tos
vómitos
Benzoicum acidum
gota
orina
reumatismo
Berberidanceas
Berberina
Berberis vulgaris
alcaloides
articulaciones
cálculos biliares
colico renal
dolor de espalda
evacuaciones
fistula anal
gota
higado
leucorrea
menstruación
metritis
órganos genitales femeninos
órganos urinarios
orina
peritonitis
reumatismo

Bismuth
gastralgia
Blatta
hidropesía
Bombus
Bórax venetta
ulceras
Bothrops lanceolatus
afasia
Bovista
asfixia
cefalagia
circulación
corazón
edema
epistaxis
herpes
lenguaje
menstruación
metrorragia
síntomas mentales
torteza
urticaria
Bromium
hipertrofia cardiaca
Brucia
Brucia antidisentérica
Bryonia alba
abscesos mamarios
bronquitis
cara
catarro nasal
cefalalgia
constipacion
corazón
coriza
diarrea
dispepsia
epistaxis
erupciones suprimidas
escarlatina
fiebre
fiebre gástrica
fiebre de leche
fiebre tifoidea
glaucoma
hígado
ictericia

inflamación de la boca
membranas serosas
meningitis
menstruación
neumonia
odontalgia
aftalmía
ojos
órganos genitales femeninos
orina
peritonitis
pleuresía
pleurodinia
relaciones antidotales
relaciones complementarias
reumatismo
sangre
sarampión
sinovitis
síntomas gastrointestinales
síntomas mentales
sudor
tiflitis
torticolis
tos
tos ferina
tubo digestivo
Bufo
cara
epilepsia
peritonitis
piel
úlceras
Cactus grandiflorus
corazón
diafragmitis
hemoptisis
hipertrofia cardiaca
neuralgia
útero
Cadmium sulph
indigestión
vómitos
Cafeina
acción general
Caladium seguinum
asma
emisiones seminales

espermatorrea
excesos sexuales
masturbación
parásitos intestinales
Calcarea acética
vómitos
Calcarea caustica
piel
Calcarea ostrearum
conjuntivitis
delirio
delirium tremens
emisiones seminales
escarlatina
estómago
excesos sexuales
fiebre tifoidea
gota
herpes circinatus
manía puerperal
meningitis
orina
órganos genitales femeninos
parotiditis
prolapso uterino
reumatismo
síntomas gástricos
síntomas mentales
sistema nervioso
temperamento
tos
urticaria
vómitos
Calcarea phosphorica
cólera infantil
fístula anal
fracturas
hidroecefaloide
huesos
leucorrea
órganos genitales femeninos
prolapso uterino
Calendula
contusiones
Caltha
pénfigo
piel
Camphora

cara
colapso
cólera asiático
cólera morbus
convulsiones
emisiones seminales
erisipela
estranguria
fiebre intermitente
inflamación
inflamación del cerebro
insolación
manía sexual
órganos urinarios
piel
reacción defectuosa
relaciones antidotales
síncope
tétanos
vértigo
Canchalagua
fiebre intermitente
Cannabis indica
cefalalgia
delirium tremens
dolor de espalda
gonorrea
gonorrea en garabatillo
órganos urinarios
parálisis
riñones
síntomas mentales
uremia
Cannabis sativa
gonorrea
gonorrea en garabatillo
nefritis
Cantharis
cerebro
cólico nefritico
difteria
disentería
eclampsia
erisipela
garganta
gastritis
gonorrea
gonorrea en garabatillo

hematuria
hidrofobia
inflamación del cerebro
irritación del glande y el pene
litiasis
mal de Bright
membranas mucosas
nefritis
ninfomanía
órganos genitales
órganos genitales femeninos
órganos urinarios
orina
parto
pénfigo
piel
priapismo
quemaduras
relación antidotal
retención placentaria
tubo digestivo
uremia
uretritis
vejiga
Cantharis strygosa
piel
Capsicum
acción general
alargamiento de la úvula
asma
bronquitis
difteria
disentería
dispepsia
disuria
fiebre intermitente
garganta
gonorrea
irritación vesical
mastoiditis
modalidades
nostalgia
oidos
piel
reacción defectuosa
Carbo animalis
acné
bubones

cefalalgia
cerebro
corazón
cuello uterino
estómago
lactancia
menstruación
órganos genitales femeninos
Carbo vegetabilis
afonía
asma
cara
carbunco
cefalalgia
colapso
cólera
constipación
dispepsia
epistáxis
estomatitis aftosa
fiebre héctica
fiebre intermitente
fiebre tifoidea
hemoragias
hemorroides
hernia
leucorrea
menstruación
órganos genitales femeninos
orina
parotiditis
reacción defectuosa
síntomas gástricos
tímpanismo
tos
úlceras
várices
Carbolicum acidum.
orina
piel
Carboneum oxigenisatum.
herpes zoster
pénfigo
piel
Carduus marianus
hígado
ictericia
Cascarilla

constipación
hemorragias
hemorroides
síntomas abdominales
Castor equi.
griestas de los pechos
Castoreum
amenorrea
cólico
convalescencia tardía
diarrea
fiebre tifoidea
menstruación
reacción defectuosa
sistema nervioso
Caulophyllum
dismenorrea
embarazo
entuertos
parto
prolapso uterino
reumatismo
Causticum
agalaxia
ano
corea
efectos de la ira
enuresis
gota
parálisis
pénfigo
piel
ptosis
recto y ano
retención de orina
reumatismo
síntomas mentales
sistema nervioso
tortícolis
tos
vejiga
Cedrón
fiebre intermitente
neuralgia
neuralgia ciliar
Cepa
coriza
flatulencia

relación antidotal
tos
Chamomilla
aborto
bilis
cara
cólico
convulsiones
coriza
dentición
diarrea
dientes
dismenorrea
emociones
entuertos
ictericia
insomnio
ira, malos efectos de la
menstruación
neuralgia
otalgia
parto
relaciones
reumatismo
síntomas gástricos
síntomas mentales
sistema nervioso
temperamento
tos
Chelidonium.
bronquitis capilar
dolores escapulares
hígado
ictericia
neuralgia
neumonía
piel
relaciones
síntomas mentales
vértigo
Chenopodium.
dolores escapulares
hígado
Chimaphila.
piel
vejiga
Chininum arsenicosum.
gastralgía

Chininum sulph.
acción refleja
desgaste de los tejidos
fiebre intermitente
hipertrofia esplénica
infusorios
pénfigo
piel
reumatismo
sangre
Chloral.
piel
Cloruro de oro y platino.
caries y necrosis
Cholos terrapinae.
subsaltos musculares
Cicuta virosa
cáncer
cara
convulsiones
convulsiones puerperales
epilepsia
parásitos intestinales
piel
sistema nervioso
tétanos
Cicutina
Cicutoxina
Cimex lactularius
fiebre intermitente
tos
Cina
astenopía
cara
convulsiones
dentición
enuresis
estrabismo
fiebre intermitente
modalidades
ojos
parásitos intestinales
temperamento
tos ferina
vejiga
Cinchona
alcaloides
anemia

astenopía
cálculos biliares
cara
cefalalgia
cerebro
cólera infantil
coriza
debilidad
diarrea
disentería
dispepsia
emisiones seminales
envenenamiento por
fiebre héctica
fiebre intermitente
fiebre tifoidea
hemorragias
hipertrofia esplénica
hidrocefaloide
ictericia
intestinos
neuralgia
neuralgia palúdica
pulmones
reacción defectuosa
relaciones antagónicas
relaciones antidotales
retención placentaria
reumatismo
síntomas gástricos
síntomas mentales
sistema nervioso
timpanismo
úlceras
Cinnabaris.
condilomas
escarlatina
garganta
piel
sicosis
sífilis
Cinnamon
hemorragias
Citrullus
Clematis crispa
Clematis erecta.
cistitis
gonorrea

orquitis
piel
uretra
Clematis viorna
piel
Cobaltum
dolor de espalda
emisiones seminales
Coca
reacción defectuosa
Cocculus indicus
acción general
ano
cefalalgia
convulsiones
debilidad
dismenorrea
estómago
fiebre tifoidea
hernia
histeria
insomnio
irritación espinal
médula espinal
meningitis cerebro-espinal
menstruación
parálisis
recto y ano
síntomas mentales
sistema nervioso
Coccus cacti
tos ferina
Cochlearia armoracea.
órganos urinarios
piel
Codeina
esfuerzos musculares
tisis
Coffea arabicum
alcaloides
acción general
circulación
congestión apopléctica
corazón
diarrea
dientes
fatiga
odontalgia

órganos de los los sentidos
piel
reacción defectuosa
síntomas mentales
Colchicum autumnale
cólera
convulsiones
corazón
debilidad
diarrea
dentición
disentería
fiebre tifoidea
gastritis
gota
hidropesía
hidrotórax
indigestión
mal de Bright
orina
pericarditis
peritonitis
prosopalgia
relaciones antidotales
reumatismo
síntomas mentales
síntomas abdominales
síntomas gástricos
timpanismo
Coleópteros
Collinsonia
constipación
hemorroides
prolapso uterino
Colocynthis
abdomen
calambres musculares
cefalalgia
ciática
cólico
constipación
coxalgia
diarrea
disentería
dismenorrea
enteritis
glaucoma
gota

iritis
neuralgia
neuralgia ciliar
oftalmía artrítica
parafimosis
relación antidotal
síntomas mentales
tumores ováricos
vejiga
Comocladia dentata
erisipela
ojos
piel
Compuestas
Coníferas
Coniina
Conium maculatum
cáncer
cistitis
constipación
contusiones
corazón
debilidad
emisiones seminales
envenenamiento por
escrófulas
excesos sexuales
fatiga muscular
glándulas
hipocondriasis
noma
oídos
ojos
parálisis
parálisis post-diftérica
prosopalgia
relaciones complementarias
reumatismo
síntomas mentales
sistema nervioso
testículos
tos
uretra
uretritis
vejiga
vértigo
Con vallaria majalis
corazón

prurito vulvar
útero
Copaiva
gonorrea
irritación vesical
orina
pénfigo
piel
pulmones
urticaria
Coptis root
Corallium rubrum
chancro
psora
sífilis
tos ferina
Cornus florida.
fiebre intermitente
Cotura matura
piel
Crabro
Crotcus
corea
histeria
temblor muscular
Crotalus horriduas
apoplegía retiniana
difteria
erisipela
hematuria
neuralgia ciliar
oídos
queratitis
tos
Croton tiglium
cólera infantil
cólico
diarrea
envenenamiento por el Ruhs
glándulas mamarias
piel
relaciones antidotales
Cubeba
gonorrea
Cucurbita
lombrices
Cucurbitaceas
Cuprum arsenicosum

piel
Cuprum metallicum
asma
cara
colapso
convulsiones
entuertos
erisipela
erupciones suprimidas
escarlatina
flebre intermitente
histeria
meningitis
sueño
tos ferina
Curare
cansancio muscular
catalepsia
eczema
enfisema
melanodermia hepática
parálisis
sistema nervioso
tétanos
Curarina
Cyclamen
astenopía
catarro nasal
cefalalgia
clorosis
cólico
dismenorrea
hemorragia
neurastenia
ojos
síntomas gástricos
Cypripedium
reacción defectuosa
sueño
Diffembachia
estomacace
garganta
Digitalina
Digitoxina
Digitalis purpurea
aborto
balanorrea
cara

cerebro
cianosis neonatorum
cistitis
colapso
corazón
emisiones seminales
gonorrea
gonorrea en garabatillo
hidrocele
hidrocéfalo
hidropesía
hidropericardio
hidrotórax
hígado
ictericia
irritación vesical
meningitis
meningitis cerebro-espinal
órganos urinarios
parafimosis
síncope
síntomas mentales
sueño
vértigo
vómito
vómitos del embarazo
Dioscorea
diarrea
excesos sexuales
neuralgia visceral
Ditaina
Dolichos prur.
dentición
Doryphora
gonorres
uretritis
Dracontium
bronquitis
Drosera
asma
piel
tisis
tos
tos ferina
Dulcamara
cistitis
cólico
coriza

diarrea
envenenamiento por
esfuerzos musculares
garganta
lengua
mielitis
médula espinal
otalgia
parálisis
parálisis pulmonar
piel
pulmones
relaciones complementarias
reumatismo
sistema nervioso
urticarla
vejiga
Elaps
diarrea
estómago
hemoptisis
neumonía
oídos
pulmones
síntomas gastrointestinales
tisis
Elaterium
cólera infantil
diarrea
Epigea
irritación vesical
Equisetum hyemale.
albuminuria
cistitis
enuresis
hematuria
Ergot
convulsiones
Erigeron Canadensis
hemorragia uterina
irritación vesical
Erodictión cal.
véase Yarba Santa.
Escerina
Escrofulariaceas
Eucaliptus
fiebre intermitente
Eupatorium perfoliatum

fiebre intermitente
influenza
Eupatorium purpureum
fiebre intermitente
irritación vesical
Euphorbia corollata
cólera morbus
diarrea
piel
úlceras
Euphorbia cyparissias
piel
Euphorbiaceas
Euphorbium
erisipela
huesos
piel
úlceras
Euphrasia
blefaritis
catarro nasal
condilomas
conjuntivitis
coriza
iritis
oftalmía
ojos
ptosis
Fel tauri
constipación
Fel vulpi
constipación
Ferrum carbonicum.
neuralgía
Ferrum iodatum
órganos genitales femeninos
Ferrum metallicum
anemia
diarrea
reumatismo
Ferrum phosphoricum
cólera infantil
congestión pulmonar
diarrea
fiebre
hidrocefalia
inflamación
irritación vesical

neumonía
pulmones
vejiga
Flouricum acidum
dientes
hígado
lengua
noevi
síntomas mentales
tonsilitis
Formica
albuminuria
piel
Formicum ácidum
Gambier
Gambogia
diarrea
Gualtheria
pleurodinia
Gelsemina
Gelsemium
aborto
afonía
cara
catarro
cefalalgia.
circulación
congestión pasiva
convulsiones puerperales
corazón
coriza
cuello uterino
diarrea
diplopia
disfagia
dismenorrea
emisiones seminales
emociones
envenenamiento por
epididimitis
estrabismo
excesos sexuales
fatiga muscular
fiebre
fiebre biliosa
fiebre intermitente
fiebre remitente
fiebre tifoidea

garganta
gonorrea
hemicranea
meningitis cerebro espinal
órganos genitales
óganos genitales femeninos
parálisis
parálisis post-diftérica
parto
piel
poliuria
prosopalgia
ptosis
relaciones antidotales
reumatismo gonorréico
sarampión
sistema nervioso
tonsilitis
tos
útero
Geranium maculatum
diarrea
Gettysburg spring agua de
caries vertebral
coxalgia
Glonoinum
albuminuria
apoplegia retiniana
cefalalgia
cerebro
circulación
congestión retiniana
convulsiones
convulsiones puerperales
efectos patológicos del sol
inflamación celebral
lenguaje
meningitis
metrorragia
ojos
relaciones antidotales
síntomas mentales
traumatismo
Gnaphalium
cíatica
cólera infantil
diarrea
Gossypium

retención placentaria
Graphites
afonía
blefarítis
cicatrices
costras de leche
cuello uterino
erisipela
gastralgia
grietas de los los pezones
indigestión
leucorrea
menstruación
nariz
oftalmía
ojos
ovarios
piel
prolapso uterino
quistes de los los cartílagos tarsos
síntomas gástricos
síntomas mentales
sordera
Gratiola
diarrea
Grindelia robusta.
corazón
nervios neumogástricos
piel
pulmones
Guaiacum
gota
pleurodinia
reumatismo
síntomas torácicos
tisis
tortícolis
Hamamelis
aborto
adolorimiento abdominal
apoplegía retiniana
equimosis de la esclerótica
embarazo
hematemesis
hemorragias
hemorroides
mentruación vicariana
orquitis

variocele
Hedeoma
órganos genitales femeninos
Helleborus
aftas
alcaloides
apoplejía
convulsiones
corazón
escarlatina
fiebre intermitente
fiebre tifoidea
hidrocéfalo
hidropesía
meningitis
meningitis tuberculosa
nefritis
orina
piel
sensorio
shock
Helonias dioica
afecciones uterinas
albuminuria
debilidad
leucorrea
neurastenia
órganos genitales femeninos
parto
prolapso uterino
síntomas mentales
vaginitis
Hepar sulphuris calcarea
constipación
crup
dispepsia
erisipela
oídos
otitis media
periodontitis
síntomas mentales
tos
tumores ováricos
úlceras
Hippomane mancinela
escarlatina
piel
Hura bras.

piel
Hidrastis canadensis
catarro post-nasal
estómago
membranas mucosas
útero
Hidrangea
cálculos
Hidrocotile
prurito vaginal
irritación vesical
Hydrocyanicum acidum
asfixia
cara
fiebre intermitente
síncope
tétanos
uremia
vértigo
Himenópteros
Hyosciamus niger
alargamiento de la úvula
apoplejía
cara
cefalalgia
cerebro
convulsiones
corea
delirio
enuresis
epilepsia
escarlatina
fiebre
fiebre intermitente
fiebre tifoidea
hipo
histeria
insomnio
manía
manía puerperal
meningitis
metrorragia
orina
parálisis
retención de orina
síntomas mentales.
sistema nervioso
sueño

tos
vijiga
Hypericum
columna vertebral
contusiones
tétanos
Ignatia amara
articulaciones
cefalalgia
corea
constipación
convulsiones
difteria
dismenorrea
dispepsia
emociones
estómago
fiebre intermitente
fístula
garganta
gastralgia
gusanos
hipo
histeria.
luxación del maxilar
nariz
neuralgia
odontalgia
oftalmia flictenular
ojos
pesar, malos efectos del
poliuria
proctalgia
prolapso rectal
relaciones antidotales
recto y ano
síntomas mentales
temperamento
tonsilitis
tos
Indigo
epilepsia
gusanos
Inula
irritación vesical
órganos genitales femeninos
Iodum
aftas

articulaciones
difteria
sinovitis
Ipecacuanha
aborto
acción general de
alcaloides
asma
bronquitis capilar
cefalalgia
cólera infantil
cólico
conjuntivitis
convulsiones
coriza
diarrea
erupciones suprimidas
estómago
fiebre intermitente
hematuria
hemorragia
sarampión
síntomas gástricos
síntomas mentales
temperamento
tos ferina
Ipomea nil.
cólico renal
Iris versicolor
cefalalgia
cólera morbus
diarrea
hemicranea
Jaborandi
astenopia
Jacaranda
condilomas
chancroides
Jatropha curcas
cólera asíático
Juglandáceas
Juglans cathartica
véase Julgans cinerea.
Juglans cinerea
cefalalgia
hidrotórax
hígado
ictericia

Kali bichromicum
ano
corazón
difteria
disentería
oftalmia escrofulosa
ojos
ozena
piel
recto y ano
reumatismo
sarampión
sicosis
tos ferina
úlceras
Kali bromatum
cólera infantil
convulsiones
diarrea
excesos sexuales
piel
síntomas mentales
sistema nervioso
temores nocturnos
urticaria
Kali carbonicum
astenpoía
cara
corazón
dolores toracicos
estómago
fatiga muscular
hidropericardio
hígado
lumbago
neumonía
orina
síntomas mentales
sistema nervioso
Kali chloricum.
aftas
corazón
Kali ferrocyanicum
corazón
metrorragia
órganos genitales femeninos
Kali hidroiodicum
articulaciones

huesos
ozena
piel
sífilis
sinovitis
Kali hidrosulphuricum.
piel
Kali permanganum.
difteria
Kali sulphuratum
piel
Kalmia
cefalalgia
corazón
hipertrofia cardiaca
neuralgia
ptosis
reumatismo
Kumyss
Kreosotum
acné
cáncer
dientes
enuresis
leucorrea
menstruación
neuralgia
órganos genitales femeninos
síntomas gástricos
síntomas urinarios
vértigo
Lac caninum
acción general
acné
albuminuria
aftas
apoplejía
apoplejía retiniana
asma
bronquitis
cáncer
cara
carbunco
catarro nasal
cefalalgia
chancro
circulación
cistitis

cólera
corazón
coriza
diarrea
dientes
difteria
delirio
delirium tremens
disentería
enteritis
erisipela
escarlatina
estómago
estomatitis
estreñimiento
fiebre amarilla
fiebre intermitiente
fiebre tifoidea
garganta
hematuria
hemorroides
hernia
hígado
hidropericardio
hidropesía
hidropesía postescarlatinosa
ictericia
insolación
lenguaje
locuacidad
mal de Bright
manía puerperal
meningitis
menopausia
menstruación
metrorragia
modalidades
nariz
neumonía
oftalmía escrofulosa
oídos
ojos
órganos genitales
órganos genitales femeninos
orina
ovarios
ovaralgia
ovaritis

ozena
parálisis cerebral
parotiditis
periprocitis
prosopalgia
pulmones
pústula maligna
recto y ano
relación antidotal
sífilis
síncope
síntomas gastricos
síntomas mentales
síntomas sexuales
síntomas universales
sueño
tétanos
tiflitis
tonsilitis
tos
trastornos de los bebedores
tuberculosis
tumores ováricos
úlceras
vejiga
vértigo
Lacnanthes
fiebre intermitente
tortícolis
Lac vaccinum
Lamium album
cefalalgia
hemorroides
Lathirus
Laurocerasus
escarlatina
síncope
vértigo
Ledum
acné
contusiones
gota
hemorragias
hemoptisis
lumbago
pólipos
relación antidotal
reumatismo

trastornos de los bebedores
Leptandra virginica
diarrea
hígado
Lilium tigrinum
astenopía
circulación
corazón
diarrea
envenenamiento por
leucorrea
órganos genitales femeninos
ovarios
prolapso uterino
retroversión
síntomas mentales
síntomas uterinos
sub-involución uterina
tórax
Linaria
abatimiento
enuresis
Lithum carbonicum
gota
reumatismo
Lobelia inflata.
asma
síntomas gástricos
vómitos
Lobelia syphilitica
dolor de espalda
Lycopodium
aborto
asma
bronquitis capilar
cataratas
catarro bronquial
catarro nasal
cara
cirrosis hepática
cólico nefrítico
constipación
constitución
convulsiones
difteria
disuria
escarlatina
estómago

estomatitis aftosa
embarazo
emisiones seminales
excesos sexuales
fiebre
fiebre héctica
fiebre intermitente
fiebre tifoidea
flatulencia
gota
hemorriodes
hidropesía
hidropericardio
hernia
hígado
litiasis
lengua
membranas mucosas
modalidades
neumonía
noevi
orzuelo
orina
ovarios
parálisis cerebral
parotiditis
parto
preparación del
pulmones
pulso
reumatismo
retinitis
riñones
relaciones complementarias
sangre
sensibilidad
síntomas gástricos
síntomas mentales
sueño
temperamento
timpanismo
tonsilitis
tumores eréctiles
úlceras
vejiga
venas varicosas
Magnesia carbónica
neuralgia

Magnesia muriática
cafalalgia
corazón
dismenorrea
escirrus
histeria
menstruación
sistema nervioso
útero
Magnesia phosphorica.
neuralgia
Magnolia grandiflora.
corazón
Mamíferos
Mancinela
escarlatina
piel
Medorreinum
síntomas mentales
Medusa
urticaria
Melantáceas
Mel cum sale.
metritis
útero y ovarios
Melilotus
cefalalgia
Menispermáceas
Mentha piperita
tos
Menyant
cefalalgia
fiebre intermitente
Mephitis
asma
locuacidad
sistema nervioso
tos ferina
Mercurius aceticus
irritación vesical
Mercurius biniodatus
difteria
Mercurius corrosivus
balanorrea
garganta
gonorrea
oftalmía neonatorum
tiflitis

Mercurius vivus y solubilis abscesos dentarios
balanorrea
blefaritis
cefalalgia
conjuntivitis
constipación
coriza
diarrea
difteria
disentería
dispepsia
estomatitis aftosa
fiebre tifoidea
fimosis
gonorrea
hígado
huesos
ictericia
iritis
irritación glandular
neumonía
odontalgia
ojos
otitis media
órganos genitales masculinos
órganos urinarios
ozena
periodntitis
piel
reumatismo
tiflitis
tonsilitis
tumores ováricos
úlceras
Mezereum
ano
costras de leche
eczema
herpes zoster
neuralgia ciliar
piel
recto y ano
tos
úlceras
Millefolium
hematemésis
hemoptísis
hemorragias

menstruación
Mitchella
cuello uterino
irritación vesical
metrorragia
Momordica balsamum
flatulencia
Morfina
cáncer
timpanismo
Moschus
cefalalgia
convulsiones
envenenamiento por
histeria
menstruación
neumonía
relación antidotal
reacción defectuosa
síntomas mentales
sistema nervioso
Murex purpurea
leucorrea
menstruación
poliuria
útero
Muriaticum acidum.
difteria
escarlatina
estomatitis aftosa
fatiga muscular
fiebre tifoides
úlceras
Mygale
corea
gonorrea en garabatillo
síntomas mentales
sistema nervioso
Myrica cerifera.
ictericia
Myrtus communis.
tisis
Naja
difteria
Natrum arsenicosum
cara
difteria
Natrum carbonicum.

cuello uterino
órganos genitales femeninos
prolapso uterino
Natrum hypochlorosum
cefalalgia
estomatitis aftosa
órganos genitales femeninos
prolapso uterino
prurito vulvar
Natrum muriaticum
alargamiento de la úvula
ano
astenopía
blefaroespasmo
cansancio cerebral
cefalalgia
conjuntivitis
corazón
fiebre intermitente
insolación
irritación espinal
lengua
leucorrea
ojos
órganos genitales femeninos
orina
parálisis
pesar. efectos crónicos del
prolapso uterino
ptosis
recto y ano
síntomas mentales
sudor
susto. malos efectos del
torpeza
tos
Natrum sulphuricum
diarrea
ictericia
Niccolum
estómago
Nicotinum
Nitricum acidum
ano
balanorrea
caries de la apófisis mastoides
chancro
condilomas

difteria
escarlatina
estomatitis aftosa
oidos
ozena
pénfigo
piel
recto y ano
sífilis
síntomas mentales
úlceras
Nitrito de amylo
bochornos
congestión cerebral
corazón
menopausia
metrorragia
neuralgia
ojos
prosopalgia
Nux juglans
costras de leche
piel
tiña favosa
Nux moschata
cara
histeria
síntomas mentales
sistema nervioso
Nux vomica
acné
amblíopia
apopiejia
asma
ataxia locomtriz
atrofia retiniana
blefaroespasmo
cara
calambres musculares
catarro
catarro de la trompa de Eustaquio
catarro gástrico
cefalalgia
cefalalgia gástrica
cloasma
cólico
cólico renal
composición de

conjuntivitis
constipación